

سلسلة كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة

الرياضيات

للف الثاني المتوسط

المؤلفون

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| د. امير عبد المجيد جاسم | د. تغريد حر مجيد |
| د. طارق شـعبان رجب | د. حسين صادق مجيد |
| د. احمد مولود عبد الهادي | م.م. مروة فليح حسن |

تنقيح

لجنة متخصصة في وزارة التربية

المشرف الفني على الطبع
م.م. أمل إبراهيم محسن

المشرف العلمي على الطبع
عبد الله عمر هندي

بنيت وصممت (سلسلة كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة) على أيدي فريق من المتخصصين في وزارة التربية/المديرية العامة للمناهج وبمشاركة متخصصين من أساتذة الجامعات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على وفق المعايير العالمية لتحقيق أهداف

بناء المنهج الحديث المتمثلة في جعل الطلاب:

متعلمين ناجحين مدى الحياة.

أفراداً واثقين بأنفسهم.

مواطنين عراقيين يشعرون بالفخر.

تصميم الغلاف والرسوم
ساره خليل إبراهيم

مصمم الكتاب
هبة صلاح مهدي

الموقع والصفحة الرسمية للمديرية العامة للمناهج

www.manahj.edu.iq
manahjb@yahoo.com
Info@manahj.edu.iq



[manahjb](https://www.facebook.com/manahjb)
[manahj](https://www.youtube.com/channel/UCmanahj)



استناداً إلى القانون يوزع مجاناً ويمنع بيعه وتداوله في الأسواق

المقدمة

تعدُّ مادة الرياضيات من المواد الدراسية الأساسية التي تساعد الطالب على اكتساب الكفايات التعليمية اللازمة له، لتنمية قدراته على التفكير وحل المشكلات، ويساعده على التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة.

ومن منطلق الاهتمام الذي توليه وزارة التربية متمثلة بالمديرية العامة للمناهج لتطوير المناهج بصورة عامة ولاسيما مناهج الرياضيات لكي تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية في مجالات الحياة المختلفة، فقد وضعت خطة لتأليف سلسلة كتب الرياضيات للمراحل الدراسية الثلاث، وأُجِزَت منها كتب المرحلة الابتدائية وبدأ العمل على استكمال السلسلة بتأليف كتب المرحلة المتوسطة. إن سلسلة كتب الرياضيات العراقية الجديدة ومن ضمن الإطار العام للمناهج تعزز القيم الأساسية التي تتمثل بالالتزام بالهوية العراقية والتسامح واحترام الرأي والرأي الآخر والعدالة الاجتماعية، وتوفير فرص متكافئة للتميز والإبداع، كما تعمل على تعزيز كفايات التفكير والتعلم والكفايات الشخصية والاجتماعية وكفايات المواطنة والعمل.

بُنيت سلسلة كتب الرياضيات العراقية على محورية الطالب في عمليتي التعليم والتعلم وعده المحور الرئيس في العملية التربوية على وفق المعايير العالمية.

تميزت سلسلة كتب الرياضيات العراقية للمرحلة المتوسطة في تنظيم الدروس على ست فقرات: تعلم، تأكد من فهمك، تدرّب وحلّ التمرينات، تدرّب وحلّ مسائل حياتية، فكّر، اكتب.

يأتي كتاب الرياضيات للصف الثاني المتوسط مشتملاً على أربعة محاور أساسية: محور الأعداد والعمليات، ومحور الجبر، ومحور الهندسة والقياس، ومحور الإحصاء والاحتمالات من ضمن الأوزان النسبية لكل محور، وتضمن الكتاب سبعة فصول لكل فصل تمريناته.

تتميز هذه الكتب بأنها تعرض المادة بأساليب حديثة، تتوفر فيها عناصر الجذب والتشويق، التي تساعد الطالب على التفاعل معها، عن طريق ما تقدمه من تدريبات وتمرينات ومسائل حياتية، فضلاً عن ذلك وضعت تمرينات الفصول في نهاية الكتاب وهي تختلف عن التدريبات والتمرينات في الدروس وذلك لكونها موضوعية فالإجابة عنها تكون عن طريق اختيار من متعدد وهذا بدوره يهيئ الطالب للمشاركة في المسابقات الدولية.

يمثل هذا الكتاب امتداداً لسلسلة كتب الرياضيات المطورة للمرحلة الابتدائية ودعامة من دعائم المنهج المطور في الرياضيات إلى جانب دليل المدرس، وعليه نأمل أن يساهم تنفيذها في اكتساب الطلاب المهارات العلمية والعملية وتنمية ميولهم لدراسة الرياضيات.

اللهم وفقنا لخدمة عراقنا العزيز وأبنائه ...

المؤلفون

The Rational Numbers

الأعداد النسبية

- الدرس [1-1] ترتيب العمليات على الأعداد النسبية.
- الدرس [1-2] القوى (الأسس) السالبة والصورة العلمية للعدد.
- الدرس [1-3] خصائص القوى (الأسس).
- الدرس [1-4] الكسور العشرية الدورية والصورة العلمية للعدد (استعمال الحاسبة).
- الدرس [1-5] تبسيط الجمل العددية الكسرية.

الحوت الأزرق، أو المئزة (الاسم العلمي: *Balaenoptera musculus*) هو حيوان ثديي بحري ينتمي إلى تحت رتبة الحيتان الباليينية، وبسبب طوله البالغ 30 متراً ووزنه البالغ 170 طناً أو أكثر، فإنه يعد أكبر الحيوانات المعروفة على الإطلاق. كان أكبر تجمع للحيتان الزرق قبل عمليات صيد الحيتان في المنطقة القطبية الجنوبية، إذ بلغ عددها قرابة 2.39×10^5 حوت. هل تستطيع كتابة عدد الحيتان بالصورة الرقمية؟

عبر عن الأعداد التالية بصيغة كسرٍ اعتيادي:

1 $9 = \dots\dots$ 2 $2.3 = \dots\dots$ 3 $0.29 = \dots\dots$ 4 $1.4 = \dots\dots$ 5 $6.1 = \dots\dots$

قارن بين الأعداد النسبية مستعملاً الرموز ($>$, $<$, $=$):

6 $\frac{11}{25} \boxed{} \frac{6}{10}$

7 $\frac{5}{6} \boxed{} \frac{8}{15}$

8 $\frac{7}{16} \boxed{} \frac{25}{64}$

رتب الأعداد النسبية التالية من الأصغر إلى الأكبر:

9 $\frac{4}{5}, \frac{3}{12}, \frac{15}{25}$

10 $\frac{3}{8}, \frac{5}{7}, \frac{3}{21}$

رتب الأعداد النسبية التالية من الأكبر إلى الأصغر:

11 $\frac{12}{27}, \frac{6}{9}, \frac{10}{18}$

12 $\frac{8}{14}, \frac{10}{25}, \frac{4}{28}$

جد ناتج ما يأتي:

13 $\frac{3}{5} \div \frac{1}{6} = \dots\dots\dots$

14 $-3.6(+)-2.2(= \dots\dots\dots$ 15 $7.1(+)-5.9(= \dots\dots\dots$

16 $\frac{5}{9} - \frac{3}{8} = \dots\dots\dots$

17 $4.1(\times)-2(= \dots\dots\dots$ 18 $\frac{3}{19} \times \frac{6}{10} = \dots\dots\dots$

جد النسبة المئوية التقديرية لكل ما يأتي:

19 $\frac{1}{9}$

20 $\frac{8}{26}$

21 $\frac{11}{74}$

22 $\frac{5}{47}$

أكمل الجدول التالي مبيناً نوع التناسب:

23

10	8	5	4	2	1	A
	125			500	1000	B
			1000		1000	C

قدر الجذور الآتية:

24 $\sqrt{50}$

25 $\sqrt{13}$

26 $\sqrt[3]{145}$

27 $\sqrt[3]{33}$

ترتيب العمليات على الاعداد النسبية

Ordering Operations on Rational Numbers

الدرس
[1-1]

تَعَلَّم



يتدرب أوس وأيمن على رياضة التنس. إذ يتدرب أوس يومين في الأسبوع بواقع $\frac{5}{6}$ الساعة في اليوم الأول و $\frac{3}{4}$ الساعة في اليوم الثاني. ويتدرب أيمن يوماً واحداً في الأسبوع بواقع $\frac{2}{3}$ الساعة. كم تزيد المدة التي يتدربها أوس عن المدة التي يتدربها أيمن خلال الأسبوع؟

فكرة الدرس

- استعمال ترتيب العمليات على الاعداد النسبية لتبسيط جملة عددية.
- المفردات
- ترتيب العمليات.
- جملة عددية.

[1-1-1] تبسيط جملة عددية تحتوي على جمع و طرح أو ضرب وقسمة اعداد نسبية

Simplifies Numerical Sentences Contains Addition and Subtraction or Multiplication and Division Rational Numbers

تعلمت سابقاً كيفية ايجاد ناتج جمع أو طرح أعداد نسبية وكذلك ضرب أو قسمة عددين نسبيين والآن سوف تتعلم كيفية تبسيط جملة عددية تحتوي على عمليتين (جمع و طرح (أو ضرب وقسمة (لأعداد نسبية.

مثال 1) كم تزيد المدة التي يتدربها أوس عن المدة التي يتدربها أيمن خلال الأسبوع؟

نكتب الجملة العددية التي تمثل المسألة :

$$\frac{5}{6} + \frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{5 \times 2 + 3 \times 3}{12} - \frac{2}{3}$$

$$= \frac{19}{12} - \frac{2}{3} = \frac{19 - 8}{12} = \frac{11}{12}$$

نجري عملية الجمع أولاً

نجري عملية الطرح ثانياً

يتدرب اوس مدة $\frac{11}{12}$ الساعة في الاسبوع زيادة على ما يتدربه أيمن.

مثال 2) استعمال جمع و طرح الاعداد النسبية لتكتب كل مقدار بأبسط صورة:

i) $\left(\frac{1}{3} - \frac{8}{9} + \frac{12}{6}\right) = \frac{1 \times 6 - 8 \times 2 + 12 \times 3}{18} = \frac{6 - 16 + 36}{18} = \frac{26}{18} = \frac{13}{9}$

ii) $\left(2\frac{2}{7} + 1\frac{1}{5} - \frac{6}{35}\right) = \frac{16}{7} + \frac{6}{5} - \frac{6}{35} = \frac{16 \times 5 + 6 \times 7 - 6}{35}$
 $= \frac{80 + 42 - 6}{35} = \frac{116}{35}$

iii) $(7.34 - 3.08 + 1.9) = 4.26 + 1.9 = 6.16$

iv) $(3.16 + 0.092 - 0.07 - 5.005) = 3.252 - 5.075 = -1.823$

v) $(0.07 - 0.006 + 0.503 - 0.08) = 0.064 + 0.503 - 0.08 = 0.567 - 0.08 = 0.487$

مثال (3) استعمال ضرب وقسمة الأعداد النسبية لتكتب كل مقدار بأبسط صورة:

$$i) -3\frac{1}{2} \times 1\frac{2}{3} \div 3\frac{7}{2} = -\frac{7}{2} \times \frac{5}{3} \div \frac{13}{2} = -\frac{35}{6} \div \frac{13}{2} = -\frac{35}{6} \times \frac{2}{13} = -\frac{35}{39}$$

$$ii) \frac{48}{9} \div \frac{-12}{3} \times \frac{-8}{13} = \frac{48}{9} \times \frac{3}{-12} \times \frac{-8}{13} = \frac{4}{-3} \times \frac{-8}{13} = \frac{32}{39}$$

$$iii) 4.5 \times 3.65 \div (-1.125) = 16.425 \div (-1.125) = -14.6$$

$$iv) 7.29 \div 0.9 \times (-0.03) = 8.1 \times (-0.03) = -0.243$$

[1-1-2] استعمال ترتيب العمليات لتبسيط جملة عددية تحتوي على اعداد نسبية Using Ordering Operations to Simplifies Numerical Sentences Contains Rational Numbers

تعرفت سابقاً إلى استعمال ترتيب العمليات على الأعداد الصحيحة لتبسيط جمل عددية والآن سوف نتعرف

إلى استعمال ترتيب العمليات لتبسيط جمل عددية تحتوي على اعداد نسبية وباتباع الخطوات الآتية:

1) ضع العمليات التي لها اولوية بين الأقواس.

2) أبدأ بالعمليات بين الأقواس.

3) اضرب وقسم من اليسار إلى اليمين.

4) اجمع وأطرح من اليسار إلى اليمين.

مثال (4) استعمال ترتيب العمليات على الأعداد النسبية لتكتب كل مقدار بأبسط صورة:

$$i) \frac{-1}{5} \times \frac{25}{-3} + \frac{3}{2} \times \frac{8}{21} = \left(\frac{-1}{5} \times \frac{25}{-3}\right) + \left(\frac{3}{2} \times \frac{8}{21}\right) = \frac{5}{3} + \frac{4}{7} = \frac{35+12}{21} = \frac{47}{21}$$

$$ii) \frac{7}{12} \div \frac{21}{-4} - \frac{9}{11} \div \frac{-27}{44} = \left(\frac{7}{12} \times \frac{-4}{21}\right) - \left(\frac{9}{11} \times \frac{44}{-27}\right) = \frac{-1}{9} + \frac{4}{3} = \frac{-1+12}{9} = \frac{11}{9}$$

$$iii) \frac{4}{5} \div \frac{8}{15} \times \frac{2}{-7} + \frac{5}{14} = \left(\frac{4}{5} \times \frac{15}{8}\right) \times \frac{2}{-7} + \frac{5}{14} = \left(\frac{3}{2}\right) \times \frac{2}{-7} + \frac{5}{14} = \frac{-3}{7} + \frac{5}{14} = -\frac{1}{14}$$

$$iv) \frac{12}{7} - \frac{2}{11} \times \frac{22}{-6} \div \frac{4}{15} = \frac{12}{7} - \left(\frac{2}{11} \times \frac{22}{-6} \div \frac{4}{15}\right) = \frac{12}{7} - \left(\frac{2}{-3} \div \frac{4}{15}\right) = \frac{12}{7} - \left(\frac{2}{-3} \times \frac{15}{4}\right) \\ = \frac{12}{7} - \left(\frac{5}{-2}\right) = \frac{12}{7} + \frac{5}{2} = \frac{24+35}{14} = \frac{59}{14}$$

$$v) 4.01 \times 1.2 + 11.5 \times 0.6 = (4.01 \times 1.2) + (11.5 \times 0.6) = 4.812 + 6.9 = 11.712$$

$$vi) 6.4 \div 0.8 - 12.5 \div 0.5 = (6.4 \div 0.8) - (12.5 \div 0.5) = 8 - 25 = -17$$

$$vii) 0.09 \times 16 + 5.4 \div 0.6 = (0.09 \times 16) + (5.4 \div 0.6) = 1.44 + 9 = 10.44$$

تأكّد من فهمك

استعمل جمع وطرح الأعداد النسبية لتكتب كلّ مقدارٍ بأبسط صورة:

1 $\frac{1}{5} - \frac{2}{7} + \frac{3}{5} = \dots\dots$

2 $4\frac{1}{3} + 3\frac{2}{5} - \frac{8}{15} = \dots\dots$

الأسئلة (1 - 6)

3 $\frac{2}{9} - 1\frac{1}{8} + \frac{4}{3} - \frac{5}{4} = \dots\dots$

4 $\frac{6}{5} + \frac{9}{2} - \frac{3}{8} + \frac{7}{15} = \dots\dots$

مشابهة للمثال 2)

5 $9.14 - 6.07 + 2.5 = \dots\dots$

6 $1.12 + 0.82 - 0.02 + 4.002 = \dots\dots$

استعمل ضرب وقسمة الأعداد النسبية لتكتب كلّ مقدارٍ بأبسط صورة:

7 $1\frac{1}{3} \times (-2\frac{5}{6}) \div 2\frac{4}{9} = \dots\dots$

8 $\frac{54}{7} \div \frac{-9}{14} \times \frac{-5}{24} = \dots\dots$

الأسئلة (7 - 10)

9 $6.1 \times 3.25 \div (-0.25) = \dots\dots$

10 $0.81 \div 0.9 \times (-0.05) = \dots\dots$

مشابهة للمثال 3)

استعمل ترتيب العمليات على الأعداد النسبية لتكتب كلّ مقدارٍ بأبسط صورة:

11 $\frac{-2}{5} \times \frac{15}{-6} + \frac{1}{3} \times \frac{12}{5} = \dots\dots$

12 $\frac{8}{13} \div \frac{-16}{39} - \frac{7}{15} \div \frac{-21}{10} = \dots\dots$

الأسئلة (11 - 16)

13 $\frac{2}{9} \div \frac{4}{27} \times \frac{1}{-4} + \frac{7}{16} = \dots\dots$

14 $\frac{12}{7} - \frac{-2}{17} \times \frac{34}{-5} \div \frac{8}{15} = \dots\dots$

مشابهة للمثال 4)

15 $9.02 \times 1.4 - 8.03 \times 0.7 = \dots\dots$

16 $4.9 \div 0.7 + 4.8 \div 0.12 = \dots\dots$

تدرب وحلّ التمرينات

استعمل جمع وطرح الأعداد النسبية لتكتب كلّ مقدارٍ بأبسط صورة:

17 $\frac{1}{6} - \frac{3}{4} + \frac{2}{3} = \dots\dots$

18 $\frac{3}{7} - 1\frac{2}{7} + \frac{5}{3} - \frac{9}{14} = \dots\dots$

19 $2.04 - 8.09 + 3.05 = \dots\dots$

استعمل ضرب وقسمة الأعداد النسبية لتكتب كلّ مقدارٍ بأبسط صورة:

20 $2\frac{1}{6} \times 3\frac{3}{2} \div (-5\frac{3}{2}) = \dots\dots$

21 $0.01 \times 6.4 \div (-0.04) = \dots\dots$

استعمل ترتيب العمليات على الأعداد النسبية لتكتب كلّ مقدارٍ بأبسط صورة:

22 $\frac{5}{-3} \times \frac{24}{45} + \frac{1}{3} \times \frac{-15}{6} = \dots\dots$

23 $\frac{1}{7} \div \frac{5}{42} \times \frac{1}{-5} - \frac{1}{12} = \dots\dots$

24 $-4.09 \times 3.2 - 5.03 \times 0.8 = \dots\dots$

تدرب وحلّ مسائل حياتية



25 **كرة قدم:** بطولة كأس العالم لكرة القدم هي أهم مسابقة كرة قدم دولية يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). أقيمت البطولة لأول مرة عام 1930م، وتقام كل 4 سنوات حتى الآن أقيمت البطولة 20 مرة وفاز المنتخب البرازيلي بالكأس 5 مرات والمنتخب الإيطالي فاز 4 مرات. ما الفرق بين نسبي فوز الفريقين إلى العدد الكلي لتنظيم البطولة؟



26 **رياضة الجري:** قطع العداء الذي فاز بالمرتبة الأولى في سباق الجري 2000m الدورة الواحدة (400m) بمدة 44.2sec، وقطع العداء الذي فاز بالمرتبة الثانية الدورة الواحدة بمدة 46.5sec، فما الفرق بين الوقت الكلي لقطع مسافة السباق للعدائين؟



27 **طقس:** كانت درجة الحرارة في منطقة القطب الشمالي 48- درجة سليزية، وبدأت درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي في الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 بعد الظهر بمعدل 0.5 درجة سليزية بالساعة، ثم عاودت بالانخفاض بمعدل 1.5 درجة سليزية بالساعة، كم أصبحت درجة الحرارة عند الساعة 6 عصراً؟

فكّر

28 **فكّر:** استعمل ترتيب العمليات على الأعداد النسبية لتكتب كلّ مقدار بأبسط صورة:

$$i) \left(\frac{1}{3}\right)^{-6} + 2\frac{1}{10} \left(\times \frac{4}{5} \div 2\frac{8}{5} = \dots\dots \quad ii) \left(\frac{1}{2}\right)^8 - 3\frac{1}{3} \left(\div 3\frac{2}{3} \div \frac{-15}{7} = \dots\dots$$

29 **أصحّ الخطأ:** بسط جمال الجملة العددية وكتبها بأبسط صورة:

$$\frac{3}{7} \div \frac{9}{28} \times \frac{1}{-2} \div \frac{4}{-9} = 6$$

حدد خطأ جمال ووضّحه .

30 **حسّ عدديّ:** ما العدد الذي يجب كتابته في المربع لتكون الجملة العددية التالية صحيحة:

$$i) \left(\frac{1}{-2} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \times \frac{1}{\square}\right) = 0 \quad ii) \left(\frac{1}{5} \div \frac{2}{5} - \frac{1}{3} \div \frac{\square}{3}\right) = 0$$

اكتب

المقدار بأبسط صورة باستعمال ترتيب العمليات:

$$-1.03 \times 4.2 - 7.07 + 0.6 \times 2.5 = \dots\dots$$

تَعَلَّم



الباندا العملاقة أو الدب الصيني حيوانٌ ضخمٌ من عائلة الدب موطنه الأصلي في الصين. تشتهر بلونها الأسود والأبيض وفروها السميك الذي يحميها من البرد. يأكل الباندا ما يعادل 10^{-1} من وزنه يومياً. ما عدد الكيلوغرامات التي يأكلها دب الباندا الذي يزن 110kg؟

فكرة الدرس

- كيفية حساب مقادير تتضمن أسساً سالبة.
- والتعبير عن عدد بالصورة العلمية.
- المفردات
- الأس (القوة).
- الصورة العلمية.
- الصورة الرقمية.

Negative Powers of Numbers

[1-2-1] القوى السالبة للعدد

تعلمت سابقاً كيفية كتابة العدد بالقوى (الأسس) الموجبة $10^1 = 10$, $10^2 = 100$, $10^3 = 1000$,

وبالأسلوب نفسه سوف تتعرف إلى كتابة العدد بالقوى (الأسس) السالبة :

$$10^{-1} = \frac{1}{10} , 10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} , 10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} , \dots\dots\dots$$

مع ملاحظة: أي عدد (عدا الصفر) للأس 0 يساوي 1 . العدد 1 لأي أس موجب أو سالب يساوي 1 .

العدد (-1) لأي أس زوجي يساوي 1 ولأي أس فردي يساوي -1 .

$$8^0 = 1 , (-3)^0 = 1 , 1^5 = 1 , 1^{-7} = 1 , (-1)^2 = 1 , (-1)^{-2} = 1 , (-1)^3 = -1 , (-1)^{-3} = -1$$

مثال 1)

جد عدد الكيلوغرامات التي يأكلها دب الباندا يومياً.

$$10^{-1} = \frac{1}{10}$$

$$110 \times \frac{1}{10} = 11\text{kg}$$

يأكل الباندا عُشْرَ وزنه يومياً

لذا يأكل الباندا 11kg يومياً

مثال 2)

احسب الأسس السالبة لكل ما يأتي:

i) $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$

ii) $5^{-3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}$

iii) $2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$

iv) $(-2)^{-2} = \frac{1}{(-2)^2} = \frac{1}{4}$

v) $(-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = \frac{1}{-2 \times -2 \times -2} = -\frac{1}{8}$

استعمل ترتيب العمليات لتحسب كل ما يأتي :

vi) $(\frac{1}{2} + 2^{-3} - (-2)^{-4}) \cdot \frac{1}{2^4}$

vii) $(4^{-3} - (-6)^0 - 8^{-2}) \cdot \frac{1}{4^3} = 1 - \frac{1}{8^2}$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{8} - \frac{1}{16}$$

$$= \frac{8+2-1}{16} = \frac{9}{16}$$

$$= \frac{1}{64} - 1 - \frac{1}{64}$$

$$= -1$$

Scientific Notation of Number

تعلمت سابقاً كيفية كتابة الأعداد الكبيرة بالصورة العلمية كعدد صحيح مضروب في إحدى القوى الموجبة للعدد $1400000 = 14 \times 10^5$ ، والآن سوف نستعمل الصورة العلمية للعدد لكتابة الأعداد التي قيمتها المطلقة كبيرة جداً أو صغيرة جداً، ولكتابة الأعداد العشرية من الصورة العلمية للصورة الرقمية نلاحظ الآتي :

- 1) إذا ضرب العدد في إحدى القوى الموجبة للعدد 10 فإن الفارزة العشرية تتحرك إلى اليمين .
- 2) إذا ضرب العدد في إحدى القوى السالبة للعدد 10 فإن الفارزة العشرية تتحرك إلى اليسار .
- 3) عدد المراتب التي تتحرك بها الفارزة العشرية هي القيمة المطلقة للأس .

(مثال 3) اكتب الأعداد التالية بالصورة الرقمية :

$$i) (7.3 \times 10^3 = 7\underline{300})$$

الفارزة العشرية تحركت ثلاث مراتب إلى اليمين

$$ii) (2.64 \times 10^5 = 2\underline{64000})$$

الفارزة العشرية تحركت خمس مراتب إلى اليمين

$$iii) (9.17 \times 10^{-2} = 0.\underline{09}17)$$

الفارزة العشرية تحركت مرتبتين إلى اليسار

$$vi) (52.6 \times 10^{-4} = 0.\underline{0052}6)$$

الفارزة العشرية تحركت أربع مراتب إلى اليسار

لتحويل الأعداد العشرية من الصورة الرقمية إلى الصورة العلمية نلاحظ الآتي:

- 1) حرك الفارزة العشرية ليكون موقعها على يمين أول مرتبة غير صفرية من اليسار .
- 2) عد المراتب التي حركت بها الفارزة العشرية .
- 3) جد قوة العدد عشرة، فإذا كانت القيمة المطلقة للعدد الأصلي بين الصفر والواحد فإن الأس يكون سالباً . وإذا كان العدد أكبر من واحد فإن الأس يكون موجباً .

(مثال 4) اكتب الأعداد التالية بالصورة العلمية:

$$i) (7\underline{2300} = 7.23 \times 10000 \\ = 7.23 \times 10^4)$$

الفارزة العشرية تحركت أربع مراتب إلى اليسار

بما أن 72300 أكبر من 1 لذا فإن الأس موجب

$$ii) (8\underline{02000} = 8.02 \times 100000 \\ = 8.02 \times 10^5)$$

الفارزة العشرية تحركت خمس مراتب إلى اليسار

بما أن 802000 أكبر من 1 لذا فإن الأس موجب

$$iii) (0.\underline{002}5 = 2.5 \times 0.001 \\ = 2.5 \times 10^{-3})$$

الفارزة العشرية تحركت ثلاث مراتب إلى اليمين

بما أن 0.0025 أكبر من 0 وأصغر من 1 لذا فإن الأس سالب

$$iv) (0.\underline{0003}71 = 3.71 \times 0.0001 \\ = 3.71 \times 10^{-4})$$

الفارزة العشرية تحركت أربع مراتب إلى اليمين

بما أن 0.000371 أكبر من 0 وأصغر من 1 لذا فإن الأس سالب

تأكّد من فهمك

احسب الأسس السالبة لكلّ مما يأتي :

1 $4^{-2} = \dots$

2 $2^{-3} = \dots$

3 $3^{-4} = \dots$

4 $-2^{-2} = \dots$

5 $-2^{-3} = \dots$

6 $-5^{-4} = \dots$

7 $-1^{-5} = \dots$

8 $-7^{-1} = \dots$

9 $-9^0 = \dots$

(الأسئلة 1 - 9)
مشابه للمثال 1)

استعمل ترتيب العمليات لتحسب كلاً مما يأتي :

10 $\frac{1}{3} + 3^{-2} - 3^{-3} = \dots$

11 $2^{-4} - 6^0 - 5^{-1} = \dots$

12 $-4^{-2} + 1^3 - 6^{-2} = \dots$

13 $8^0 - 3^2 - 1^{-4} = \dots$

(الأسئلة 10 - 13)
مشابه الى المثال 2)

اكتب الأعداد التالية بالصورة الرقمية :

14 $4.2 \times 10^4 = \dots$

15 $5.14 \times 10^6 = \dots$

16 $2.16 \times 10^{-3} = \dots$

17 $15.8 \times 10^{-5} = \dots$

(الأسئلة 14 - 17)
مشابه الى المثال 3)

اكتب الأعداد التالية بالصورة العلمية :

18 $72300 = \dots$

19 $802000 = \dots$

20 $0.0025 = \dots$

21 $0.000371 = \dots$

(الأسئلة 18 - 21)
مشابه الى المثال 4)

احسب الأسس السالبة لكلّ مما يأتي :

22 $7^{-2} = \dots$

23 $-3^{-2} = \dots$

24 $1^{-4} = \dots$

25 $-1^0 = \dots$

تدرب وحلّ التمرينات

استعمل ترتيب العمليات لتحسب كلاً مما يأتي :

26 $\frac{1}{4} + 5^{-2} - 1^{-3} - \frac{1}{2} = \dots$

27 $6^{-2} - 4^{-2} - 8^{-2} - \frac{1}{36} = \dots$

اكتب الأعداد التالية بالصورة الرقمية :

28 $6.3 \times 10^3 = \dots$

29 $23.7 \times 10^{-2} = \dots$

اكتب الأعداد التالية بالصورة العلمية :

30 $52100 = \dots$

31 $0.0035 = \dots$

تدرب وحل مسائل حياتية



32 **العنكبوت:** العنكبوت تغزل خيط الحرير وهذا الخيط له وظائف وحسب الاستعمال وتصنع اقراصاً مخاطية لاصقة attachment discs التي تعمل بوضعها أوتاداً صلبه جداً تساعد على لصق الشبكة العنكبوتية في اماكن واسطح مختلفة ويبلغ قطر خيط الحرير 3×10^{-3} mm اكتب قطر خيط الحرير بالصورة الرقمية .



33 **حيتان:** تقطع الحيتان مسافة $2^5 \times 5^3$ km في كل رحلة تهاجر فيها ولكن الحوت الرمادي يقطع مسافة $2^4 \times 3 \times 5^3$ km زيادة عن الحيتان الاخرى في كل رحلة. اكتب المسافة بالصورة الرقمية التي يقطعها الحوت الرمادي في كل رحلة.



34 **فضاء:** كوكب الأرض هو ثالث كواكب المجموعة الشمسية التي تعد جزءاً من مجرة درب التبانة، ويتخذ الأرض شكلاً إهليلجياً، ويعد حجمه صغيراً جداً عند مقارنته بحجم الشمس، المسافة التقريبية بين الارض والشمس 140 000 000 000 m اكتب المسافة بالصورة العلمية.

فكر

35 **تحذ:** اكتب الأعداد التالية بالصورة الرقمية :

i) $\left(\frac{1}{4} \times 10^{-5}\right) = \dots\dots$ ii) $\left(\sqrt{\frac{1}{25}} \times 10^{-3}\right) = \dots\dots$ iii) $\left(\sqrt{\frac{9}{16}} \times 10^{-4}\right) = \dots\dots$

36 **أصحح الخطأ:** استعملت سماح ترتيب العمليات على الأعداد النسبية وكتبت الآتي :

$$)-3(-2 -)-1(0 + 1^{-2} - \frac{1}{9}) = 1$$

حدد خطأ سماح وصححه.

37 **حسّ عددي:** هل أن العدد $\sqrt{0.09} \times 10^{-2}$ يقع بين العددين 0.004 . 0.005 ؟ وضح اجابتك.

أكتب

$$2.17 \times 10^{-3} + 3.83 \times 10^{-3} = \dots\dots\dots$$

ناتج جمع العددين بالصورة العلمية:



تَعَلَّم

الأسد حيوانٌ من الثدييات من فصيلة السنوريات وأحد السنوريات الأربعة الكبيرة المنتمية إلى جنس النمر Panthera إذا كان الأسد البالغ يحتاج إلى 2^3kg من اللحم في الوجبة الواحدة، فكم كيلوغرام يحتاج 2^4 أسد في الوجبة الواحدة ؟

فكرة الدرس

- ضرب قوتين لهما الأساس نفسه.
- قسمة قوتين لهما الأساس نفسه.
- رفع قوة الى قوة.
- المفردات
- الاساس.
- الأس.

[1-3-1] ضرب قوتين لهما نفس الأساس

Product of two Powers with the same Base

تعرفت سابقاً إلى القوى الموجبة والسالبة للعدد، والآن سوف تتعرف إلى قوانين الأسس:

- 1) ضرب قوتين لهما الأساس نفسه $a^n \times a^m = a^{n+m}$ إذ أن $a \neq 0$, $a \in \mathbb{Q}$, $n, m \in \mathbb{Z}$, 0 أي عند ضرب قوتين لهما الأساس نفسه الناتج يكون الأساس نفسه مرفوعاً إلى حاصل جمع الأسين .

مثال (1) جد عدد الكيلوغرامات التي يحتاج إليها 2^4 أسداً في الوجبة الواحدة.

$$2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$$

ضع الأساس نفسه وأجمع الأسس

لذا يحتاج 2^4 اسداً إلى 2^7 كيلوغراماً من اللحم.

مثال (2) بسط واكتب ناتج الضرب بوصفه قوة واحدة:

i) $5^6 \times 5^2 = 5^{6+2} = 5^8$

ii) $7^9 \times 7^{-3} = 7^{9-3} = 7^6$

iii) $3^{-2} \times 3^{-5} = 3^{-2-5} = 3^{-7}$

iv) $8 \times 2^{-7} = 2^3 \times 2^{-7} = 2^{-4}$

v) $11^2 \times 11^{-6} \times 11^{-5} = 11^{2-6-5} = 11^{-9}$

vi) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-6} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3-3-6} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-12} = 2^{12}$

vii) $12 \times 8 \times 3^{-4} = 2^2 \times 3 \times 2^3 \times 3^{-4} = 2^2 \times 2^3 \times 3 \times 3^{-4}$

$$= 2^{2+3} \times 3^{1-4} = 2^5 \times 3^{-3}$$

viii) $4^{-3} \times \frac{1}{4} = 4^{-3} \times 4^{-1} = 4^{-3-1} = 4^{-4} = \frac{1}{4^4}$

2-3-1] قسمة قوتين لهما الأساس نفسه

Divide Two Powers with the same Base

2) قسمة قوة على قوة لهما الأساس نفسه : $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ إذ أن $a \in \mathbb{Q}$, $n, m \in \mathbb{Z}$.
أي عند قسمة قوة على قوة لهما الأساس نفسه الناتج يكون الأساس نفسه مرفوع الى حاصل طرح أس المقام من أس البسط .

مثال 3) بسط واكتب ناتج القسمة بوصفها قوة واحدة:

$$i) \left(\frac{7^6}{7^4} = 7^{6-4} = 7^2 \right)$$

$$ii) \left(\frac{3^{-5}}{3^{-9}} = 3^{-5-(-9)} = 3^{-5+9} = 3^4 \right)$$

$$iii) \left(\frac{2^{-7}}{16} = \frac{2^{-7}}{2^4} = 2^{-7-4} = 2^{-11} \right)$$

$$iv) \left(\frac{54}{12} = \frac{2 \times 3^3}{2^2 \times 3} = 2^{1-2} \times 3^{3-1} = 2^{-1} \times 3^2 \right)$$

$$vi) \left(\frac{\frac{1}{8}^3}{\frac{1}{8}^5} = \frac{8^{-3}}{8^{-5}} = 8^{-3+5} = 8^2 \right)$$

$$vi) \left(\frac{-5(2 \times 5^0 \times) - 5(7)}{5^6} = 5^2 \times 5^0 \times -5^7 \times 5^{-6} \right. \\ \left. = -5^{2+0+7-6} = -5^3 \right)$$

3-3-1] رفع قوة الى قوة

Raise a Power to a Power

3) رفع قوة الى قوة ثانية للأساس نفسه : $a^n(m) = a^{nm}$ إذ أن $a \neq 0$ $a \in \mathbb{Q}$, $n, m \in \mathbb{Z}$.
عند رفع قوة الى قوة ثانية للأساس نفسه يكون الناتج الأساس نفسه مرفوعاً الى حاصل ضرب الأسس الأول بالأس الثاني .

مثال 4) بسط واكتب الناتج بوصفه قوة واحدة:

$$i) (7^3)^4 = 7^{3 \times 4} = 7^{12}$$

$$ii) (9^{-5})^6 = 9^{-5 \times 6} = 9^{-30}$$

$$iii) (10^3 \times 10^{-8})^{-2} = 10^{-5 \times (-2)} = 10^{10}$$

$$iv) (72)^2 = (8 \times 9)^2 = 2^3 \times 3^2(2)$$

$$= 10^{-5 \times -2} = 10^{10}$$

$$= (2^3(2 \times) 3^2(2) = 2^6 \times 3^4)$$

$$vi) \left(\frac{-7(3 \times 7^8 \times) - 49(2)}{7^{-4} \times -7^3(5)} = \frac{-7(3 \times 7^8 \times) - 7^2(2)}{7^{-4} \times -7^{3 \times 5}} = \frac{-7^{3+8} \times -7^{2 \times 2}}{7^{-4} \times -7^{15}} \right. \\ \left. = \frac{-7^{11} \times 7^4}{-7^{-4+15}} = \frac{-7^{11+4}}{-7^{11}} \right. \\ \left. = \frac{-7^{15}}{-7^{11}} = 7^{15-11} = 7^4 \right)$$

تأكّد من فهمك

بسّط واكتب ناتج الضرب بوصفه قوةً واحدة:

1 $2^4 \times 2^2 = \dots$

2 $9^0 \times 9^{-5} = \dots$

(الأسئلة 1-8)
مشابهة للمثال 2)

3 $7^{-3} \times 7^{-5} = \dots$

4 $16 \times 2^{-8} = \dots$

5 $13^{-4} \times (-13^3 \times 13^6) = \dots$

6 $\frac{1}{3}(-2 \times \frac{1}{3}(5 \times \frac{1}{3}(-1) = \dots$

7 $32 \times 3^4 \times 24 = \dots$

8 $9^{-6} \times \frac{1}{9}(7 = \dots$

بسّط واكتب ناتج القسمة بوصفه قوةً واحدة:

9 $\frac{5^3}{5^7} = \dots$

10 $\frac{2^{-6}}{2^{-1}} = \dots$

11 $\frac{3^{-3}}{27} = \dots$

(الأسئلة 9-14)
مشابهة للمثال 3)

12 $\frac{6 \times 3^{-2}}{2^4 \times 3} = \dots$

13 $\frac{\frac{1}{25}(4)}{\frac{1}{25}(8)} = \dots$

14 $\frac{-6(3 \times 6^{-6} \times)-6(0)}{6^9} = \dots$

بسّط واكتب الناتج بوصفه قوةً واحدة:

15 $5^2(6 = \dots$

16 $8^{-3}(4 = \dots$

17 $10^{-7} \times 10^6(-3 = \dots$

(الأسئلة 15-20)
مشابهة للمثال 4)

18 $3^2(-2 = \dots$

19 $\frac{-1(3 \times 1^8)}{)-1(4(6} = \dots$

20 $\frac{-3(2 \times 3^5)}{)-3(3(-1} = \dots$

تدرب وحلّ التمرينات

بسّط واكتب ناتج الضرب بوصفه قوةً واحدة:

21 $6^{-7} \times 6^3 = \dots$

22 $7^{-1} \times 7^{-4} = \dots$

23 $27 \times 3^{-6} = \dots$

24 $8^{-7} \times \frac{1}{8}(7 = \dots$

25 $\frac{1}{5}(-3 \times \frac{1}{5}(7 \times \frac{1}{5}(-2 = \dots$

بسّط واكتب ناتج القسمة بوصفه قوةً واحدة:

26 $\frac{7^{-2}}{7^7} = \dots$

27 $\frac{6^{-4}}{6^{-3}} = \dots$

28 $\frac{48 \times 3^{-4}}{3^3 \times 2} = \dots$

29 $\frac{\frac{1}{49}(-3)}{\frac{1}{49}(6} = \dots$

30 $3^4(-3 = \dots$

31 $6^{-2}(-5 = \dots$

32 $\frac{-2(2 \times 2^6 \times)-4(5)}{2^{-4} \times))-2(5(3} = \dots$


تدرب وحل مسائل حياتية



33 **الفهد:** يعدُّ الفهد الصياد الذي يعيش في قارتي آسيا وأفريقيا، من الحيوانات الثديية المعرضة للإنقراض والتي تنتمي إلى عائلة السنوريات أو القططيات وهو أسرع الحيوانات الأرضية على الإطلاق، إذ تصل سرعته القصوى إلى $\frac{2}{10} \cdot 3 \text{ m/min}$. اكتب عدد الامتار التي يقطعها الفهد خلال 2^3 min .



34 **إنتاج:** انتج العراق $2^{-2} \cdot \frac{3}{10}$ برميلاً من النفط الخام خلال 9 أشهر في إحدى السنوات، اكتب إنتاج العراق من النفط بالصورة الرقمية.



35 **مكعب روبيك:** مكعب روبيك هو لغز يتمثل في مكعب ثلاثي الأبعاد يتكون من 6 أوجه وكل وجه يحمل 3^2 ملصقات باللون نفسه وتشتمل أوجه مكعب روبيك على الألوان الرئيسية وهي الأحمر والأبيض والأخضر والأزرق والبرتقالي والأصفر مخترع مكعب روبيك هو النحات المجري إرنو روبيك. اكتب عدد الملصقات في 6 مكعبات على صورة اعداد ذات قوة واحدة.

فكر

36 **تحذّر:** بسط واكتب الناتج بوصفه قوة واحدة:

$$i) \frac{10(5 \times 10^{-4} \times) - 10(2^{-2})}{10^{-7} \times} - 10(2^{-6}) = \dots\dots$$

$$ii) (\sqrt{\frac{1}{64}} \times 2^{-4} \times) - 4(7) = \dots\dots$$

37 **أصحح الخطأ:** بسط جميل المقدار التالي وكتب الناتج كما يأتي :

$$\frac{1}{9}(-7 \times) \frac{1}{3}(5 \times) \frac{1}{27}(-1) = 3^{-14}$$

حدد خطأ جميل وصححه .

38 **حسّ عدديّ:** هل أن العدد $\frac{16 \times 2^{-6}}{2^0 \times 2}$ يقع بين العددين 3^{-2} ، 3^{-1} ؟ وضح اجابتك.

اكتب

$$36^{-5} \times -2(8 \times) - 3(8) = \dots\dots$$

الناتج على صورة كسرٍ اعتياديّ :

الكسور العشرية الدورية والصورة العلمية للعدد) استعمال الحاسبة)
Recurring Decimal Fractions and Scientific Notation of
Number)using Calculator(

الدرس
[1-4]

تَعَلَّم



الزرافة من الحيوانات الثديية، التي تتغذى على الأعشاب، وأوراق الأشجار، والفواكه، والخضروات، وتعدُّ الزرافة أطول الحيوانات على الإطلاق. الزرافة تشرب الماء مرتين في الاسبوع، فإذا شربت احدى الزرافات $\frac{15}{2}$ لتر في المرة الاولى وفي المرة الثانية $\frac{17}{3}$ لتر. اكتب عدد ألتارالماء التي شربتها الزرافة في الاسبوع بصورة كسر عشري .

فكرة الدرس

استعمال الحاسبة في تبسيط جملةٍ عدديةٍ تحتوي على:

- كسور عشرية دورية
- وصورة علمية للعدد.

المفردات

- حاسبة.
- كسرٍ عشريٍّ دوريٍّ.

[1-4-1] تبسيط جملةٍ عدديةٍ تحتوي على كسورٍ عشريةٍ دوريةٍ باستعمال الحاسبة
Using Calculator to Simplify Numerical Sentence Contain Recurring
Decimal Fractions.

تعلمت سابقا كيفية تبسيط جملةٍ عدديةٍ باستعمال ترتيب العمليات على الأعداد النسبية، والآن سوف تتعلم كيفية تبسيط جملةٍ عدديةٍ تحتوي على كسور عشرية دورية (استعمال الحاسبة (وكالاتي : إذا كانت الجملة العددية مكتوبة على صورة كسور اعتيادية فقط، فيمكن اجراء العمليات كما تعلمت سابقاً ثم كتابة الناتج على شكل كسر عشري منتهٍ أو دوري.

$$\frac{10}{3} + \frac{2}{5} = \frac{50 + 6}{15} = \frac{56}{15} = 3.7333... = 3.7\bar{3}$$

إما إذا كانت الجملة مكتوبة على صورة كسور عشرية دورية فسوف تترك الى المراحل اللاحقة .

مثال 1) اكتب عدد التار الماء التي شربتها الزرافة في الاسبوع بالصورة العشرية.

$$\begin{aligned} \frac{15}{2} + \frac{17}{3} &= \frac{15 \times 3 + 17 \times 2}{6} \\ &= \frac{45 + 34}{6} \\ &= \frac{79}{6} = 13.1666... = 13.1\bar{6} \end{aligned}$$

اجمع الكسور الاعتيادية

بسّط الناتج بأبسط صورة

اكتب الناتج على شكل كسر عشري دوري

مثال 2) استعمال الحاسبة لتكتب ناتج الجمع و الطرح على صورة كسرٍ عشريٍّ:

i) $\frac{8}{5} + \frac{13}{6} = \frac{48 + 65}{30} = \frac{113}{30} = 3.7666... = 3.7\bar{6}$

ii) $\frac{9}{2} + \frac{21}{8} - \frac{5}{12} = \frac{57}{8} - \frac{5}{12} = \frac{171 - 10}{24} = \frac{161}{24} = 6.708333... = 6.708\bar{3}$

iii) $\frac{6}{13} - \frac{11}{3} - \frac{10}{6} = \frac{36 - 286 - 130}{78} = -\frac{380}{78} = -4.8717948717948... = -4.871794\bar{8}$

مثال 3) استعمال الحاسبة لتكتب ناتج الضرب والقسمة على صورة كسر عشري:

$$i) \left(\frac{5}{3} \times \frac{12}{15} = \frac{5 \times 12}{3 \times 15} = \frac{4}{3} = 1.333... = 1.\bar{3} \right)$$

$$ii) \left(\frac{8}{9} \div \frac{48}{-45} = \frac{8}{9} \times \frac{-45}{48} = \frac{8 \times -45}{9 \times 48} = \frac{-5}{6} = -0.8333... = -0.8\bar{3} \right)$$

$$iii) \left(\frac{6}{5} \times \frac{13}{12} \div \frac{39}{4} = \frac{13}{10} \div \frac{39}{4} = \frac{13}{10} \times \frac{4}{39} = \frac{13 \times 4}{10 \times 39} = \frac{2}{15} = 0.1333... = 0.1\bar{3} \right)$$

$$iv) \left(\frac{17}{6} \div \frac{34}{42} \times \frac{-7}{6} = \frac{17}{6} \times \frac{42}{34} \times \frac{-7}{6} = \frac{7}{2} \times \frac{-7}{6} = -\frac{49}{12} = -4.08333... = -4.08\bar{3} \right)$$

2-4-1] تبسيط جملة عددية تحتوي على اعداد بالصورة العلمية باستعمال الحاسبة
Using Calculator to Simplify Numerical Sentence Contain Scientific Notation of Numbers

تعلمت سابقا كيفية كتابة العدد بالصورة العلمية من الصورة القياسية (والعكس). والآن سوف تتعلم كيفية تبسيط جملة عددية تحتوي على ضرب وقسمة أعداد بالصورة العلمية (استعمال الحاسبة وكالاتي):

- 1) أجزى العمليات على الكسور العشرية أولاً وحسب الترتيب (باستعمال الحاسبة).
- 2) جد ناتج قوى العشرة.
- 3) حرك الفارزة بما يتطلبه الناتج.

مثال 4) استعمال الحاسبة لتكتب ناتج الضرب والقسمة بالصورة العلمية للعدد:

$$i) (3.1 \times 10^4) (7.6 \times 10^{-3}) (=) 3.1 \times 7.6 () 10^4 \times 10^{-3} \text{ (احصز ما بين الاقواس العمليات ذات الأولوية)}$$

جد ناتج قسمة الكسور العشرية وناتج قوى العشرة

$$= 23.56 \times 10$$

$$= 2.356 \times 10^2 \text{ (حرك الفارزة بحيث يبقى العدد الصحيح من مرتبة واحدة)}$$

$$ii) (1.05 \times 10^{-5}) (0.9 \times 10^{-4}) (=) 1.05 \times 0.9 () 10^{-5} \times 10^{-4}$$

$$= 0.945 \times 10^{-9} = 9.45 \times 10^{-10}$$

$$iii) (12.5 \times 10^{-3}) (9.08 \times 10^7) (=) 12.5 \times 9.08 () 10^{-3} \times 10^7 (=) 113.5 \times 10^4 = 1.135 \times 10^6$$

$$iv) \left(\frac{7.29 \times 10^6}{0.09 \times 10^4} = \right) 7.29 \div 0.09 () 10^6 \times 10^{-4}$$

$$= 81 \times 10^2$$

$$= 8.1 \times 10^3$$

احصز ما بين الاقواس العمليات ذات الأولوية

جد ناتج قسمة الكسور العشرية وناتج قوى العشرة

حرك الفارزة بحيث يبقى العدد الصحيح من مرتبة واحدة

$$v) \left(\frac{2.25 \times 10^{-7}}{0.005 \times 10^{-2}} = \right) 2.25 \div 0.005 () 10^{-7} \times 10^2 (=) 450 \times 10^{-5} = 4.5 \times 10^{-3}$$

تأكد من فهمك

استعمل الحاسبة لتكتب ناتج الجمع و الطرح على صورة كسرٍ عشريٍّ:

1 $\frac{2}{3} - \frac{5}{8} = \dots\dots$

2 $\frac{1}{3} + \frac{5}{6} = \dots\dots$

(الأسئلة 1- 4)

3 $\frac{7}{2} + \frac{9}{4} - \frac{13}{12} = \dots\dots$

4 $\frac{21}{5} - \frac{17}{10} - \frac{3}{11} = \dots\dots$

(مشابهة الى المثال)2

استعمل الحاسبة لتكتب ناتج الضرب والقسمة على صورة كسرٍ عشريٍّ:

5 $\frac{4}{7} \times \frac{21}{12} = \dots\dots$

6 $\frac{6}{11} \div \frac{42}{-22} = \dots\dots$

(الأسئلة 5 - 8)

7 $\frac{15}{9} \times \frac{36}{75} \div \frac{12}{35} = \dots\dots$

8 $\frac{13}{5} \div \frac{39}{15} \times \frac{-11}{9} = \dots\dots$

(مشابهة الى المثال)3

استعمل الحاسبة لتكتب ناتج الضرب والقسمة بالصورة العلمية للعدد:

9 $2.7 \times 10^3 \div 6.6 \times 10^{-7} = \dots\dots$

10 $5.08 \times 10^{-6} \div 0.8 \times 10^{-3} = \dots\dots$

(الأسئلة 9 - 12)

11 $\frac{6.25 \times 10^8}{0.5 \times 10^3} = \dots\dots$

12 $\frac{1.69 \times 10^{-6}}{0.13 \times 10^{-2}} = \dots\dots$

(مشابهة الى المثال)4

تدرب وحل التمرينات

استعمل الحاسبة لتكتب ناتج الجمع و الطرح على صورة كسرٍ عشريٍّ:

13 $\frac{1}{3} + \frac{2}{9} = \dots\dots$

14 $\frac{2}{9} + \frac{1}{6} - \frac{7}{6} = \dots\dots$

استعمل الحاسبة لتكتب ناتج الضرب والقسمة على صورة كسرٍ عشريٍّ:

15 $\frac{1}{8} \times \frac{56}{3} = \dots\dots$

16 $\frac{24}{25} \times \frac{5}{4} \div \frac{18}{35} = \dots\dots$

استعمل الحاسبة لتكتب ناتج الضرب والقسمة بالصورة العلمية للعدد:

17 $1.3 \times 10^{-4} \div 9.1 \times 10^{-6} = \dots\dots$

18 $\frac{2.256 \times 10^{-2}}{0.16 \times 10^4} = \dots\dots$

تدرب وحلّ مسائل حياتية



19 **حوت:** الحوت هو أضخم الحيوانات الحية على الإطلاق، بما فيها البرية والبحرية، وهو من الحيوانات الثديية، وضعت انثى الحوت اربعة عجول طول اثنين منهما نسبة لطول الحوت الام هو $\frac{1}{5}$ ، $\frac{4}{15}$ متر. اكتب مجموع طول العجلين بكسرٍ عشري.



20 **سلطة خضار:** عملت سارة صحن سلطة خضار واطافت اليه 4 حبات فراولة وزن كل واحدة $1.5 \times 10^{-2} \text{kg}$ و 12 حبة زيتون وزن الواحدة $0.06 \times 10^{-1} \text{kg}$. اكتب الوزن الكلي المضاف الى السلطة بالصورة العلمية .



21 **تعليق:** كانت نسبة النجاح النهائية للدورين الأول والثاني في احدى المدارس الثانوية $\frac{19}{20}$. ما نسبة النجاح في الدور الثاني إذا كانت نسبة النجاح للدور الأول هو $\frac{19}{25}$ ؟ اكتب العدد بصورة كسرٍ عشري.

فكر

22 **تحذّر:** استعمل الحاسبة لتكتب الناتج على صورة كسرٍ عشري:

$$\text{i) } \left(\frac{3}{7} \times \frac{35}{6} + \frac{10}{13} \times \frac{26}{-6} \right) = \dots \quad \text{ii) } \left(\frac{5}{22} \div \frac{20}{33} - \frac{7}{13} \div \frac{42}{26} \right) = \dots$$

23 **أصحّ الخطأ:** استعملت خلود الحاسبة وكتبت ناتج المقدار كما يأتي:

$$)6.7 \times 10^3)(2.8 \times 10^{-7} (= 1.876 \times 10^{-4}$$

حدد خطأ خلود وصححه .

24 **حسّ عدديّ:** هل أن العدد $\frac{23.5 \times 10^{-3}}{2.35 \times 10^{-2}}$ يقع بين العددين 2 ، 0 ؟ وضح اجابتك.

أكتب

الناتج على صورة كسرٍ عشريّ:

$$\frac{9}{4} \div \frac{63}{-12} \times \frac{-2}{3} = \dots$$

تبسيط الجمل العددية الكسرية

Simplifies Fraction Numerical Sentences

الدرس
1-5

تَعَلَّم



على احدى رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية من بغداد الى اسطنبول، باعت الشركة تذكرة الدرجة الأولى بسعر 5.5×10^5 دينار والدرجة السياحية 46.5×10^4 دينار، إذا كانت الطائرة تتسع 180 كرسيًا، 12 منها للدرجة الأولى والباقي للدرجة السياحية، ما المبلغ الذي تجنيه الشركة إذا بيعت كل التذاكر؟

فكرة الدرس

- تبسيط جملة عددية كسرية تحتوي على جذور وقيم مطلقة وقوى وصورة علمية للعدد.
- المفردات
- جذر.
- مربع كامل.

[1-5-1] تبسيط جملة عددية تحتوي على قوى وصورة علمية للعدد

Simplifies Numerical Sentence Contain Powers and Scientific Notation Number

تعلمت سابقاً كيفية تبسيط جملة عددية تحتوي على ضرب وقسمة فقط لأعداد بالصورة العلمية. والآن سوف تتعلم كيفية تبسيط جملة عددية تحتوي على جمع وطرح فضلاً عن الضرب والقسمة لأعداد بالصورة العلمية وإيجاد ناتج جمع أو طرح حدين يحتويان على صورة علمية للعدد نتبع إحدى الطريقتين:

الطريقة الأولى: مساواة قوى العشرة للحدين وإخراجها بوصفها عاملاً مشتركاً ثم إجراء عملية الجمع أو الطرح للكسرين العشريين بعد حصرهما بين قوسين وكتابة ناتجهما مضروباً في قوى العشرة، ثم تعديل قوى العشرة بما تتطلبه الكتابة بالصورة العلمية.

الطريقة الثانية: كتابة كل عدد بالصورة الرقمية من الصورة العلمية له، ثم إجراء عملية الجمع أو الطرح وبعدها الرجوع العدد إلى الصورة العلمية أو بحسب ما يتطلبه السؤال .

مثال 1) جد المبلغ الذي تجنيه الشركة إذا باعت جميع تذاكر السفر للطائرة .

الطريقة الأولى:

$$46.5 \times 10^4 = 4.65 \times 10^5$$

$$12 \times 5.5 \times 10^5 = 66 \times 10^5$$

$$168 \times 4.65 \times 10^5 = 781.2 \times 10^5$$

$$66 \times 10^5 + 781.2 \times 10^5 = (66 + 781.2) \times 10^5 \\ = 847.2 \times 10^5 = 8.472 \times 10^7$$

مساوات قوى العشرة للحدين

سعر تذاكر الدرجة الأولى

سعر تذاكر الدرجة السياحية

إخراج قوى العشرة بوصفها عاملاً مشتركاً

المبلغ الكلي للتذاكر بالدينار العراقي

الطريقة الثانية:

$$12 \times 5.5 \times 10^5 = 66 \times 10^5 = 6\,600\,000$$

$$168 \times 46.5 \times 10^4 = 7812 \times 10^4 = 78\,120\,000$$

$$6\,600\,000 + 78\,120\,000 = 84\,720\,000$$

$$= 8.472 \times 10^7$$

سعر تذاكر الدرجة الأولى

سعر تذاكر الدرجة السياحية

المبلغ الكلي للتذاكر بالدينار العراقي

كتابة العدد بالصورة العلمية

ملاحظة: يمكنك استعمال الحاسبة في إجراء العمليات على الكسور العشرية.

مثال 2) بسط الجمل العددية الكسرية التالية واكتب الناتج بالصورة العلمية:

$$\begin{aligned} \text{i)} & (4.1 \times 10^{-5} + 0.61 \times 10^{-4} = 4.1 \times 10^{-5} + 6.1 \times 10^{-5} = 10.2 \times 10^{-5} = 1.02 \times 10^{-4}) \\ \text{ii)} & (7.6 \times 10^{-4} - 0.23 \times 10^{-3} = 7.6 \times 10^{-4} - 2.3 \times 10^{-4} = 5.3 \times 10^{-4}) \\ \text{iii)} & (2.3 \times 10^{-2} + 0.176 \times 10^3 = 0.023 + 176 = 176.023 = 1.76023 \times 10^2) \\ \text{iv)} & (300.1 \times 10^{-2} - 0.005 \times 10^4 = 3.001 - 50 = -46.999 = -4.6999 \times 10) \\ \text{v)} & (6.3 \times 10^3) (8.2 \times 10^{-7}) = 6.3 \times 8.2 \times 10^3 \times 10^{-7} = 51.66 \times 10^{-4} = 5.166 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

[1-5-2] تبسيط جملة عددية كسرية تحتوي على جذور وقيم مطلقة وقوى

Simplifies Fractional Numerical Sentence Contain Roots , Absolute Values and Powers

تعلمت سابقا كيفية تبسيط جملة عددية تحتوي على اعداد نسبية باستعمال ترتيب العمليات، والآن سوف تتعلم كيفية تبسيط جملة عددية كسرية تحتوي على جذور وقيم مطلقة وقوى لأعداد وسوف نتبع الخطوات السابقة نفسها التي تعلمتها في تبسيط الجمل العددية وهي :

- 1- تبسيط كل حد من الحدود بأبسط صورة وذلك بالتخلص من الجذور والقيم المطلقة للعدد وتبسيط القوى .
- 2- استعمال ترتيب العمليات لتبسيط المقدم مع إعطاء الأولوية للعمليات داخل الأقواس .

مثال 3) بسط الجمل العددية الكسرية التالية واكتب الناتج بأبسط صورة :

$$\begin{aligned} \text{i)} & \left(\frac{4}{3} - \frac{\sqrt{25}}{\sqrt[3]{27}} - \frac{-2}{\sqrt{16}} = \frac{4}{3} - \frac{5}{3} - \frac{-2}{4} \right) \quad \text{إيجاد قيم الجذور وكتابة الكسور بأبسط صورة} \\ & = \left(\frac{4}{3} - \frac{5}{3} - \frac{-1}{2} \right) \quad \text{حصر العمليات التي لها أولوية بين قوسين} \\ & = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{-2+3}{6} = \frac{1}{6} \quad \text{جمع الكسرين وإيجاد الناتج} \\ \text{ii)} & \left(\frac{1}{23} \right)^{\frac{|-15|}{7}} - \frac{\sqrt[3]{-8}}{-4} \left(-\frac{1}{28} = \frac{1}{23} \right) \frac{15}{7} - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{28} = \frac{1}{23} \right) \frac{30-7}{14} \left(-\frac{1}{28} \right) \\ & = \frac{1}{23} \times \frac{23}{14} \left(-\frac{1}{28} = \frac{1}{14} - \frac{1}{28} = \frac{2-1}{28} = \frac{1}{28} \right) \\ \text{iii)} & \left(\frac{\sqrt[3]{-125}}{36} \times \frac{|-6|}{10} + \frac{9}{4} \div \frac{18}{\sqrt[3]{-8}} \right) = \left(-\frac{5}{36} \times \frac{6}{10} \right) \left(+ \right) \frac{9}{4} \div \frac{18}{-2} \left(= \frac{-1}{12} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{3} \right) \\ \text{iv)} & \left(\frac{1}{3^2} \times 3^4 \div \right) - 3^{(-1 + 3^{-2})} = 3^{-2} \times 3^4 \left(\div \right) - 3^{-1} \left(+ 3^{-2} \right) \\ & = \frac{3^2}{-3^1} + \frac{1}{3^2} = -3 + \frac{1}{9} = \frac{-26}{9} \\ \text{v)} & \left(-1^{(-2 -)} - 8^{(0 + \frac{\sqrt{25}}{3^2})} \div \frac{25}{-12} = 1 - 1 \right) \left(+ \right) \frac{5}{3^2} \times \frac{-12}{25} \left(= 0 \right) \left(+ \right) \frac{-4}{15} \left(= -\frac{4}{15} \right) \end{aligned}$$

تأكّد من فهمك

بسّط الجمل العددية الكسرية التالية واكتب الناتج بالصورة العلمية:

1 $7.3 \times 10^4 + 3.6 \times 10^4 = \dots$

2 $1.5 \times 10^{-3} - 5.42 \times 10^{-3} = \dots$

الأسئلة (1-8)

3 $5.2 \times 10^3 + 0.61 \times 10^5 = \dots$

4 $2.4 \times 10^{-6} + 0.21 \times 10^{-4} = \dots$

مشابهة للمثال (2)

5 $7.6 \times 10^{-5} - 0.23 \times 10^{-4} = \dots$

6 $7.4 \times 10^{-2} + 0.176 \times 10^2 = \dots$

7 $9.9 \times 10^2() 81.8 \times 10^{-2} (= \dots$

8 $5.3 \times 10^4() 7.2 \times 10^{-9} (= \dots$

بسّط الجمل العددية الكسرية التالية واكتب الناتج بأبسط صورة:

9 $\frac{2}{5} - \frac{\sqrt{36}}{\sqrt[3]{-8}} - \frac{3}{\sqrt{25}} = \dots$

10 $\frac{1}{14} \left(\frac{|-11|}{2} - \frac{\sqrt[3]{-64}}{3} \right) - \frac{1}{4} = \dots$

الأسئلة (9-14)

11 $\frac{\sqrt[3]{-216}}{7} \times \frac{|-21|}{12} + \frac{-5}{\sqrt{16}} = \dots$

12 $\frac{\sqrt[3]{-27}}{15} \div \frac{6}{|-5|} + \frac{-7}{\sqrt{144}} = \dots$

مشابهة للمثال (3)

13 $\frac{1}{5^{-2}} \times 5^{-4} \div (-5)^{-3} + 5^{-1} = \dots$

14 $-1(-^4 -) - 9(0 + \frac{\sqrt{49}}{2^3} \div \frac{7}{-12} = \dots$

تدرب وحل التمرينات

بسّط الجمل العددية الكسرية التالية واكتب الناتج بالصورة العلمية:

15 $2.8 \times 10^5 + 1.2 \times 10^5 = \dots$

16 $6.4 \times 10^2 + 0.73 \times 10^4 = \dots$

17 $4.6 \times 10^{-3} - 0.56 \times 10^{-5} = \dots$

18 $8.2 \times 10^{-6}() 9.6 \times 10^2 (= \dots$

بسّط الجمل العددية الكسرية التالية واكتب الناتج بأبسط صورة:

19 $\frac{1}{7} - \frac{\sqrt{64}}{\sqrt[3]{-27}} - \frac{-6}{\sqrt{49}} = \dots$

20 $\frac{\sqrt[3]{-27}}{4} \times \frac{|-8|}{9} + \frac{5}{14} \div \frac{-15}{\sqrt{49}} = \dots$

21 $\frac{1}{7^{-3}} \times 7^{-5} \div (-7)^{-2} + 7^{-1} = \dots$


تدرب وحلّ مسائل حياتية



22 **طحالب:** تنمو الطحالب على سطوح البرك الراكدة والصخور التي على ساحل البركة. إذا كانت كتلة الطحلب على الصخرة الأولى 2.6×10^{-4} Kg والصخرة الثانية 1.7×10^{-5} Kg. ما مجموع كتلة الطحالب على الصخرتين؟



23 **الضوء:** تبلغ المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة 9.46×10^{12} km. ما المسافة التي يقطعها الضوء في 4.5×10^3 سنة؟



● Proton
● Neutron
● Electron

24 **الذرة:** البروتون من مكونات الذرة وله شحنة كهربائية موجبة تعادل تماماً الشحنة التي يحملها الإلكترون إلا أن الإلكترون شحنته سالبة. وكتلة البروتون تقريباً 1.67×10^{-27} kg وكتلة الإلكترون تقريباً 9.11×10^{-31} Kg. ما الفرق بين كتليهما؟

فكر

25 **تحّد:** بسط الجمل العددية الكسرية التالية واكتب الناتج بأبسط صورة:
i) $\frac{\sqrt[3]{-27}}{3^{-2}} \times \frac{|-3(-3)|}{27} - \frac{8}{5} \div \frac{-2^3}{\sqrt{25}} = \dots$ ii) $\frac{7}{16} \div \sqrt{\frac{49}{64}} \times \sqrt[3]{\frac{-8}{27}} \div \frac{15}{-3} = \dots$

26 **أصحّ الخطأ:** استعملت سندس الحاسبة وكتبت ناتج المقدار بالصورة العلمية:

$$)5.4 \times 10^{-4}(3.6 \times 10^{-5}(= 19.44 \times 10^{-5}$$

حدد خطأ سندس وصححه .

27 **حسّ عدديّ:** هل أن العدد $\frac{3.2 \times 10^{-3}}{6.4 \times 10^{-4}}$ يقع في منتصف المسافة بين العددين 0، 10؟ وضح

اجابتك.

اكتب

الناتج على صورة كسرٍ عشريّ: $-1(-4 -) - 5(0 + \frac{5^{-4}}{5^{-3}} \div) - \frac{1}{2}(0 = \dots$

Chapter Test

اختبار الفصل

استعمل ترتيب العمليات على الأعداد النسبية لتكتب كل مقدار بأبسط صورة :

1 $\frac{-8}{22} \times \frac{11}{-4} + \frac{1}{2} \times \frac{11}{4} = \dots$

2 $\frac{9}{5} \div \frac{-22}{25} - \frac{9}{4} \times \frac{-16}{3} = \dots$

3 $\frac{7}{4} - \frac{-5}{12} \times \frac{48}{15} \div \frac{8}{21} = \dots$

4 $6.03 \times 1.5 - 4.03 \times 0.9 = \dots$

استعمل ترتيب العمليات لتحسب كلاً مما يأتي:

5 $\frac{1}{3} + 3^{-2} + (-1)^{-4} \times \frac{1}{6} = \dots$

6 $(-3)^{-3} - 8(0 + 1^3 + \frac{1}{9}) = \dots$

7 $4^{-2} - 2^4 - (-5)^2 - \frac{1}{5} = \dots$

8 $(-4)^0 - (-6)^{-2} + 1^{-4} - \frac{1}{6} = \dots$

اكتب الأعداد التالية بالصورة الرقمية:

9 $3.4 \times 10^4 = \dots$

10 $2.14 \times 10^{-5} = \dots$

11 $8.05 \times 10^{-6} = \dots$

اكتب الأعداد التالية بالصورة العلمية:

12 $720000 = \dots$

13 $0.00012 = \dots$

14 $0.0000066 = \dots$

بسط واكتب ناتج الضرب بوصفه قوة واحدة :

15 $5^{-6} \times 5^2 = \dots$

16 $(-1)^{-4} \times 1^{-3} = \dots$

17 $9^{-5} \times \frac{1}{3} = \dots$

18 $\frac{1}{2}(-1 \times \frac{1}{2})^{-3} \times \frac{1}{2} = \dots$

19 $12^{-3} \times (-3)^4 \times 3^5 = \dots$

بسط واكتب الناتج بوصفه قوة واحدة :

20 $\frac{5^{-4}}{5^9} = \dots$

21 $7^{-3(-2)} = \dots$

22 $\frac{50 \times 5^{-6}}{5^3 \times 8} = \dots$

23 $\frac{(-3)^4 \times 3^3 \times (-9)^5}{3^{-6} \times (-3)^4} = \dots$

24 $\frac{(-8)^3 \times 2^{-2} \times (-4)^{-2}}{2^{-7} \times 2^3} = \dots$

استعمل الحاسبة لتكتب الناتج على صورة كسرٍ عشريٍّ:

25 $\frac{1}{5} + \frac{3}{10} = \dots$

26 $\frac{2}{3} - \frac{5}{6} = \dots$

27 $\frac{2}{7} - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \dots$

28 $\frac{1}{6} \times \frac{48}{3} = \dots$

29 $\frac{2}{-7} \div \frac{18}{35} = \dots$

30 $\frac{3}{5} \times \frac{7}{15} \div \frac{14}{35} = \dots$

استعمل الحاسبة لتكتب ناتج الضرب والقسمة بالصورة العلمية للعدد :

31 $(3.5 \times 10^{-6}) (8.1 \times 10^{-3}) = \dots$

32 $\frac{7.29 \times 10^7}{0.09 \times 10^3} = \dots$

بسط الجمل العددية الكسرية التالية واكتب الناتج بأبسط صورة :

33 $\frac{\sqrt[3]{-27}}{5} \times \frac{|-35|}{9} + \frac{2}{28} \times \frac{-7}{\sqrt[3]{8}} = \dots$

34 $\frac{6}{\sqrt{49}} \div \frac{|-54|}{-7} - \frac{\sqrt[3]{-125}}{3} \times \frac{-15}{6} = \dots$

The Real Numbers

الأعداد الحقيقية

- الدرس [1-2] مفهوم الأعداد الحقيقية وتمثيلها على مستقيم الأعداد.
- الدرس [2-2] خصائص الأعداد الحقيقية.
- الدرس [3-2] تبسيط الجمل العددية التي تحتوي على جذور تربيعية.
- الدرس [4-2] تطبيقات على نظرية فيثاغورس.
- الدرس [5-2] المستوى الاحداثي.

(الحرباء) خمائليون Chameleon حيوان بيوض من الزواحف، توجد في كل أنحاء العالم تقريباً، تعرف الحرباء بقدرتها على تغيير لونها، ويبلغ أكبر طول لذكر الحرباء 68.5cm، إن هذا العدد هو عدد نسبي ويمكن كتابته بصيغة كسر اعتيادي أو عدد كسري.

استعمل جمع وطرح الأعداد النسبية لتكتب كل مقدار بأبسط صورة:

- 1 $\frac{1}{3} - \frac{2}{5} + \frac{4}{2} = \dots\dots$ 2 $3\frac{1}{2} + 1\frac{2}{4} - \frac{7}{2} = \dots\dots$ 3 $\frac{2}{7} - 2\frac{1}{6} - \frac{5}{12} = \dots\dots$
 4 $3.12 - 3.07 + 1.5 = \dots$ 5 $0.14 + 0.92 - 0.76 = \dots$ 6 $5.12 - 0.37 - 6.96 = \dots$

استعمل ضرب وقسمة الأعداد النسبية لتكتب كل مقدار بأبسط صورة:

- 7 $2\frac{1}{4} \times 3\frac{1}{2} \div 1\frac{1}{4} = \dots$ 8 $\frac{22}{5} \div \frac{-11}{15} \times \frac{-1}{3} = \dots$ 9 $2.5 \times 4.05 \div (-1.2) = \dots$

استعمل ترتيب العمليات لتحسب كل ما يأتي:

- 10 $\frac{1}{5} + 5^{-2} - (-5)^{-3} = \dots\dots$ 11 $3^{-3} - (-3)^0 - 3^{-2} = \dots\dots$
 12 $(-2)^{-2} + 1^3 - (-4)^{-2} = \dots\dots$ 13 $9^{(0-)} - 4^{(2-)} - 1^{-5} = \dots\dots$

أكتب الأعداد التالية بالصورة الرقمية:

- 14 $5.3 \times 10^3 = \dots\dots$ 15 $2.04 \times 10^5 = \dots\dots$
 16 $1.17 \times 10^{-4} = \dots\dots$ 17 $61.4 \times 10^{-6} = \dots\dots$

أكتب الأعداد التالية بالصورة العلمية:

- 18 $65300 = \dots\dots$ 19 $108000 = \dots\dots$
 20 $0.0043 = \dots\dots$ 21 $0.000276 = \dots\dots$

بسط واكتب ناتج الضرب والقسمة كقوة واحدة:

- 22 $3^5 \times 3^2 = \dots\dots$ 23 $7^0 \times 7^{-4} = \dots\dots$ 24 $6^{-1} \times 6^{-5} = \dots\dots$
 25 $\frac{5^4}{5^7} = \dots\dots$ 26 $\frac{2^{-4}}{8} = \dots\dots$ 27 $\frac{6 \times 3^{-3}}{2^5 \times 3} = \dots\dots$

استعمل الحاسبة لتكتب ناتج الجمع و الطرح على صورة كسر عشري:

- 28 $\frac{1}{4} - \frac{5}{2} = \dots\dots$ 29 $\frac{1}{5} + \frac{2}{3} = \dots\dots$ 30 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{13}{6} = \dots\dots$

استعمل الحاسبة لتكتب ناتج الضرب والقسمة على صورة كسر عشري:

- 31 $\frac{2}{7} \times \frac{28}{6} = \dots\dots$ 32 $\frac{7}{3} \div \frac{56}{-21} = \dots\dots$ 33 $\frac{15}{9} + \frac{81}{60} - \frac{27}{8} = \dots\dots$

أكتب مثلاً واحداً لكل خاصية من الخصائص الآتية :

34 لكل $a, b, c \in Q$ إذا كان $a \leq b$ فإن $a + c \leq b + c$

35 لكل $a, b, c \in Q$ إذا كان $a < b$ وأن $c > 0$ فإن $ac > bc$

36 لكل $a, b, c \in Q$ إذا كان $a \geq b$ وأن $c > 0$ فإن $\frac{a}{c} \leq \frac{b}{c}$



تَعَلَّم

رسم أحمد لوحة فنية تمثل إحدى المعالم الأثرية، وفي أعلى مقدمة البناء يظهر المثلث القائم الزاوية، واطوال الضلعين القائمين في اللوحة هو $2m.3m$ جد طول الوتر، وبين أهو عدد نسبي أم لا؟

فكرة الدرس

- التعرف إلى مفهوم الأعداد الحقيقية وتمثيلها على مستقيم الأعداد ومقارنتها وترتيبها.
- المفردات
- العدد النسبي.
- العدد غير النسبي.
- العدد الحقيقي.

Concept of Real Numbers

[2-1-1] مفهوم الأعداد الحقيقية

تعرفت سابقاً إلى الأعداد النسبية والتي يمكن كتابتها على شكل كسر أو عدد عشري منته أو عدد عشري دوري.

$$\text{مثال: } 4\frac{1}{2} = 4.5, \frac{11}{3} = 3.\bar{7}, \frac{4}{3} = 1.\bar{3}, \sqrt{1.69} = 1.3$$

إما الأعداد غير النسبية فتكتب بوصفها أعداداً عشرية غير منتهية وغير دورية. وأن كل عدد طبيعي لا يكتب

على شكل مربع كامل. يكون جذره التربيعي عدداً غير نسبي.

$$\text{مثال: } \sqrt{3} = 1.7320508\dots, \sqrt{5} = 2.2360679\dots$$

وكذلك العدد غير النسبي لا يمكن كتابته على صورة الكسر $\frac{a}{b}$ إذ $b \neq 0$.

مجموعة الأعداد الحقيقية R (تتألف من اتحاد مجموعة الأعداد النسبية Q ومجموعة الأعداد غير النسبية

$$R = Q \cup H$$

جد طول الوتر، وبين أهو عدد نسبي أم لا؟ (مثال 1)

نفرض أن طول الوتر هو المتغير x وبتطبيق نظرية فيثاغورس فإن:

$$x^2 = 2^2 + 3^2 \Rightarrow x^2 = 4 + 9 \Rightarrow x^2 = 13 \Rightarrow x = \sqrt{13}$$

وباستعمال الآلة الحاسبة فإن:

$$x = \sqrt{13} = 3.6055512\dots$$

نلاحظ أن قيمة الجذر التربيعي للعدد 13 هو عدد عشري غير دوري وغير منتهي لذا هو عدد غير نسبي (عدد حقيقي).

صنف العدد من حيث كونه عدداً نسبياً أو غير نسبي أو غير حقيقي: (مثال 2)

i) $(\sqrt{9} = 3)$ عدد صحيح، عدد نسبي، عدد حقيقي

ii) $(\sqrt{8} = 2.828427\dots)$ عدد حقيقي، عدد غير نسبي

iii) $(\frac{0}{5} = 0)$ عدد صحيح، عدد نسبي، عدد حقيقي

iv) $(\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3})$ عدد نسبي، عدد حقيقي

v) $(\sqrt{-17})$ عدد غير حقيقي

vi) $(\frac{4}{0})$ غير معرف

vii) $(\sqrt{\frac{16}{5}} = 2.23606\dots)$ عدد حقيقي، عدد غير نسبي، عدد حقيقي

viii) $(\frac{10}{3} = 3.33333\dots)$ عدد حقيقي، عدد نسبي

ix) $(-3\frac{2}{5} = -3.4)$ عدد نسبي، عدد حقيقي

x) $(-\sqrt{2} = -1.414213\dots)$ عدد حقيقي، عدد غير نسبي

[2-1-2] تمثيل الأعداد الحقيقية على مستقيم الأعداد

Represent The Real Numbers on a Number Line

تتمتع الأعداد الحقيقية بخاصية الكثافة وهي أن بين كل عددين حقيقيين يوجد على الأقل عدد حقيقي آخر، ولاتنطبق هذه الخاصية على الأعداد الطبيعية أو الأعداد الصحيحة. ويمكن تمثيل الأعداد الحقيقية على مستقيم الأعداد. ونحتاج الى تقريب الأعداد غير النسبية لأقرب جزء من العشرة (عشر) لتمثيلها على مستقيم الأعداد.

مثال (3)


جد عدداً حقيقياً بين العددين $1\frac{3}{5}$ ، $3\frac{2}{5}$ ومثله على مستقيم الأعداد.

$$)3\frac{2}{5} + 1\frac{3}{5} (\div 2$$

$$= 4\frac{5}{5} \div 2$$

$$= 5 \div 2$$

$$= 2\frac{1}{2}$$



إذن العدد $2\frac{1}{2}$ هو العدد الذي يقع بين العددين $1\frac{3}{5}$ ، $3\frac{2}{5}$


مثال (4)

قدر الجذور التربيعية التالية لأقرب عُشر. ثم مثلها على مستقيم الأعداد:

i) $(\sqrt{5} = 2.2)$



ii) $(-\sqrt{3} = -1.7)$



[2-1-3] مقارنة الأعداد الحقيقية وترتيبها

Coparison and Arrangement of Real Numbers

تعلمت سابقاً مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها. وبالأسلوب نفسه سوف تقارن الأعداد الحقيقية وترتيبها بعد كتابتها بالصورة العشرية مقربة لأقرب جزء من العشرة (عشر).

مثال (5)

قارن بين الأعداد الحقيقية مستعملاً الرموز $(> , < , =)$:

i) $(\sqrt{5} \boxed{>} 2\frac{1}{2}, \sqrt{5} = 2.236..., 2\frac{1}{2} = 2.5 \Rightarrow 2.236... > 2.5)$

ii) $(\sqrt{3} \boxed{<} \sqrt{1.69}, \sqrt{3} = 1.732..., \sqrt{1.69} = 1.3 \Rightarrow 1.732... < 1.3)$

مثال (6)

i) رتب الأعداد الحقيقية التالية من الأصغر الى الأكبر: $\sqrt{7}, \sqrt{11}, \sqrt{3}$

$$\sqrt{7} = 2.645..., \sqrt{11} = 3.316..., \sqrt{3} = 1.732... \Rightarrow \sqrt{3}, \sqrt{7}, \sqrt{11}$$

ii) رتب الأعداد الحقيقية التالية من الأكبر الى الأصغر: $-\sqrt{8}, -2\frac{1}{2}, -2.9$

$$-\sqrt{8} = -2.828..., -2\frac{1}{2} = -2.5, -2.9 \Rightarrow -2\frac{1}{2}, -\sqrt{8}, -2.9$$

تأكّد من فهمك

صنف العدد من حيث كونه عدداً نسبياً أو غير نسبيّ أو غير حقيقي :

1 $\sqrt{16}$ 2 $\sqrt{11}$ 3 $\frac{0}{2}$ 4 $\sqrt{\frac{9}{25}}$ 5 $\sqrt{-27}$

(الأسئلة 1-10)

6 $\frac{8}{0}$ 7 $\sqrt{\frac{36}{7}}$ 8 $\frac{20}{6}$ 9 $-5\frac{3}{2}$ 10 $-\sqrt{6}$

(مشابهة للمثالين 1,2)

قدر الجذور التربيعية التالية بالتقريب لأقرب عُشر. ثم مثلها على مستقيم الأعداد:

11 $\sqrt{7} \approx \dots\dots$ 12 $-\sqrt{5} \approx \dots\dots$ 13 $\sqrt{\frac{8}{25}} \approx \dots\dots$

(الأسئلة 11-13)

(مشابهة للمثال 4)

قارن بين الأعداد الحقيقية مستعملاً الرموز $(> , < , =)$:

14 $\sqrt{3}$ $\boxed{}$ $3\frac{1}{3}$ 15 $-\sqrt{8}$ $\boxed{}$ $\sqrt{2.25}$ 16 $\frac{0}{12}$ $\boxed{}$ $\frac{0}{5}$

(الأسئلة 14-16)

(مشابهة للمثال 5)

17 رتب الأعداد الحقيقية التالية من الأصغر إلى الأكبر: $\sqrt{2}$ ، $\sqrt{13}$ ، \dots ، 236 . (الأسئلة 17, 18)

(مشابهة للمثال 6)

18 رتب الأعداد الحقيقية التالية من الأكبر إلى الأصغر: -2.21 ، $-3\frac{1}{4}$ ، $-\sqrt{6}$

تدرب وحلّ التمرينات

صنف العدد من حيث كونه عدداً نسبياً أو غير نسبيّ أو غير حقيقي :

19 $\sqrt{25}$ 20 $\sqrt{17}$ 21 $\frac{0}{-6}$

22 $\frac{13}{0}$ 23 $\sqrt{\frac{49}{5}}$ 24 $\frac{20}{6}$

قدر الجذور التربيعية التالية بالتقريب لأقرب عُشر. ثم مثلها على مستقيم الأعداد :

25 $\sqrt{8} \approx \dots\dots$ 26 $-\sqrt{2} \approx \dots\dots$

قارن بين الأعداد الحقيقية مستعملاً الرموز $(> , < , =)$:

27 $\sqrt{13}$ $\boxed{}$ $3\frac{1}{5}$ 28 $-\sqrt{12}$ $\boxed{}$ $\sqrt{6.25}$

29 رتب الأعداد الحقيقية التالية من الأكبر إلى الأصغر: -3.06 ، $-3\frac{1}{5}$ ، $-\sqrt{14}$

تدرب وحل مسائل حياتية



30 **ساحة التحرير:** ساحة التحرير احدى الساحات الرئيسية في وسط مدينة بغداد، صممت بشكل دائري، محيطها 176m وقطرها 56m. بين أيمثل حاصل قسمة محيط الساحة على قطرها عدداً نسبياً أم عدداً غير نسبي؟



31 **دلافين:** نزلت ثلاثة دلافين بالأعماق التالية تحت سطح

الماء:

$$-10 \times \sqrt{\frac{36}{144}} \text{ m} , -10 \times \sqrt{\frac{1}{8}} \text{ m} , -10 \times \sqrt{\frac{9}{25}} \text{ m}$$

رتب أعماق الدلافين بالنسبة الى مستوى سطح الماء من الأقرب الى سطح الماء الى الأبعد عمقاً وبالأعداد العشرية.



32 **لوحة فنية:** رسمت لوحة فنية على قطعة زجاج مستطيلة الشكل بعدها 60cm. 40cm. جد قطر اللوحة الفنية، ويمثل القطر عدداً نسبياً أم عدداً غير نسبي؟

فكر


33 **حد:** تعلمت سابقاً أن محيط الدائرة مقسوماً على قطرها يساوي النسبة الثابتة π وهي عدد غير نسبي . ما قطر الدائرة التي محيطها 12cm ؟ وضح اجابتك .

34 **أصح الخطأ:** قالت شيما إن العدد $\sqrt{\frac{16}{48}}$ يمثل عدداً نسبياً في حين أن العدد $\sqrt{\frac{16}{49}}$ عدد غير نسبي حدد خطأ شيما وصححه.

35 **حسّ عددي:** هل أن العدد $\sqrt{\frac{9}{4}}$ يقع بين العددين $\sqrt{2}$ ، $\sqrt{3}$ ؟

اكتب

ناتج جمع العددين الحقيقيين بعد تقريبهما لأقرب عُشر: $\sqrt{5} + \sqrt{7} \approx \dots\dots$



تَعَلَّم

قيمة الجذر $\sqrt{\frac{LM}{3600}}$ تمثل المساحة السطحية لجسم الإنسان، إذ إن L يمثل طول الإنسان بالسنتيمتر و M يمثل كتلة جسم الإنسان بالكيلوغرامات وتستخدم المساحة السطحية لجسم الإنسان في حساب جرعات الأدوية.

فكرة الدرس

- التعرف إلى خصائص الأعداد الحقيقية .
- المفردات
- خاصية الأبدال.
- خاصية التجميع.
- خاصية التوزيع.
- العنصر المحايد.
- النظير الجمعي.
- النظير الضربي.

جد المساحة السطحية لجسم رجل كتلته 80kg وطوله 170cm .

[2-2-1] خاصية الأبدال والتجميع والتوزيع

Commutative Property, Accusative Property and Distributive Property

تعرفت سابقا إلى خصائص الأعداد الصحيحة والأعداد النسبية .وبالأسلوب نفسه سوف نتعرف إلى خواص الأعداد الحقيقية وهي : خاصية الأبدال، خاصية التجميع، خاصية التوزيع، العنصر المحايد، النظير الجمعي، النظير الضربي وتبدأ بالخصائص الثلاث الأولى وهي:

i($a+b = b+a$, $ab = ba$, $\forall a,b \in \mathbb{R}$)

خاصية الأبدال

ii($(a+b)+c = a+(b+c)$, $(ab)c = a(bc)$, $\forall a,b,c \in \mathbb{R}$)

خاصية التجميع

iii($a(b+c) = ab + ac$, $\forall a,b,c \in \mathbb{R}$)

خاصية التوزيع

الرمز \forall
يعني لكل

ملاحظة: عملية الجمع لا تتوزع على عملية الضرب.

مثال 1) جد المساحة السطحية لجسم شخص كتلته 80kg وطوله 170cm .
القانون الذي يمثل المساحة السطحية لجسم الإنسان هو : $BSA = \sqrt{\frac{LM}{3600}}$
BSA (مختصر) Body Surface Area (وهي مساحة سطح الجسم .

والآن بالتعويض عن المتغيرات بالقيم المعطاة :

$BSA = \sqrt{\frac{170 \times 80}{3600}} \Rightarrow BSA = \sqrt{\frac{100+70(\times 80)}{3600}}$ (اكتب 170 على شكل 100+70)

$\Rightarrow BSA = \sqrt{\frac{100 \times 80 + 70 \times 80}{3600}}$

استعمل خاصية التوزيع

$\Rightarrow BSA \approx 1.943\text{cm}^2$

مثال 2) اكتب مثلاً لكل خاصية من الخصائص الآتية :

i($a+b = b+a$, $ab = ba$, $\forall a,b \in \mathbb{R} \Rightarrow \sqrt{3} + \sqrt{2} = \sqrt{2} + \sqrt{3}$; $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{R}$

ii($(a+b)+c = (a+b)+c$, $a(bc) = (ab)c$, $\forall a,b,c \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \sqrt{3} + (\sqrt{2} + \sqrt{5}) = (\sqrt{3} + \sqrt{2}) + \sqrt{5}$, $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5} \in \mathbb{R}$

iii($a(b+c) = ab+ac$, $\forall a,b,c \in \mathbb{R} \Rightarrow \sqrt{7}(\sqrt{3} + \sqrt{5}) = \sqrt{7}\sqrt{3} + \sqrt{7}\sqrt{5}$,

$\sqrt{7}, \sqrt{3}, \sqrt{5} \in \mathbb{R}$

نشاط: اطلب الى الطلاب إعطاء مثال للجزء الثاني من كل خاصية.

[2-2-2] العنصر المحايد، النظير الجمعي والنظير الضربي

Identity Element , Additive Inverse and Multiplicative Inverse

iv(العدد 0 هو المحايد لعملية الجمع)المحايد الجمعي($a+0 = 0+a = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$

العدد 1 هو المحايد لعملية الضرب)المحايد الضربي($1 \times a = a \times 1 = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$

v(النظير الجمعي $(a+)-a(=)-a(+a = 0$, $\forall a, -a \in \mathbb{R}$

vi(النظير الضربي $a \times \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \times a = 1$, $\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0$

مثال 3) اكتب مثلاً لكل خاصية من الخصائص الآتية:

iv($a+0 = 0+a = a$, $\forall a \in \mathbb{R} \Rightarrow \sqrt{8} + 0 = 0 + \sqrt{8} = \sqrt{8}$, $\sqrt{8} \in \mathbb{R}$

$1 \times a = a \times 1 = a$, $\forall a \in \mathbb{R} \Rightarrow 1 \times \sqrt{13} = \sqrt{13} \times 1 = \sqrt{13}$, $1, \sqrt{13} \in \mathbb{R}$

v($(a+)-a(=)-a(+a = 0$, $\forall a, -a \in \mathbb{R} \Rightarrow \sqrt{5} +)-\sqrt{5}(=)-\sqrt{5}(+\sqrt{5} = 0$, $\sqrt{5}, -\sqrt{5} \in \mathbb{R}$

vi($a \times \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \times a = 1$, $\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0 \Rightarrow \sqrt{17} \times \frac{1}{\sqrt{17}} = \frac{1}{\sqrt{17}} \times \sqrt{17} = 1$, $\sqrt{17} \in \mathbb{R}$

مثال 4) جد النظير الجمعي للأعداد الحقيقية الآتية:

i($6\sqrt{5} + 2$

ii($\sqrt{3} - \sqrt{11}$

iii($-2\sqrt{8} + \frac{1}{2}$

نظير $6\sqrt{5} + 2$ هو $-6\sqrt{5} - 2$ $\Rightarrow (6\sqrt{5} + 2) + (-6\sqrt{5} - 2) = 0$

نظير $\sqrt{3} - \sqrt{11}$ هو $-\sqrt{3} + \sqrt{11}$ $\Rightarrow (\sqrt{3} - \sqrt{11}) + (-\sqrt{3} + \sqrt{11}) = 0$

نظير $-2\sqrt{8} + \frac{1}{2}$ هو $2\sqrt{8} - \frac{1}{2}$ $\Rightarrow (-2\sqrt{8} + \frac{1}{2}) + (2\sqrt{8} - \frac{1}{2}) = 0$

جد النظير الضربي للأعداد الحقيقية الآتية :
iv($\sqrt{\frac{1}{7}}$ v($-2\sqrt{3} + 3$ vi($-6\frac{2}{5}$

نظير $\sqrt{\frac{1}{7}}$ هو $\sqrt{7}$ $\Rightarrow \sqrt{\frac{1}{7}} \times \sqrt{7} = 1$

نظير $-2\sqrt{3} + 3$ هو $2\sqrt{3} - 3$ $\Rightarrow (-2\sqrt{3} + 3) + (2\sqrt{3} - 3) = 0$

نظير $-6\frac{2}{5}$ هو $6\frac{2}{5}$ $\Rightarrow -6\frac{2}{5} \times 6\frac{2}{5} = 1$

تأكّد من فهمك

اكتب مثلاً لكل خاصية من الخصائص الآتية :

1 $a+b = b+a$, $ab = ba$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$

2 $a+(b+c) = (a+b)+c$, $a(bc) = (ab)c$, $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$

3 $a)b+c(= ab+ac$, $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$

الأسئلة (3-1)

مشابه للمثال (2)

جد النظير الجمعي للأعداد الحقيقية الآتية:

4 $4\sqrt{2} - 1$

5 $\sqrt{5} + \sqrt{7}$

6 $-9\sqrt{11} + \frac{1}{3}$

الأسئلة (9-4)

مشابه الى المثال (4)

7 $-5\sqrt{3} + 8$

8 $\frac{1}{\sqrt{11}} - 6$

9 $-4\frac{2}{3}$

جد النظير الضربي للأعداد الحقيقية الآتية :

10 $\sqrt{\frac{1}{5}}$

11 $3\sqrt{7} - 7$

12 $-11\frac{2}{3}$

الأسئلة (15-10)

مشابه الى المثال (4)

13 $-6\sqrt{\frac{1}{3}}$

14 $\sqrt{2} - \frac{1}{3}$

15 $8\frac{1}{2} - 5\frac{5}{2}$

تدرب وحلّ التمرينات

اكتب مثلاً لكل خاصية من الخصائص الآتية:

16 $a+0 = 0+a = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$

17 $a+(-a) = (-a)+a = 0$, $\forall a, -a \in \mathbb{R}$

جد النظير الجمعي للأعداد الحقيقية الآتية:

18 $-6\sqrt{13} - 5$

19 $-\sqrt{1} - \sqrt{3}$

جد النظير الضربي للأعداد الحقيقية الآتية :

20 $-\sqrt{\frac{1}{8}}$

21 $-5\sqrt{2} - 5$

قدّر النظير الضربي للجذور التربيعية التالية بالتقريب لأقرب عُشرٍ :

22 $-\sqrt{\frac{1}{7}}$

23 $\sqrt{\frac{1}{7.3}}$

تدرب وحل مسائل حياتية



24 **شاشة تلفاز:** اشترت مروه تلفاز طول شاشته 48cm وعرضه 36cm. جد النظير الجمعي لقطر شاشة التلفاز.



25 **غوص:** نزل ثلاثة غواصين بالأعماق التالية تحت سطح الماء:

$$-18 \times \sqrt{\frac{36}{81}} \text{ m}, -24 \times \sqrt{\frac{1}{16}} \text{ m}, -30 \times \sqrt{\frac{9}{25}} \text{ m}$$

رتب النظير الضربي لأعماق الغواصين بالنسبة إلى مستوى سطح الماء من الأبعد عمقاً إلى الأقرب إلى سطح الماء.



26 **سمكة القرش:** النظير الضربي لطولي سمكتي قرش هو $\sqrt{\frac{2.25}{81}} \text{ m}$, $\sqrt{\frac{6.25}{36}} \text{ m}$ قارن بين طوليهما الحقيقيين.

فكر

27 **حدد:** رتب النظير الجمعي للقيمة التقديرية للجذور التربيعية التالية بالتقريب إلى أقرب عُشر

من الأصغر إلى الأكبر: $\sqrt{5}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{7}$

28 **أصحح الخطأ:** قال ياسين إن $(-5\sqrt{7} + 1)$ هو النظير الجمعي للعدد $\frac{1}{-5\sqrt{7} + 1}$

لأن: $1 = \frac{1}{-5\sqrt{7} + 1} \times (-5\sqrt{7} + 1)$. حدد خطأ ياسين وصححه .

29 **جسّ عددي:** أيساوي حاصل ضرب أي عدد حقيقي في المقلوب السالب له العدد 1 ؟

أكتب

الخاصية التي تعبّر عن المثال الآتي :

$$\sqrt{3} + (-\sqrt{3}) = 0, \sqrt{3}, -\sqrt{3} \in \mathbb{R}$$



تعلم

العنكبوت هي انثى العنكب وهي التي تبني بيت العنكبوت وتصل عدد الخيوط الى 400 الف خيط وطول الخيط الواحد 20cm . رسم بسام لوحة فنية لبيت العنكبوت على لوح زجاجي مستطيل طوله $5\sqrt{18}$ cm وعرضه $3\sqrt{2}$ cm ما محيط اللوحة الفنية ؟

فكرة الدرس

- تبسيط الجمل العددية التي تحتوي على جذور تربيعية.
- المفردات
- تنسيب المقام.

[2-3-1] تبسيط الجمل العددية باستعمال الخصائص (الأبدال والتجميع و التوزيع)

(Commutative , accusative, distributive) Simplifying the Numerical Sentences by using the properties

تعلمت سابقا تبسيط الجمل العددية التي تحتوي على اعداد نسبية باستعمال خصائص الأعداد. وبالأسلوب نفسه سوف تتعلم تبسيط الجمل العددية التي تحتوي على جذور تربيعية باستعمال الخصائص (الأبدال والتجميع والتوزيع) ويمكن استعمال الخصائص الآتية:

i) $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}$, $\forall a, b \geq 0$

ii) $\sqrt{a} \sqrt{a} = a$, $\forall a \geq 0$

iii) $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$, $\forall a \geq 0, b < 0$

مثال 1) جذ محيط اللوحة الفنية المستطيلة الشكل التي أبعادها $5\sqrt{18}$ cm . $3\sqrt{2}$ cm

التي رسمها بسام .

$P = 2) L + W ($

المتغيرات تمثل : المحيط P ، الطول L ، العرض W

$= 2) 5\sqrt{18} + 3\sqrt{2} ($

استعمل خاصية التوزيع

$= 2 \times 5 \sqrt{18} + 2 \times 3\sqrt{2}$

عوض عن $\sqrt{18}$ بما يساويها هو $\sqrt{9} \sqrt{2}$

$= 10 \times \sqrt{9} \sqrt{2} + 6 \sqrt{2}$

عوض عن $\sqrt{9}$ بما يساويها هو 3

$= 10 \times 3 \sqrt{2} + 6\sqrt{2}$

تبسيط المقدار بجمع الحدود المتشابهة

$= 30 \sqrt{2} + 6\sqrt{2}$

إذن طول محيط اللوحة الفنية هو $36\sqrt{2}$ cm

$= 36 \sqrt{2}$

مثال 2) بسط الجمل العددية التالية باستعمال الخصائص (الأبدال والتجميع والتوزيع) :

i) $(5\sqrt{12} - 7\sqrt{32}) = 5 \sqrt{3 \times 4} - 7 \sqrt{2 \times 16}$

ii) $(\sqrt{5})\sqrt{10} + \sqrt{3} = \sqrt{5} \sqrt{10} + \sqrt{5} \sqrt{3}$

$= 5 \sqrt{3} \sqrt{4} - 7 \sqrt{2} \sqrt{16}$

$= \sqrt{50} + \sqrt{15}$

$= 5 \sqrt{4} \sqrt{3} - 7 \sqrt{16} \sqrt{2}$

$= \sqrt{25 \times 2} + \sqrt{15}$

$= 5 \times 2 (\sqrt{3} -) 7 \times 4 (\sqrt{2}$

$= \sqrt{25} \sqrt{2} + \sqrt{15}$

$= 10 \sqrt{3} - 28 \sqrt{2}$

$= 5 \sqrt{2} + \sqrt{15}$

[2-3-2] تبسيط الجمل العددية باستعمال الخصائص) العنصر المحايد، النظير الجمعي والنظير الضربي

Simplifying the Numerical Sentences by using the properties

(Identity Element, Additive Invers, Multiplicative Inverse)

سوف تتعلم تبسيط الجمل العددية التي تحتوي على جذور تربيعية باستعمال الخواص) العنصر المحايد، النظير الجمعي، النظير الضربي (وفي حالة الكسر الذي مقامه جذر تربيعي فسوف تستعمل عملية تنسيب المقام وهو تحويل مقام الكسر الى مقدار ليس فيه جذر وذلك بأن تضرب الكسر بالمحايد الضربي العدد 1 (ثم تعوض عنه بكسر مناسب) .

مثال 3) بسط الجمل العددية التالية باستعمال الخواص) العنصر المحايد، النظير الجمعي والنظير الضربي (:

$$\begin{aligned} \frac{3+\sqrt{7}}{\sqrt{7}} &= \frac{3+\sqrt{7}}{\sqrt{7}} \times 1 \\ &= \frac{3+\sqrt{7}}{\sqrt{7}} \times \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} \\ &= \frac{\sqrt{7}(3+\sqrt{7})}{\sqrt{7}\sqrt{7}} \\ &= \frac{3\sqrt{7} + \sqrt{7}\sqrt{7}}{7} \\ &= \frac{3\sqrt{7}+7}{7} \end{aligned}$$

والنظير الضربي (:

اضرب الكسر في العدد 1) المحايد الضربي

عوض عن العدد 1 بالكسر $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}}$ ضرب البسط والمقام

استعمل خاصية التوزيع

بسط المقدم إذ إن $\sqrt{7} \cdot \sqrt{7} = 7$

مثال 4) بسط الجمل العددية التالية باستعمال خصائص الأعداد الحقيقية :

i) $(\sqrt{8})1 - \sqrt{2} (= \sqrt{8} - \sqrt{8}\sqrt{2})$
 $= \sqrt{4}\sqrt{2} - \sqrt{16}$
 $= 2\sqrt{2} - 4$

ii) $(\sqrt{3})\sqrt{3} + \sqrt{27} (= \sqrt{3}\sqrt{3} + \sqrt{3}\sqrt{27})$
 $= 3 + \sqrt{3}\sqrt{3}\sqrt{9}$
 $= 3 + 9 = 12$

iii) $6\sqrt{125} + 2\sqrt{5} - 4\sqrt{5}$
 $= 6\sqrt{25}\sqrt{5} - 2\sqrt{5}$
 $= 30\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = 28\sqrt{5}$

iv) $(\frac{1}{2}\sqrt{7} + \frac{1}{3}\sqrt{7} - \frac{1}{6}\sqrt{7})$
 $= \sqrt{7}(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6})$
 $= \sqrt{7}(\frac{3+2-1}{6}) (= \frac{2}{3}\sqrt{7})$

v) $(\frac{\sqrt{5}-8}{2\sqrt{5}})$
 $= \frac{\sqrt{5}-8}{2\sqrt{5}} \times 1$
 $= \frac{\sqrt{5}-8}{2\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$
 $= \frac{\sqrt{5}\sqrt{5}-8\sqrt{5}}{2\sqrt{5}\sqrt{5}}$
 $= \frac{5-8\sqrt{5}}{10}$

vi) $(\frac{9\sqrt{44}}{4\sqrt{3}} \div \frac{8\sqrt{11}}{\sqrt{3}})$
 $= \frac{9\sqrt{44}}{4\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{8\sqrt{11}}$
 $= \frac{18\sqrt{11}}{4} \times \frac{1}{8\sqrt{11}}$
 $= \frac{9}{16}$

تأكّد من فهمك

بسّط الجمل العددية التالية باستخدام الخصائص (الأبدال، التجميع، التوزيع):

$$1 \quad 4\sqrt{3} - 9\sqrt{3}$$

$$2 \quad \sqrt{7}(\sqrt{7} + \sqrt{2})$$

$$3 \quad 3\sqrt{12} - 5\sqrt{8}$$

(الأسئلة 1-6)

$$4 \quad \sqrt{6}(2\sqrt{3} + 6\sqrt{2})$$

$$5 \quad \sqrt{27} \cdot 5 - \sqrt{3}$$

$$6 \quad \sqrt{2}(\sqrt{6} - 3\sqrt{2})$$

(مشابهة للمثالين 1,2)

بسّط الجمل العددية التالية باستخدام الخصائص (العنصر المحايد، النظير الجمعي والنظير الضربي):

$$7 \quad \frac{\sqrt{7} - 2}{\sqrt{3}}$$

$$8 \quad \frac{8 + \sqrt{7}}{4\sqrt{5}}$$

$$9 \quad \frac{\sqrt{8} - 1}{2\sqrt{8}}$$

(الأسئلة 7-12)

$$10 \quad \frac{\sqrt{12} - 2}{2\sqrt{3}}$$

$$11 \quad \frac{\sqrt{20} + \sqrt{5}}{\sqrt{5}}$$

$$12 \quad \frac{12 - 6\sqrt{3}}{\sqrt{27}}$$

(مشابهة للمثال 3)

بسّط الجمل العددية التالية باستخدام خصائص الأعداد الحقيقية :

$$13 \quad \sqrt{3}(5 - \sqrt{3})$$

$$14 \quad \sqrt{7}(\sqrt{7} + \sqrt{28})$$

$$15 \quad 4\sqrt{32} + 3\sqrt{2} - 5\sqrt{2}$$

$$16 \quad \frac{1}{4}\sqrt{11} + \frac{1}{5}\sqrt{11} - \frac{1}{2}\sqrt{11}$$

(الأسئلة 13-18)

$$17 \quad \frac{\sqrt{24} - 5}{2\sqrt{3}}$$

$$18 \quad \frac{7\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \div \frac{14\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$$

(مشابهة للمثال 4)

تدرب وحلّ التمرينات

بسّط الجمل العددية التالية باستخدام الخصائص (الأبدال، التجميع، التوزيع) :

$$19 \quad \sqrt{2}(1 + 7\sqrt{2})$$

$$20 \quad \sqrt{5}(\sqrt{20} - \sqrt{5})$$

$$21 \quad \sqrt{10}(3\sqrt{5} - 7\sqrt{2})$$

$$22 \quad \sqrt{54} \cdot 2 - \sqrt{2}$$

بسّط الجمل العددية التالية باستخدام الخصائص (العنصر المحايد، النظير الجمعي، النظير الضربي):

$$23 \quad \frac{9 - 2\sqrt{5}}{3\sqrt{5}}$$

$$24 \quad \frac{\sqrt{6} - 5}{\sqrt{3}\sqrt{2}}$$



بسّط الجمل العددية التالية باستخدام خصائص الأعداد الحقيقية :

$$25 \quad \sqrt{2}(7 + \sqrt{3}) - 4\sqrt{6}$$

$$26 \quad 3\sqrt{8} + 3(\sqrt{6} - \sqrt{72})$$

$$27 \quad \frac{8\sqrt{6}}{\sqrt{8}} \div \frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{98}}$$

تدرب وحل مسائل حياتية



28 **هندسة:** الشكل الهندسيّ المجاور مكون من ثلاثة أقسام: القسم A يمثل مربعٌ وهو مطابق الى القسم B. القسم C يمثل مستطيلاً. جد المساحة الكلية للشكل الهندسيّ.

29 **سيارة الحريق:** توقفت سيارة الحريق على بعد 20m من عمارة سكنية. فرفعت سلم الحريق بزوايا معينة وبكامل طوله البالغ 35m فوصل الى احد طوابق العمارة. ما ارتفاع الطابق الذي وصل اليه سلم الحريق على اعتبار سيارة الحريق مع العمارة تمثل مثلث قائم الزاوية. جد الناتج بالتقريب لأقرب عُشر.

30 **خيمة:** واجهة الخيمة تمثل مثلثاً متساوي الساقين وتحتاج كل خيمة الى عمودين واحد للواجهة الأمامية وواحد للواجهة الخلفية لتثبيتها. إذا كان طول قاعدة الواجهة الأمامية للخيمة هو $2\sqrt{5}$ m وطول حرفها المائل 3m. ما طول الأعمدة التي نحتاج إليها لتركيب 4 خيم؟

فكّر

تحذّر: بسط الجمل العددية التالية باستعمال خصائص الأعداد الحقيقية :

31 $\frac{1-7\sqrt{2}}{\sqrt{2}} - \frac{1-2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$

32 $\frac{12-8\sqrt{3}}{6\sqrt{5}} \div \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{20}}$

33 **أصحّ الخطأ:** قال منير أن ناتج تبسيط الجملة العددية $\frac{1}{2}\sqrt{8} + \frac{1}{3}\sqrt{18} - \frac{2}{5}\sqrt{50}$

هو $2\sqrt{2}$ حدد خطأ منير وصححه .

34 **حسّ عددي:** ما احتمالية طول كل ضلع من الضلعين القائمين في مثلث قائم الزاوية طول الوتر

فيه $\sqrt{5}$ cm ؟ .

اكتب

جملة عددية فيها جذور حقيقية وبسطها باستعمال خاصية التوزيع .

تَعَلَّم



نقش أثري يمثل جوانب من الحياة اليومية في الدولة السومرية (2400-2850 ق.م.) ونلاحظ اختلاط فن النحت ببدايات فن الفسيفساء وتجميع الحجارة الملونة. اللوحة مربعة الشكل مساحتها $9m^2$ جد طول ضلع اللوحة.

فكرة الدرس

- إيجاد الجذرين التربيعين الموجب والسالب لعدد.
- عكس نظرية فيثاغورس.
- تمثيل الأعداد غير النسبية على مستقيم الأعداد.
- المفردات
- الجذر التربيعي الأساسي.

[2-4-1] إيجاد الجذرين التربيعين الموجب والسالب لعدد

Finding the Positive and Negative Square Roots for Number

تعلمت سابقاً إيجاد الجذر التربيعي الموجب لعدد، والجذر التربيعي لعدد ما هو العملية العكسية لتربيع جذر هذا العدد: $8^2 = 64$ أي $\sqrt{64} = 8$ ، والآن سوف تتعلم بان لكل عدد موجب جذران تربيعيان، أحدهما موجب والآخر سالب: الجذر الموجب للعدد 64 هو 8 لأن $8 \times 8 = 64$ والجذر السالب هو -8 لأن $-8 \times -8 = 64$ ويمكن كتابته على شكل $\pm \sqrt{64} = \pm 8$ أي أن: $+\sqrt{64} = +8$ ، $-\sqrt{64} = -8$ ، عند استعمال الآلة الحاسبة فإنه يظهر فقط الجذر التربيعي الموجب، ويسمى بالجذر التربيعي الأساسي للعدد.

$$\sqrt{a} \geq 0 \quad \forall a \geq 0$$

وعليه فإن

مثال 1) جذ طول ضلع اللوحة الفنية المربعة الشكل التي مساحتها $9m^2$.

$$L = \sqrt{9}$$

$$= 3$$

$$3 \times 3 = 9 \Rightarrow +\sqrt{9} = +3$$

$$-3 \times -3 = 9 \Rightarrow -\sqrt{9} = -3$$

المتغير L يمثل طول ضلع اللوحة الفنية المربعة

طول ضلع اللوحة الفنية هو $3m$

نلاحظ أن:

وكذلك

ولكن الجذر التربيعي السالب يهمل لأنه لا يوجد طول حقيقي بالسالب.

مثال 2) جذ الجذرين التربيعين الموجب والسالب للأعداد الآتية:

$$i) (36 \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{36} = 6, & 6 \times 6 = 36 \\ -\sqrt{36} = -6, & -6 \times -6 = 36 \end{cases}$$

$$ii) (81 \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{81} = 9, & 9 \times 9 = 81 \\ -\sqrt{81} = -9, & -9 \times -9 = 81 \end{cases}$$

$$iii) \left(\frac{9}{16}\right) \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}, & \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16} \\ \sqrt{\frac{9}{16}} = -\frac{3}{4}, & -\frac{3}{4} \times -\frac{3}{4} = \frac{9}{16} \end{cases}$$

$$iv) (6.25 \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{6.25} = 2.5, & 2.5 \times 2.5 = 6.25 \\ \sqrt{6.25} = -2.5, & -2.5 \times -2.5 = 6.25 \end{cases}$$

The Corvers of Pythagorean Theorem

تعرفت سابقاً إلى نظرية فيثاغورس التي تصف العلاقة بين طولي الساقين والوتر في مثلث قائم الزاوية (مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طول ساقيه). والآن سوف نتعرف إلى عكس نظرية فيثاغورس (في أي مثلث إذا كان مربع طول أحد اضلاعه يساوي مجموع مربعي طول الضلعين الآخرين، فإن المثلث يكون قائم الزاوية).

مثال (3)

إذا كانت قياسات الأضلاع الثلاثة لمثلث هي : 3cm , 4cm , 5cm .

حدد فيما إذا كان المثلث قائم الزاوية أم لا؟

اكتب مربع طول كل ضلع من أضلاع المثلث $3^2 = 9$, $4^2 = 16$, $5^2 = 25$

وبما أن $16+9 = 25$ ، لذا فإنه يحقق عكس نظرية فيثاغورس، أي المثلث قائم الزاوية

[2-4-3] تمثيل الأعداد غير النسبية على مستقيم الأعداد

Representing The Irrational Numbers on a Number Line

تعلمت سابقاً كيفية تمثيل الأعداد النسبية على مستقيم الأعداد وكذلك تعلمت في الدرس الأول من هذا الفصل كيفية تمثيل الجذور التربيعية للأعداد على مستقيم الأعداد بعد كتابة قيمتها مقربة لأقرب عُشر. والآن سوف تتعلم كيفية تمثيل العدد غير النسبي على مستقيم الأعداد بشكل دقيق ومن دون تقريب.

مثال (4)


مثّل العدد $\sqrt{41}$ على مستقيم الأعداد بشكل دقيق.

الخطوة 1: جد عددين مربعين مجموعهما 41.

طول وتر لمثلث قائم الزاوية طول ساقيه 4 و 5 هو $\sqrt{41}$

$$41 = 25 + 16$$

$$41 = 5^2 + 4^2$$




الخطوة 2: ارسم على ورق المربعات مثلثاً قائم الزاوية طول ساقيه

4 و 5 وحدة

الخطوة 3: افتح الفرجال بطول الوتر، ثم ضع رأسه عند العدد صفر وارسم

قوساً يقطع مستقيم الأعداد في نقطة تمثل العدد $\sqrt{41}$



تأكّد من فهمك

جدّ الجذرين التربيعين الموجب والسالب للأعداد الآتية :

- | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|-----------------|---|------|---|------|--|
| 1 | 16 | 2 | 25 | 3 | 49 | 4 | 64 | الأسئلة (8 - 1)
مشابهة الى المثالين (1.2) |
| 5 | $\frac{9}{25}$ | 6 | $\frac{36}{81}$ | 7 | 1.21 | 8 | 2.25 | |

حدّد ما إذا كان كلّ مثلث بالأضلاع المعطاة هو مثلث قائم الزاوية . وتحقق من إجابتك:

- | | | | | |
|----|--------------------|----|---------------------|---|
| 9 | 40 cm, 9 cm, 41 cm | 10 | 4 cm, 7 cm, 5 cm | الأسئلة (9 - 12)
مشابهة الى المثال (3) |
| 11 | 6 cm, 8 cm, 10 cm | 12 | 17 cm, 13 cm, 12 cm | |

جدّ طول الضلع القائم بتقريب الناتج لأقرب عُشر إذا علّمت طول الوتر وضع قائم لكل مثلث مما يأتي:

- | | | | |
|----|-------------------|----|--------------------|
| 13 | 12 cm, 6 cm, | 14 | 10 cm, 20 cm, |
|----|-------------------|----|--------------------|

مّثل الأعداد التالية على مستقيم الأعداد بشكلٍ دقيق :

- | | | | | | | | | |
|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|
| 15 | $\sqrt{5}$ | 16 | $\sqrt{13}$ | 17 | $\sqrt{20}$ | 18 | $\sqrt{29}$ | الأسئلة (15 - 22)
مشابهة الى المثال (4) |
| 19 | $\sqrt{34}$ | 20 | $\sqrt{52}$ | 21 | $\sqrt{45}$ | 22 | $\sqrt{65}$ | |

تدرّب وحلّ التمرينات

جدّ الجذرين التربيعين الموجب والسالب للأعداد الآتية :

- | | | | | | |
|----|---------------|----|-----------------|----|-------|
| 23 | 4 | 24 | 36 | 25 | 81 |
| 26 | $\frac{9}{4}$ | 27 | $\frac{25}{64}$ | 28 | 10.24 |

حدّد ما إذا كان كلّ مثلث بالأضلاع المعطاة هو مثلث قائم الزاوية . وتحقق من إجابتك:

- | | |
|----|----------------------------|
| 29 | 2 cm, 3 cm, $\sqrt{13}$ cm |
| 30 | 20 cm, 15 cm, 625 cm |


جدّ طول الضلع القائم بتقريب الناتج لأقرب عُشر إذا علّمت طول الوتر وضع قائم لكل مثلث مما يأتي:

- | | | | |
|----|-----------------|----|-------------------|
| 31 | 9cm, 6 cm, | 32 | 10 cm, 5 cm, |
|----|-----------------|----|-------------------|


مّثل الأعداد التالية على مستقيم الأعداد بشكلٍ دقيق :

- | | | | |
|----|-------------|----|-------------|
| 33 | $\sqrt{2}$ | 34 | $\sqrt{10}$ |
| 35 | $\sqrt{85}$ | 36 | $\sqrt{41}$ |


تدرب وحل مسائل حياتية



37 **طائرة ورقية:** نعدُّ الطائرة الورقية، إحدى اللعب المفضلة عند كثير من الأطفال. في الشكل المجاور إذا كان ارتفاع الطائرة الراسي عن سطح الأرض 15m، وطول الخيط المثبتة به الطائرة من طرف ويد الطفل من طرف آخره 25m، ما نوع المثلث الذي تشكل من ارتفاع الطائرة و الخيط والمسافة الأفقية، جد طول المسافة الأفقية.



38 **مركب شراعي:** الشكل المجاور لمركب شراعي يطفو على سطح الماء. جد عمق الماء مقرباً لأقرب عُشرٍ، إذا علمت طول الوتر والضع القائم كما مثبتته في الشكل.



39 **منطاد:** المنطاد هو بالون كبير الحجم متصل بأسفله بسلة لنقل الناس أو البضائع وله استخدامات عديدة كوسيلة نقل. الشكل المجاور يمثل منطاداً هوائياً. جد ارتفاعه عن سطح الأرض.

فكر

تحذُّ: جد الجذرين التربيعين الموجب والسالب للأعداد الآتية :

40 $\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{2}}$

41 $\frac{\sqrt{243}}{\sqrt{3}}$

42 $\frac{\sqrt{625}}{\sqrt{16}}$

43 **أصحَّ الخطأ:** قالت سندس أن المثلث الذي اضلاعة 1.5cm, 1.1cm, 1.8cm يمثل مثلثاً قائم الزاوية. حدد خطأ سندس وصححه.

حسب عددي: هل يمكن رسم مثلث قائم الزاوية قياس أطول اضلاعه كما يلي؟ موضحاً اجابتك :

44 3 cm , 5 cm , $\sqrt{34}$ cm

45 1.5 cm, 2.5 cm, 3.5 cm

اكتب

معادلة يمكن إيجاد طول الضلع المجهول فيها لمثلث قائم الزاوية فيه قياس طول الوتر 10cm. وضع القائم 6cm.

تعلم

فكرة الدرس

- تمثيل جدول قيم في المستوي الإحداثي.
- إيجاد المسافة بين نقطتين.

المفردات

- الزوج المرتب.
- المستوي الإحداثي.
- نقطة الأصل.
- محور السينات.
- محور الصادات.
- جدول قيم.
- الأرباع.




النمر (Tiger) حيوانٌ ضخمٌ مفترس من الثدييات آكلة اللحوم، من فصيلة السنوريات والأسم العلمي له Panthera Tigers. تلدُ النمرة (انثى النمر) من جروٍ الى ثمانية جراءٍ يظلون في رعاية أمهم مدة 6 اسابيع ثم يعتمدون على أنفسهم. الجدول التالي يبين عدد الجراء وكمية الحليب التي يحتاجون اليها في اليوم الواحد مثل الجدول في المستوي الإحداثي.

عدد الجراء	8	6	4	2
الكمية (لتر)	4	3	2	1

[2-5-1] تمثيل جدول قيم في المستوي الإحداثي

Representing Values Table in the Coordinate Plane

تعرفت سابقاً إلى المستوي الإحداثي الذي يتكون من مستقيمين متعامدين في نقطة تسمى نقطة الأصل، المستقيم الأفقي يعرف بمحور السينات والمستقيم العمودي يعرف بمحور الصادات والمستوي مقسم على أربعة أرباع. وكذلك تعلمت كيفية تمثيل أزواج مرتبة في المستوي الإحداثي، والآن سوف تتعلم كيفية تمثيل جدول قيم في المستوي الأحداثي يتضمن أعداداً نسبية وذلك بكتابة الأزواج المرتبة أو الأمان الجدول ثم تمثيلها على المستوي الإحداثي.




مثال 1) مثل جدول القيم التالي في المستوي الإحداثي .

عدد الجراء	8	6	4	2
الكمية (لتر)	4	3	2	1

اكتب الأزواج مرتبة: $(2, 1)$, $(4, 2)$, $(6, 3)$, $(8, 4)$

مثل كل زوج بنقطة في المستوي الإحداثي.

كل الأزواج المرتبة تقع في الربع الأول.



مثال 2) مثل جدول القيم التالي في المستوي الإحداثي وحدد الشكل الهندسي الذي يمثله.

X	-2	2	-2	2
Y	5	5	0	0

اكتب الأزواج المرتبة: $(-2, 5)$, $(2, 5)$, $(-2, 0)$, $(2, 0)$


مثل كل زوج بنقطة في المستوي الإحداثي، ثم صل بين النقاط الشكل

الذي يمثله جدول القيم هو مستطيل .

Finding the Distance between two Points in the Coordinate Plane

تعلمت في الجزء الأول من الدرس كيفية كتابة الأزواج المرتبة من جدول قيم ثم كيفية تمثيلها في المستوى الإحداثي. والآن سوف تتعلم كيفية إيجاد المسافة بين نقطتين في المستوى الإحداثي وكذلك إيجاد البعد بشكل تقريبي بين المدن باستخدام نظرية فيثاغورس.

مثال 3) مثل الزوجين المرتبين $(-4, 0)$ و $(-1, 4)$ في المستوى الإحداثي ثم جد المسافة بينهما .



أولاً: مثل النقطتين بالمستوي الإحداثي .

ثانياً: ارسم مثلثاً قائم الزاوية كما في الشكل المجاور .

ثالثاً: جد طول كل ضلع من الضلعين القائمين .

$b = 4$ وحدات ، $a = 3$ وحدات

رابعاً: استعمل نظرية فيثاغورس لإيجاد طول الوتر C


$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{المسافة بين نقطتين}$$

$$\Rightarrow c = \sqrt{9 + 16} \quad \text{دائماً موجبة}$$

$$\Rightarrow c = \sqrt{25} \Rightarrow c = 5$$

لذا المسافة بين النقطتين هو 5 وحدات

ملاحظة: يمكن الحصول على المثلث القائم الزاوية كما يأتي:



1- من تقاطع المستقيمين المرسمين من النقطتين موازيان للمحورين.

2- من تقاطع العمودين المرسمين من النقطتين على المحورين.

مثال 4) مثل كل زوج من الزوجين المرتبين $(-5, 3)$ و $(1, -1)$ ، $(0, 0)$ و $(-3, 3)$ في المستوى

الإحداثي ثم جد المسافة بينهما مقربة لأقرب عُشر.

أولاً: مثل كل نقطتين بالمستوي الإحداثي .

ثانياً: ارسم مثلثات قائمة الزاوية كما في الشكل المجاور .

ثالثاً: جد طول كل ضلع من الضلعين القائمين لكل مثلث .

المثلث في الربع الرابع: وحدات $a = 2$ ، وحدات $b = 5$

المثلث في الربع الثاني: وحدات $a = 3$ ، وحدات $b = 3$

رابعاً: استعمل نظرية فيثاغورس لإيجاد طول الوتر C

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{المثلث في الربع الرابع:}$$

$$\Rightarrow c = \sqrt{4 + 25}$$

$$\Rightarrow c = \sqrt{29} \Rightarrow c \approx 5.4$$



لذا المسافة بين النقطتين هو 5.4 وحدات تقريباً.

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{المثلث في الربع الثاني:}$$

$$\Rightarrow c = \sqrt{9 + 9}$$

$$\Rightarrow c = \sqrt{18} \Rightarrow c \approx 4.2$$

لذا المسافة بين النقطتين هو 4.2 وحدات تقريباً.



تأكّد من فهمك

مثل كلّ جدولٍ من الجداول التالية في المستوى الإحداثي :

1

X	0	-4	-3.5	5
Y	-1.5	1.5	-4	3.5

2

X	0	-2.5	0	2.5
Y	0	1.5	-3	0

الأسئلة (1-4)
مشابهة للمثالين (1,2)

3

X	-4	7	-3.5	0
Y	0	2.5	-4.5	-2.5

4

X	2	3	4	5
Y	0	0	0	0

مثل كلّ زوجٍ من الزوجين المرتبين في المستوى الإحداثي ثم جد المسافة بينهما مقربةً لأقرب عُشرٍ إذا كانت لا تمثل عدداً صحيحاً:

5 $\{1, 0\}$, $\{4, 4\}$

6 $\{0, 0\}$, $\{-5, 4\}$

7 $\{-4, -1\}$, $\{-1, -6\}$

8 $\{-3, -6\}$, $\{0, 0\}$

الأسئلة (5-10)
مشابهة للمثالين (3,4)

9 $\{7, 2\}$, $\{3, 5\}$

10 $\{-2, 0\}$, $\{0, 3\}$

تدرب وحلّ التمرينات

مثل كلّ جدولٍ من الجداول التالية في المستوى الإحداثي وحدد الشكل الهندسي الذي يمثله جدول القيم:



11

X	2	-2	-1	-5
Y	3.5	3.5	-4.5	-4.5

12

X	4	-4	0	0
Y	0	0	2	-5

اكتب الأزواج المرتبة من الشكل، ثم رتبها في جدول قيم:



مثل كلّ زوجٍ من الزوجين المرتبين في المستوى الإحداثي ثم جد المسافة بينهما مقربةً لأقرب عُشرٍ إذا كانت لا تمثل عدداً صحيحاً:

15 $\{6, 0\}$, $\{0, 3\}$

16 $\{-5, 0\}$, $\{0, 5\}$


17 $\{2, -4\}$, $\{4, 0\}$

18 $\{5, 1\}$, $\{2, 5\}$


19 $\{0, 0\}$, $\{-4, -4\}$

20 $\{-5, -1\}$, $\{-1, -6\}$


تدرب وحل مسائل حياتية



21 **خريطة:** تمثل كل وحدة على الخريطة 77km من المسافة الحقيقية. تقع مدينة الموصل في النقطة (5, -3) ومدينة بغداد على نقطة الأصل. ما المسافة التقريبية بين بغداد و الموصل ؟



22 **صيد:** تمثل كل وحدة على الشكل البياني 50m من المسافة الحقيقية. إذا وقف الصياد في النقطة (1, 2) ووجه بندقيته الى طير في النقطة (3, -3). ما المسافة التقريبية بين الطير والصياد؟



23 **غواصة:** تمثل كل وحدة على الشكل البياني 5km من المسافة الحقيقية. غواصة تحت الماء تقف في النقطة (-4, -5) تريد أن تصيب هدفاً في النقطة (0, 2). ما المسافة التقريبية بين الهدف والغواصة ؟

فكر

تحذ: مثل كل جدول من الجداول التالية في المستوي الإحداثي وحدد الشكل الهندسي الذي يمثله.

24

X	3	-3	-3	3
Y	3	3	-3	-3

25

X	1	-5	1	-2
Y	0	0	3	3

26 **أصح الخطأ:** قال خالد أن الإحداثي الصادي (Y) لنقطة تقع على محور السينات (X) يمثل المسافة بين النقطة ونقطة الأصل. حدد خطأ خالد وصححه.

27 **حس عددي:** هل أن جدول القيم التالي يمثل شكلاً مضلعاً سداسياً عند تمثيله على المستوي الإحداثي؟ ولماذا؟

X	4	0	-4	-4
Y	4	4	-4	0

X	1	1	6	6
Y	3	1	3	1

أكتب اسم الشكل الهندسي الذي يمثله جدول القيم

التالي عند تمثيله في المستوي الإحداثي .

Chapter Test

اختبار الفصل

صنف العدد من حيث كونه عدداً نسبياً أو غير نسبيٍّ أو غير حقيقي :

- 1 $-\sqrt{49}$ 2 $\sqrt{13}$ 3 $\frac{0}{-6}$ 4 $\sqrt{\frac{9}{25}}$ 5 $\sqrt{-16}$

قدر الجذور التربيعية التالية بالتقريب لأقرب عُشر. ثم مثلها على مستقيم الأعداد :

- 6 $\sqrt{15} \approx \dots$ 7 $-\sqrt{32} \approx \dots$ 8 $\sqrt{\frac{16}{21}} \approx \dots$ 9 $\sqrt{7.3} \approx \dots$

قارن بين الأعداد الحقيقية مستعملاً الرموز $(> , < , =)$:

- 10 $\sqrt{17}$ $\left[\right]$ $4\frac{1}{5}$ 11 $-\sqrt{9}$ $\left[\right]$ $-\sqrt{6.25}$ 12 $\frac{0}{\sqrt{7}}$ $\left[\right]$ $\frac{0}{\sqrt{5}}$

2.236... , $\sqrt{2.25}$, $\sqrt{2}$

13 رتب الأعداد الحقيقية التالية من الأصغر الى الأكبر:

$-\sqrt{11}$, $-3\frac{1}{4}$, -3.33

14 رتب الأعداد الحقيقية التالية من الأكبر الى الأصغر:

اكتب مثلاً لكل خاصية من الخواص الآتية:

- 15 $1 \times a = a \times 1 = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$ 16 $a \times \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \times a = 1$, $\forall a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$

جد النظير الجمعي للأعداد الحقيقية الآتية:

- 17 $5\sqrt{11} - 7$ 18 $-\sqrt{1} - \sqrt{2}$ 19 $\sqrt{12} - \frac{1}{16}$ 20 $\frac{3}{\sqrt{5}} - \frac{4}{\sqrt{5}}$

جد النظير الضربي للأعداد الحقيقية الآتية :

- 21 $\sqrt{\frac{1}{12}}$ 22 $-6\sqrt{3} - 7$ 23 $\sqrt{5} - \frac{1}{5}$ 24 $-3\frac{1}{2} - 1\frac{4}{3}$

قدر النظير الضربي للجذور التربيعية التالية بالتقريب لأقرب عُشر :

- 25 $\sqrt{\frac{1}{7}}$ 26 $-\sqrt{\frac{1}{8}}$ 27 $\sqrt{\frac{11}{25}}$ 28 $\sqrt{\frac{1}{5.6}}$

بسط الجمل العددية التالية باستعمال خصائص الأعداد الحقيقية:

- 29 $\frac{6 - 2\sqrt{3}}{3\sqrt{5}}$ 30 $\frac{\sqrt{8} - 7\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ 31 $\frac{6\sqrt{8}}{\sqrt{6}} \div \frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{27}}$ 32 $\frac{3\sqrt{8}}{\sqrt{45}} \times \frac{\sqrt{125}}{\sqrt{32}}$

- 33 $\sqrt{3} \cdot 9 + \sqrt{3} \cdot (-2\sqrt{27})$ 34 $\sqrt{7} \cdot \sqrt{7} - \sqrt{14} \cdot (-9\sqrt{2})$ 35 $\frac{1}{\sqrt{5}} \sqrt{11} + \frac{1}{5} \sqrt{50} - \sqrt{55}$

جد الجذرين التربيعين الموجب والسالب للأعداد الآتية :

- 36 9 37 225 38 $\frac{25}{36}$ 39 1.21 40 10.24

حدد ما إذا كان كل مثلث بالأضلاع المعطاة هو مثلث قائم الزاوية . وتحقق من إجابتك:

- 41 3cm , 5cm , 6cm 42 7cm , 5cm , $\sqrt{74}$ cm 43 2cm , 1.5cm , 2.5cm

مثل كل زوج من الزوجين المرتبين في المستوي الإحداثي ثم جد المسافة بينهما مقربة لأقرب عُشر إذا

كانت لاتمثل عدداً صحيحاً .

- 44 $\{3, 0, 3\}$ 45 $\{-4, 0, 4\}$ 46 $\{-1, 5, -4, 2\}$

- 47 $\{4, -1, 1, -5\}$ 48 $\{0, 0, -3, -3\}$ 49 $\{-2, -3, -4, 1\}$

Polynomials

الحدوديات

الدرس [3-1] جمع المقادير الجبرية وطرحها.

الدرس [3-2] ضرب حد جبري في مقدار جبري.

الدرس [3-3] ضرب المقادير الجبرية.

الدرس [3-4] قسمة مقدار جبري على حد جبري.

الدرس [3-5] تحليل المقادير الجبرية.

حوض كبير للأسماك في أحد المجمعات التجارية قاعدته مربعة الشكل. ما ارتفاع الحوض إذا كان حجمه $8192m^3$ وطول ضلع قاعدته $32m$ ؟

اكتب العامل (م) والمتغير (غ) في الحدود الجبرية الآتية :

1 $-2|xy,$ المتغير..... العامل.....

2 $30r^2v^2$ المتغير..... العامل.....

3 $\sqrt{16}h^3k^2,$ المتغير..... العامل.....

4 $\frac{1}{2}z^2y,$ المتغير..... العامل.....

5 $10w^3h,$ المتغير..... العامل.....

6 $w^5z^2,$ المتغير..... العامل.....

جد ناتج جمع الحدود الجبرية الآتية :

7 $5h^2k + 10h^2k + \frac{1}{2}h^2k + |-\frac{1}{5}|h^2k$

8 $x^2y^2z + \frac{1}{3}x^2y^2z + 6x^2y^2z$

9 $2r^2v + \frac{1}{4}r^2v + 16r^2v + |-\frac{1}{2}|r^2v$

10 $|-7|a^2b + 14a^2b + \frac{1}{28}a^2b$

11 $10xy + \frac{1}{20}xy + \frac{1}{5}xy + 4xy$

12 $7a^2b^2z + |-18|a^2b^2z + 9a^2b^2z$

13 $2x^4y^2 + \frac{1}{5}x^4y^2 + |-\frac{1}{5}|x^4y^2$

14 $12g^2h^2 + \frac{1}{3}g^2h^2 + \frac{1}{4}g^2h^2$

جد ناتج طرح الحدود الجبرية الآتية :

15 $\frac{1}{25}h^2k - 15h^2k - 5h^2k - |-\frac{1}{5}|h^2k$

16 $16r^2v^2 - \frac{1}{32}r^2v^2 - 64r^2v^2$

17 $\frac{2}{3}xy - \frac{10}{6}xy - |-\frac{1}{3}|xy$

18 $30a^2b^2 - 5a^2b^2 - 15a^2b^2$

19 $|-15|z^2v^2 - |-35|z^2v^2 - 5z^2v^2$

20 $24w^2z - \sqrt{144}w^2z - 9w^2z$

جد ناتج ضرب الحدود الجبرية الآتية :

21 $)2x()20y($

22 $)6z^2()3v^2($

23 $)|-20|z()r^3v^3($

24 $10y)2x+60z+4($

25 $30z^2)\frac{1}{3}v^2 + \frac{1}{15}v^3y + \frac{2}{30}mn($

26 $3y)20m^2n+4($

جد القيمة العددية للمقادير الجبرية الآتية :

27 $\frac{1}{2}z^2y^2 + 3zy + w; w=2, z=4, y=3$

28 $3h^3k^2 - 5h + 4; h=5, k=3$

29 $|-25|r^2v^2 + \frac{1}{3}v + 5; r=1, v=12$

30 $3xy - 2xy + 6; x=2, y=10$

جد المخرجات لقاعدة الدالة للمدخلات الآتية : 31

المخرجات	قاعدة الدالة $2x^2 + 4$	المدخلات
		-2
		0
		2

تَعَلَّم



حمولتان من المواد الغذائية تحتوي
الحمولة الاولى على الرز والسكر
والطحين بالكيلوغرامات وعلى
الترتيب $54x^3$, $25y^5$, $30z^2$
والحمولة الثانية من المواد نفسها
 $36x^3$, $20y^5$, $25z^2$ فما مجموع
الحمولتين، وما الفرق بينهما؟

فكرة الدرس

- جمع المقدار الجبري .
- طرح المقدار الجبري .

المفردات

- جمع .
- طرح .

Addition of an Algebraic Expressions

[3-1-1] جمع المقادير الجبرية

تعلمت سابقا جمع الحدود الجبرية المتشابهة اما في هذا الدرس سنتعرف إلى جمع المقادير الجبرية (لكي
نجمع مقدارين جبريين) نستعمل خصائص التبديل والتجميع في جمع الحدود المتشابهة .

(مثال 1) جذ مجموع الحمولتين الاولى والثانية معا.

(الحمولة الاولى) $54x^3 + 25y^5 + 30z^2$

(الحمولة الثانية) $36x^3 + 20y^5 + 25z^2$

(مجموع الحمولتين) $54x^3 + 25y^5 + 30z^2 + 36x^3 + 20y^5 + 25z^2$

(استعمال خاصية التجميع) $54x^3 + 36x^3 + 25y^5 + 20y^5 + 30z^2 + 25z^2$

(اجمع الحدود المتشابهة) $90x^3 + 45y^5 + 55z^2$

لذا مجموع الحمولتين بالكيلو غرام هو $90x^3 + 45y^5 + 55z^2$

(مثال 2) جذ ناتج جمع المقادير الجبرية الاتية :

i) $\frac{1}{6}w^2z + \sqrt{2}r^2v^2 + \sqrt{5}h^3k^2 + \frac{1}{3}w^2z + \sqrt{2}r^2v^2 + 2\sqrt{5}h^3k^2$

(استعمال خاصية التجميع) $\frac{1}{6}w^2z + \frac{1}{3}w^2z + \sqrt{2}r^2v^2 + \sqrt{2}r^2v^2 + \sqrt{5}h^3k^2 + 2\sqrt{5}h^3k^2$

(اجمع الحدود المتشابهة) $\frac{1}{6}w^2z + 2\sqrt{2}r^2v^2 + 3\sqrt{5}h^3k^2$

(ناتج جمع المقدارين) $\frac{1}{6}w^2z + 2\sqrt{2}r^2v^2 + 3\sqrt{5}h^3k^2$

ii) $\sqrt{2}xy^2 + \frac{1}{5}xy + 4\sqrt{3}x^2y + 3\sqrt{2}xy^2 - \frac{1}{5}xy + \sqrt{3}x^2y$

(استعمال خاصية التجميع) $\sqrt{2}xy^2 + 3\sqrt{2}xy^2 + \frac{1}{5}xy - \frac{1}{5}xy + 4\sqrt{3}x^2y + \sqrt{3}x^2y$

(اجمع الحدود المتشابهة) $4\sqrt{2}xy^2 + 0 + 5\sqrt{3}x^2y$


(ناتج جمع المقدارين) $4\sqrt{2}xy^2 + 5\sqrt{3}x^2y$

$$\text{iii)} -15|m^2n + 12gh + \frac{1}{20} r^2v^3(+) -45|m^2n + 10gh + \frac{2}{30} r^2v^3($$

$$=) -15|m^2n + (-45|m^2n(+) 12gh + 10gh(+) \frac{1}{20} r^2v^3 + \frac{1}{15} r^2v^3(\text{استعمل خاصية التجميع}$$

$$=) 15m^2n + 45m^2n(+) 22gh(+ \frac{3+4}{60} r^2v^3 \text{اجمع الحدود المتشابهة}$$

$$= 60m^2n + 22gh + \frac{7}{60} r^2v^3 \text{ناج جمع المقدارين}$$



مثال 3) محيط مثلث متساوي الاضلاع هو $2n^2 + 4y + 5$ ومحيط مربع هو $4n^2 + 6y + 10$ اكتب المقدار الجبري الذي يمثل مجموع محيطي المثلث والمربع.

$$2n^2 + 4y + 5 \quad 4n^2 + 6y + 10$$

$$) 2n^2 + 4y + 5(+) 4n^2 + 6y + 10($$

$$=) 2n^2 + 4n^2(+) 4y + 6y(+) 5 + 10($$

$$= 6n^2 + 10y + 15$$

استعمل خاصية التجميع

اجمع الحدود المتشابهة

ناج جمع المقدارين

$$6n^2 + 10y + 15$$

لذا مجموع محيطي المثلث والمربع بالامتار

[3-1-2] طرح المقادير الجبرية

Subtraction of an Algebraic Expressions

تعلمت سابقا طرح الحدود الجبرية المتشابهة اي عند طرح حد جبري من حد جبري اخر اجمع الحد الجبري الاول مع النظير الجمعي للحد الجبري الثاني وسوف نتعلم طرح المقادير الجبرية ولطرح مقدار جبري من مقدار جبري اخر اعكس إشارة كل حد من حدود المقدار الجبري الثاني (اي النظير الجمعي للمقدار الجبري).

مثال 4) من فقرة تعلم جد الفرق بين الحمولتين .

$$54x^3, 25y^5, 30z^2(\text{الحمولة الاولى}$$

$$36x^3, 20y^5, 25z^2(\text{الحمولة الثانية}$$

$$54x^3 + 25y^5 + 30z^2$$

(الحمولة الاولى)

$$36x^3 + 20y^5 + 25z^2$$

(الحمولة الثانية)

$$=) 54x^3 + 25y^5 + 30z^2(-) 36x^3 + 20y^5 + 25z^2($$

اجد الفرق بين الحمولتين

$$=) 54x^3 + 25y^5 + 30z^2(+) -36x^3 - 20y^5 - 25z^2($$

تغيير اشارة الحدود الجبرية في المقدار الثاني

$$=) 54x^3 - 36x^3(+) 25y^5 - 20y^5(+) 30z^2 - 25z^2($$

استعمل خاصية التجميع

$$= 18x^3 + 5y^5 + 5z^2$$

$$18x^3 + 5y^5 + 5z^2 \text{ لذا الفرق بين الحمولتين}$$

مثال 5)

جدّ نأجّ طرأ المأأأر الأبرأة الأأة :

$$i) (3\sqrt{2}xy - 2|zw - \sqrt{4}r^2v^2) (2\sqrt{2}xy - 10zw + 4r^2v^2)$$

$$= (3\sqrt{2}xy - 2|zw - \sqrt{4}r^2v^2) (2\sqrt{2}xy - 10zw + 4r^2v^2)$$

$$= (3\sqrt{2}xy - 2zw - 2r^2v^2) (2\sqrt{2}xy + 10zw - 4r^2v^2)$$

$$= (3\sqrt{2}xy - 2\sqrt{2}xy) (2\sqrt{2}xy + 10zw - 4r^2v^2) - 2zw(2\sqrt{2}xy + 10zw - 4r^2v^2) - 2r^2v^2(2\sqrt{2}xy + 10zw - 4r^2v^2)$$

$$= \sqrt{2}xy + 8zw - 6r^2v^2$$

$$ii) (3x^2 - 15y - 6) (7x^2 - 9y + 6)$$

$$= (3x^2 - 15y - 6) (7x^2 + 9y - 6)$$

$$= (3x^2 + 9y - 6) (7x^2 - 15y + 6) - 6(7x^2 - 15y + 6)$$

$$= -4x^2 - 6y - 12$$

أطرح المقدار الثاني من الأول

أضافة النظير الجمعي

أجمع الحدود المتشابهة

أجمع الحدود المتشابهة

مثال 6)

نافورة مربعة الشكل مساحتها $(2m^2 - 2m - 6)$

متر مربع تقع في منتصف حديقة مستطيلة الشكل

مساحتها $(3m^2 - 4m + 5)$ متر مربع ما مساحة

الحديقة المحيطة بالنافورة؟

$$(3m^2 - 4m + 5) - (2m^2 - 2m - 6)$$

$$= (3m^2 - 4m + 5) - 2m^2 + 2m + 6$$

$$= (3m^2 - 2m^2) - 4m + 2m + 5 + 6$$

$$= m^2 - 2m + 11$$

مساحة الحديقة

أضافة النظير الجمعي

أجمع الحدود المتشابهة

أجد المقدار

لذا مساحة الحديقة المحيطة بالنافورة $m^2 - 2m + 11$ متراً مربعاً



جدّ جمع المقادير الجبرية الآتية:

تأكّد من فهمك

$$1) (20x^2y^2 + \frac{1}{2}z^3w^2 + 5) (20x^2y^2 + \frac{3}{2}z^3w^2 + 10)$$

$$2) (\sqrt{2}h^3 + 2k^2y + 9) (2\sqrt{2}h^3 + k^2y + 6)$$

$$3) (|\sqrt{5}m^3n^2 + \frac{1}{5}r^2v^2 + 3) (5\sqrt{5}m^3n^2 + 2r^2v^2 + 4)$$

الأسئلة 1 - 3)

مشابهة للمثالين 1-2

جدّ طرأ المقادير الجبرية الآتية:

$$4) (7m^2n^2 + \frac{1}{3}y^2 + \sqrt{7}) (6m^2n^2 + \frac{2}{9}y^2 + 2\sqrt{7})$$


$$5) (8a^3b + 10z - 4) (2a^3b + 5z + 3)$$

$$6) (\frac{1}{25}hk + 2y - 9) (5hk - y - 8)$$

الأسئلة 4 - 6)

مشابهة للمثالين 4-5

7) ما محيط الشكل المجاور



السؤال 7)

مشابهة للمثال 3

تدرب وحل التمرينات

اجمع المقادير الجبرية الآتية:

- 8) $-12|x^2y^2z + 2ab + 4(,)x^2y^2z + ab - 2($
- 9) $4\sqrt{2} r^2v^2 + 2hk + 3(,)\sqrt{2} r^2v^2 + 5hk + 6($
- 10) $\frac{1}{10}zw + 10x + 2(,)\frac{2}{5}zw + 10x + 2($
- 11) $7m^2n^2 - |3|y + \sqrt{7}(,)7m^2n^2 + \frac{1}{3}y - 2\sqrt{7}($
- 12) $2\sqrt{2} a^3b + 20z - 4\sqrt{5}, \sqrt{2} a^3b + 5z + \sqrt{5}$
- 13) $\frac{1}{25}hk + 2x - 9(,)\frac{1}{5}hk - 10x - 8($

جد طرح المقادير الجبرية الآتية:

تدرب وحل مسائل حياتية




14 **كهربائية** في احد محال الاجهزة الكهربائية بيعت في شهر آذار اجهزة الغسالات بمبلغ $(\sqrt{2} x^3 + \frac{1}{2}yz + 4)$ دينار وأجهزه التبريد بمبلغ $(\sqrt{2} x^3 + 4yz + 8)$ دينار ما مجموع المبيعات للمحل في شهر آذار؟




15 **محطات:** انطلق قطاران من المحطة نفسها باتجاهين متعاكسين اصبح احدهما على بعد $(2|x^2 + 4y + 20|)$ كيلومتر من المحطة في حين أصبح القطار الثاني على بعد $(4x^2 + 10y + 2)$ كيلومتر من المحطة جد المسافة بين القطارين.

فكر



16 **تحذ:** اذا كان محيط المثلث المجاور $4x + 12y + 8$ متر

فما طول الضلع المجهول؟



17 **تطبيق هندسي:** في الشكل المجاور مساحة المربع الكبير $(2x^2 + 24x + 3)$ متر

مربع ومساحة المربع الصغير $(x^2 - 21x + 1)$ (متر مربع ما الفرق بين مساحة

المربع الكبير والمربع الصغير؟

18 **حسب عددي:** ما المقدار الذي تطرحه من $(7x^2 - 4y^2 + 5)$ لتحصل على الناتج

$(x^2 + 3)$ ؟

أكتب

مسألة من واقع الحياة عن جمع وطرح المقادير الجبرية.



تَعَلَّم

صنع احمد صندوقاً من الخشب
قاعدته مستطيلة الشكل إذا كان
طول الصندوق بالسنتيمترات
($\sqrt{10}m^2n^2$) وعرضه
بالسنتيمترات ($\sqrt{5} m^2n^2$) ما
مساحة قاعدة الصندوق؟

فكرة الدرس

- ضرب حد جبري في حد جبري.
- ضرب حد جبري في مقدار جبري.
- المفردات
- حد جبري.
- مقدار جبري.

[3-2-1] ضرب حد جبري في حد جبري

Multiplying an Algebraic Term by an Algebraic Term

تعلمت سابقاً ضرب حد جبري في حد جبري إذا كانت المتغيرات مختلفة أما في هذا الدرس سوف نتعلم ضرب حد جبري في حد جبري باستعمال الخواص الآتية: i) $a^{nm} = (a^n)^m$ ii) $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ iii) $a^0 = 1$ إذ إن a عدد حقيقي ولا يساوي صفراً.

مثال 1) مساحة قاعدة الصندوق = الطول × العرض

$$A = \sqrt{10}m^2n^2 \times \sqrt{5} m^2n^2$$

$$= \sqrt{10} \times \sqrt{5} (m^2 \cdot m^2 \cdot n^2 \cdot n^2)$$

$$= \sqrt{10} \times \sqrt{5} (m^{2+2} \cdot n^{2+2})$$

$$= \sqrt{50}m^4n^4$$

$$= 5\sqrt{2} m^4n^4$$

اضرب المعاملات والمتغيرات

خواص الأعداد الحقيقية

عند الضرب جمع الأسس

لذا مساحة المستطيل $5\sqrt{2} m^4n^4$ بالسنتيمترات المربعة

مثال 2) جد ناتج الضرب في كل ما يأتي :

i) $(4x^3y^4)(6x^5y^5) = 4 \times 6 (x^3 \times x^5)(y^4 \times y^5) = 24x^{3+5} \times y^{4+5} = 24x^8y^9$

ii) $(9h^2k)(-2h^3k) = 9(-2)(h^2 \times h^3)(k \times k) = -18h^5k^2$

iii) $(-12r^2v)(-4r^2vn) = 12 \times 4 (r^{2+2}v^{1+1}n) = 48r^4v^2n$

iv) $(\sqrt{36}z^2w^2)(6zk) = 6(6)(z^{2+1}w^2k) = 36z^3w^2k$

v) $(\sqrt{7} g^2h^2)(\sqrt{14}g)(\sqrt{7})(\sqrt{14})(g^2 \cdot g)(h^2) = 7\sqrt{2} g^3h^2$

vi) $(\frac{5}{7} a^3b^3)(\frac{49}{25} a^{-2}b^{-3}) = (\frac{5}{7} \times \frac{49}{25}) (a^{3+(-2)}b^{3+(-3)}) = \frac{7}{5} ab^0 = \frac{7}{5} a \times 1 = \frac{7}{5} a$

تعلمت سابقا ضرب حد جبري بمقدار جبري باستعمال خاصية التوزيع اذا كانت المتغيرات مختلفة والآن سوف نتعلم ضرب حد جبري بمقدار جبري اذا كانت الأساسات متشابهة أو مختلفة باستعمال خاصية التوزيع ايضا.

مثال 4) جد ناتج الضرب في كل مما ياتي :

i) $(-5h^2k)3h^4k^2 + 6h^2k = (-5h^2k)3h^4k^2 + (-5h^2k)6h^2k$ (باستعمال خاصية التوزيع والتجميع)

$= (-5)(3)(h^2 \times h^4) (\times) k \cdot k^2 + (-5)(6) (\times) h^2 \cdot h^2 (\times) k \cdot k$

$= -15h^{2+4} k^{1+2} + (-30)(h^{2+2} k^{1+1})$ (عند الضرب تجمع الاسس)

$= -15h^6k^3 - 30h^4k^2$

ii) $(3m^3n^4)1 - 5mn^5 = (3m^3n^4)1 + (-5mn^5)$ (باستعمال خاصية التوزيع والتجميع)

$= (3)(1)m^3n^4 + (-5)(3)(m^3 \cdot m \cdot n^5 \cdot n^4)$

$= 3m^3n^4 - 15m^{3+1}n^{5+4}$ (عند الضرب تجمع الاسس)

$= 3m^3n^4 - 15m^4n^9$

iii) $(\frac{1}{3}x^2y)\frac{1}{2}xy^2z + 4x^2yz = (\frac{1}{3}x^2y)\frac{1}{2}xy^2z + (\frac{1}{3}x^2y)4x^2yz$

(باستعمال خاصية التوزيع والتجميع)

$= (\frac{1}{3})(\frac{1}{2})(x^2 \cdot x)(y \cdot y^2 \cdot z) + (\frac{1}{3})(4)(x^2 \cdot x^2)(y \cdot y \cdot z)$ (عند الضرب تجمع الاسس)

$= \frac{1}{6}x^3y^3z + \frac{4}{3}zy^2$

iv) $(\sqrt{5})5z^2w^2 + \sqrt{5}zw + 2$

$= \sqrt{5}(5(z^2w^2) + \sqrt{5}(\sqrt{5}zw + 2\sqrt{5}))$ (باستعمال خاصية التوزيع والتجميع)

$= 5\sqrt{5}z^2w^2 + 5zw + 2\sqrt{5}$ (عند الضرب تجمع الاسس)

v) $(\sqrt{2}x^3y)3\sqrt{2}x^2y^{-1} - \sqrt{2}x^3y^2$

$= (\sqrt{2})(3\sqrt{2})(x^3x^2 \cdot yy^{-1}) - (\sqrt{2})(\sqrt{2})(x^3x^3yy^2)$ (باستعمال خاصية التوزيع والتجميع)

$= 6xy^0 - 2x^0y^3$ (عند الضرب تجمع الاسس)

$= 6x - 2y^3$

مثال 5) ملعبٌ مستطيل الشكل طوله بالامتار $4x^2$ وعرضه بالامتار $2x^3 - 4xy - 3$ ما مساحة



الملعب؟

مساحة المستطيل = الطول × العرض

$$A = 4x^2(2x^3 - 4xy - 3)$$

$$= 4x^2(2x^3) - 4x^2(4xy) - 4x^2(3)$$

$$= 8x^5 - 16x^3y - 12x^2$$

لذا مساحة الملعب $8x^5 - 16x^3y - 12x^2$ متراً مربعاً

باستعمال خاصية التوزيع

جد ناتج الضرب في كلِّ مما يأتي:

تأكّد من فهمك

1) $\frac{\sqrt{3}}{4} m^2n(2m^3)$

2) $20x^5yz(10xy)$

3) $8r^3v^2(-5|r^2v+6r^2v^2)$

4) $\sqrt{2} x^2y^2\sqrt{2} xy^5-y^5$

5) $\sqrt{7} z^2w(z^{-1}wy+2\sqrt{7} z^4w^2y)$

6) $\frac{1}{4}h^2k(\frac{\sqrt{16}}{4} h^{-2}kr + 6h^3k^{-1}r^2 + \sqrt{8})$

الأسئلة 1 - 2)

مشابه للمثال 2)

الأسئلة 3 - 6)

مشابه للمثال 4)

جد ناتج الضرب في كلِّ مما يأتي :

تدرب وحل التمرينات

7) $m^4n(m^3n^{-4})$

9) $-7r^4vy^3(5rv^4y^2)$

11) $y-2(xy)$

13) $8w-4(7w^{-5})$

15) $\frac{1}{2}ab^2c(2a^{-1}b^{-2}c^{-1})$

17) $hk(6h^2k^2 - 7h^2y + 2zy)$

19) $\frac{-1}{3}r^2)r^2 - \sqrt{7} r^2vy$

21) $x^{-4})x-x^3y^5 + \sqrt{2} x^{-2}$

23) $|-3|r^2v^2)|4|rv + 25$

25) $\sqrt{9} gh)2g^4h^2 + 3gh + 5$

8) $\sqrt{5} a^2b^2c^3)2\sqrt{5} a^4$

10) $\sqrt[3]{-27} x^2y^2) \sqrt[3]{-8} xyz$

12) $|-3|z(wx^4z^{-3}$

14) $-3xy^2z)5x^4y^2+ 4xy^2z - 6x^2y^2z^3$

16) $5a^2b + 4a^3b - \frac{1}{2}abc^2(8a^{-2}b$

18) $12x^6y^7)1 - \frac{1}{2} -x^3y$


20) $4ab)a^2b - \sqrt[3]{64} abc$

22) $5m^{-3})2m+nz^4 + 4$

24) $\frac{1}{6}yz)36y^2z^2 + 6yz + 36$

26) $|-8|z^6w^5)|-2|z^{-6}w^{-5} + \frac{1}{4}z^{-4}w^{-5}$

تدرب وحل مسائل حياتية



27

هندسة: مثلث طول قاعدته بالسنتيمترات $(5xy^2)$ وارتفاعه بالسنتيمترات $(3x^2y^2 - 4xy)$ ما مساحة المثلث؟

28

تكنولوجيا: اشترك احمد في خدمة الانترنت بسرعة $4x^5y^2$ في حين تزيد سرعة اشترك محمد بمقدار $5xy^2$ عن سرعة اشترك أحمد. فما سرعة اشترك أنور التي تمثل حاصل ضرب سرعتي اشترك أحمد ومحمد؟

29

أحياء: اذا كان عدد نحلات مملكة النحل $10w^3z$ وتضاعفت بمقدار $5z^2$ فكم اصبح عدد النحل؟


فكر

30

أصحح الخطأ: كتب علي ناتج ضرب المقدار $(\sqrt{2} h^2k^2) \sqrt{2} h^2k^2 - \sqrt{4} h^3k$ على شكل $4h^3k^4 - 4h^5k^3$ جد خطأ علي وصححه .

31

تحذّر: ما الحدّ الجبريّ الذي نضربه في المقدار $\frac{5}{2} x^2y + 5x - 4$ فيكون الناتج $10x^4y^4 + 20x^3y^3 - 16x^2y^3$



32

تحذّر: صندوق على شكل منشور رباعيّ مساحه قاعدته z^2 وحدة مربعة وارتفاعه $(5z^2 + 5)$ وحدة ما حجم المنشور؟

33

احصائيات: اذا كان عدد سكان محافظة ديالى $(2x^3y^3)$ نسمة في حين كان سكان محافظة بغداد $(20x^2y^2)$ مرة من عدد سكان محافظة ديالى. فما عدد سكان محافظة بغداد؟

اكتب

حاصل ضرب حدّ جبريّ في مقدار جبريّ وجد ناتج الضرب.

Multiplying Algebraic Expressions

تَعَلَّم



زرع فلاح ارضاً للخضروات
على شكل مستطيل طول الارض
بالامتار $(\sqrt{5}x^2y+x)$ وعرضها
بالامتار $(\sqrt{25}x^2y+4)$ ما مساحة
الارض؟

فكرة الدرس

- ضرب مقدارين كل مقدار من حدين.
- ضرب مقدارين الاول من حدين والثاني من ثلاثة حدود.
- المفردات
- حدانية.
- ثلاثة حدود.
- ضرب عمودي.
- ضرب أفقي.

[4-3-1] ضرب مقدارين جبريين كل منهما من حدين

Multiplying Two Algebraic Expression Each of Them With Two Terms

تعلمت سابقاً ضرب حدّ جبري في مقدار جبري وسوف تتعلم في هذا الدرس ضرب مقدار جبري في مقدار جبري كل منهما يتكون من حدين باستعمال خاصية التوزيع. هناك نوعان من الضرب الأفقي والعمودي.

مثال 1) مساحة المستطيل (الارض) (=) الطول × العرض

$$\begin{aligned}
 A &= (\sqrt{5}x^2y+x)(\sqrt{25}x^2y+4) && \text{مساحة المستطيل (الخضراوات)} \\
 &= \sqrt{5}x^2y \times \sqrt{25}x^2y + \sqrt{5}x^2y \cdot 4 + x \cdot \sqrt{25}x^2y + 4 \cdot x && \text{باستعمال خاصية التوزيع} \\
 &= \sqrt{5}x^2y \times 5x^2y + 4\sqrt{5}x^2y + 5x^3y + 4x && \text{باستعمال الضرب الأفقي} \\
 &= 5\sqrt{5}x^4y^2 + 4\sqrt{5}x^2y + 5x^3y + 4x && \text{مساحة الارض بالامتار المربعة}
 \end{aligned}$$

مثال 2) جد ناتج الضرب (الافقي) في كل مما يأتي :

$$\begin{aligned}
 \text{i)} & \left(\frac{1}{2}x^2+y^2\right)(x^3+2y^2) && \text{باستعمال خاصية التوزيع} \\
 &= \frac{1}{2}x^2 \cdot x^3 + \frac{1}{2}x^2 \cdot 2y^2 + y^2 \cdot x^3 + y^2 \cdot 2y^2 && \text{باستعمال الضرب الأفقي} \\
 &= \frac{1}{2}x^5 + x^2y^2 + x^3y^2 + 2y^4 \\
 \text{ii)} & (-2|ab + |-5|bc)(3 + ab) && \text{باستعمال خاصية التوزيع} \\
 &= (-2) \times 3(ab + 2a^2b^2) + (-5) \times 3(bc + 5ab^2c) && \text{باستعمال الضرب الأفقي} \\
 &= 6ab + 2a^2b^2 + 15bc + 5ab^2c
 \end{aligned}$$

مثال 3) جذ ناتج الضرب العمودي (لكل مما يأتي:

i) $(3th^2 - 7)(5 + th^2)$

$(5 + th^2)$

$\times (3th^2 - 7)$

$\underline{15th^2 + 3t^2h^4}$

$\underline{-35 - 7th^2}$

$-35 + 8th^2 + 3t^2h^4$

اضرب بالطريقة العمودية $(3th^2)$

في المقدار الآخر

اضرب بالطريقة العمودية (-7)

في المقدار الآخر

اضع الحدود المتشابهة تحت بعض

اجمع الحدود

ii) $(\frac{2}{9}z^2w^3 + 1)(3zw + 4)$

$3zw + 4$

$\times \frac{2}{9}z^2w^3 + 1$

$\underline{\frac{2}{3}z^3w^4 + \frac{8}{9}z^2w^3}$

$\underline{3zw + 4}$

$\frac{2}{3}z^3w^4 + \frac{8}{9}z^2w^3 + 3zw + 4$

اضرب بالطريقة العمودية $(\frac{2}{9}z^2w^3)$

في المقدار الآخر

اضرب بالطريقة العمودية (1)

في المقدار الآخر

اضع الحدود المتشابهة تحت بعض

اجمع الحدود



مثال 4) ملعب كرة طائرة بعدها بالأمتار $(8y-6)$ و $(8y+3)$

ما مساحة الملعب ؟ مساحة الملعب = الطول × العرض

$A = (8y+3)(8y-6)$

$= 64y^2 - 48y + 24y - 18$

$= (64y^2 - 24y - 18)$

باستعمال خاصية التوزيع

باستعمال الضرب الافقي

مساحة الملعب بالأمتار المربعة

2-3-3 ضرب مقدارين الاول من حدين والثاني من ثلاثة حدود

Multiplying Two an Algebraic Expression The First of Tow Terms and of Three Terms

تعلمت سابقا في البند الاول من هذا الدرس ضرب مقدار جبري في مقدار جبري باستخدام خاصية التوزيع بالضرب العمودي والافقي وسوف تتعلم ضرب مقدار جبري يتكون من حدين مع مقدار جبري يتكون من ثلاثة حدود باستخدام الضرب الافقي والعمودي .

مثال 5) جذ ناتج الضرب الافقي (في كل مما يأتي :

i) $(-2x^2 - 8)(x^3 + x - 2)$

$= (-2x^2)x^3 + x(-2x^2) - 8(x^3 + x - 2)$

$= -2x^5 - 2x^3 + 4x^2 - 8x^3 - 8x + 16$

$= -2x^5 - 10x^3 + 4x^2 - 8x + 16$

باستعمال خاصية التوزيع

باستعمال الضرب الافقي

$$\text{ii} ()\sqrt{7} y^2 - 5z ()\sqrt{7} y^2 + 3z - \sqrt{7} w ($$

باستعمال خاصية التوزيع

$$=)\sqrt{7} y^2 ()\sqrt{7} y^2 + 3z - \sqrt{7} w (-)5z ()\sqrt{7} y^2 + 3z - \sqrt{7} w ($$

باستعمال الضرب الافقي

$$= 7y^4 + 3\sqrt{7} zy^2 - 7wy^2 - 5\sqrt{7} zy^2 - 15z^2 + 5\sqrt{7} zw$$

$$= 7y^4 - 2\sqrt{7} zy^2 - 7wy^2 - 15z^2 + 5\sqrt{7} zw$$

مثال 6) جذ ناتج الضرب العمودي لكل مما يأتي:

$$\text{i} ()z + 7 ()z^2 - 2z + 3 ($$

$$z^2 - 2z + 3$$

$$\times z + 7$$

$$\hline z^3 - 2z^2 + 3z$$

اضرب z في المقدار الآخر

$$+ 7z^2 - 14z + 21$$

اضرب 7 في المقدار الآخر

$$\hline z^3 + 5z^2 - 11z + 21$$

اجمع الحدود

$$\text{ii} ()x + y ()x - xy + y^2 ($$

$$x - xy + y^2$$

$$\times x + y$$

$$\hline x^2 - x^2y + xy^2$$

اضرب x في المقدار الآخر

$$xy - xy^2 + y^3$$

اضرب y في المقدار الآخر

$$\hline x^2 + xy - x^2y + y^3$$

اجمع الحدود

جذ ناتج الضرب افقياً لكل مما يأتي:

تأكد من فهمك

$$1) 3x - 2 ()4x + 1 ($$

$$2) \sqrt{5} x - 5 ()\frac{\sqrt{25}}{5} x - 6 ($$

الأسئلة 1-4)
مشابهة للمثال 2)

$$3) 2a^2b - \frac{5}{8} ()\frac{3}{5} ab^3 - \frac{1}{6} b ($$

$$4) -4m^3n^2 - 6mn^3 ()6mn - 3m ($$

جذ ناتج الضرب عمودياً لكل مما يأتي:

$$5) 2x - 5 ()-4x^3 + 5y - 7 ($$

$$6) 2x^2y - 3 ()xy^2 - 3z - 15w ($$

الأسئلة 5-8)
مشابهة للمثال 6)

$$7) 4a - 4y ()y^2 + 5z - 6 ($$

$$8) x^2 - 2x ()5x^2 + 3x - 4 ($$

جذ ناتج الضرب افقياً لكل مما يأتي:

تدرب وحل التمرينات

$$9) x^2y - 5z ()y + 4 ($$

$$10) \frac{1}{2}w^2 + 4 ()\frac{16}{\sqrt{4}}z^2 + 4 ($$

$$11) 3m - 5 ()10|m^2 - 3n ($$

$$12) x + 2y ()2x + 1 ($$

$$13) ab + 3c ()2a + c ($$

$$14) \sqrt{5} m - 3x ()m - 2x ($$

$$15) \sqrt{7} y - z ()\sqrt{7} yw + z ($$

$$16) 6m + 5 ()2x^2 - 3x - 5 ($$

$$17) h^2k + 1 ()rv + 5 ($$

جذ ناتج الضرب عمودياً لكل مما يأتي:

$$18) 3xy - 3 ()4y + 3z ($$

$$19) \frac{1}{2}m^2 + 2m ()4m^2 - 8m + 5 ($$


$$20) \sqrt{2} x^2 + 3y - 1 ()\sqrt{2} x^2 - 5y ($$

$$21) 3x - 5 ()6x^2 + 12x - 8 ($$

$$22) |-24| + 6y ()|-2|zw + 2y ($$

$$23) \sqrt{6} x^2 - 3y ()4y^2 + 10y + 2 ($$

تدرب وحل مسائل حياتية




24 **هندسة:** ما مساحة مثلث إذا كان طول قاعدته $(2x+3)$ وارتفاعه $(3x-1)$ بالامتار؟



25 **هندسة:** يحيط ممر عرضة x بحديقة مستطيلة الشكل طولها 8 أمتار وعرضها 6 أمتار. ما المساحة الكلية للحديقة والممر؟



26 **قوالب:** قالب للكيك مصنوع من الالمنيوم قاعدته مستطيلة الشكل ما مساحة قاعدته إذا علمت أن بعديه بالسنتيمترات كما في الشكل المجاور؟



27 جد مساحة المنطقة المظللة في الشكل المجاور؟

فكر

28 **تحذّر:** جد ناتج ما يأتي:

i) $y^m + y^n()y^{m-1} - y^{n-1} + y^n()$

ii) $(3 - z)3^2 + 3z + z^2()$

iii) $\frac{1}{2}t - \frac{1}{3}()$

iv) $(x + y)()x - y()$

29 **أصحح الخطأ:** كتبت سعاد ناتج المقدار $(2x+6)^2$ بالشكل الآتي: $4x^2 + 12x - 36$

اكتشف خطأ سعاد وصححه.

30 **مسألة مفتوحة:** اكتب مقداراً يحتوي على حدين ومقداراً يحتوي على ثلاثة حدود ثم جد ناتج ضربهما .

أكتب

مقدارين كل منهما من حدين ثم جد ناتج الضرب بالطريقة العمودية والافقية .



تَعَلَّم

في ألعاب الاسهم ينطلق السهم افقياً بحسب القانون $x = \frac{5h^2n}{h}$ إذ إن x يمثل سرعة السهم ويرمز h الى ارتفاع السهم بالامتار ويرمز n الى الزمن بالثواني جـ سرعة السهم اذا كانت قيمة $h=5, n=2$.

فكرة الدرس

- قسمة حد جبري على حد جبري.
- قسمة مقدار جبري على حد جبري.
- المفردات
- قسمة.
- حد جبري.

[3-4-1] قسمة حد جبري على حد جبري

Dividing an Algebraic Term to an Algebraic Term

تعلمت سابقاً قسمة الاسس اي ان $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ إذ أن a عدد حقيقي وان لا يكون المقام يساوي صفراً. اما في هذا الدرس سوف تدرس قسمة المقادير الجبرية اي حد جبري على حد جبري اي اقسام معامل الحد الاول على معامل الحد الثاني ثم اطرح الاسين في كل قوتين لهما الأساس نفسه .

مثال (1) حساب سرعة انطلاق السهم $x = \frac{5h^2n}{h}$

$$x = \frac{5h^2n}{h}$$

$$x = 5h^2h^{-1}n = 5hn$$

$$x = 5(5)(2)$$

$$x = 50 \text{ m/s}$$

اقسم الحد على h

نعوض قيمة h, n

لذا سرعة السهم عند انطلاقه 50 متراً في الثانية.

مثال (2) جد ناتج القسمة لكل مما يأتي إذ أن المقام لا يساوي صفراً:

i) $\frac{8x^7 y^4}{6x^5 y^3} = \frac{4}{3}x^{7-5}y^{4-3} = \frac{4}{3}x^2 y$

اقسم المعامل على المعامل ثم اطرح الاسين

ii) $\frac{-5h^6 k}{25h^2} = \frac{-1}{5} h^{6-2}k = \frac{-1}{5} h^4k$

iii) $\frac{\sqrt{16} r^2 v^2}{4rv} = \frac{4}{4}r^{2-1}v^{2-1} = r v$

iv) $\frac{\frac{1}{3}zw}{\frac{3}{z^3}} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} z^{-2}w = \frac{1}{9} z^{-2}w = \frac{w}{9z^2}$

v) $\frac{12a^5 b^2}{4a^4b^2} = \frac{12}{4} ab^{2-2} = 3a$

vi) $\frac{-32m^5n^2}{-8m^3n} = \frac{-32}{-8} m^{5-3}n^{2-1} = 4m^2n$

vii) $\frac{|-30|x^5 y^8 z^5}{10x^5 y^6} = \frac{30}{10} x^{5-5} y^{8-6} z^5 =$

$3x^0 y^2 z^5 = 3y^2 z^5$

تعلمت في البند السابق قسمة حد جبري على حد جبري وسوف تتعلم في هذا البند قسمة مقدار جبري على حد جبري إذ إن المقام لا يساوي صفراً أي طريقة تجزئة الكسور.

(مثال 3)

جدّ نأج قسمة المقدار الجبري باستعمال تجزئة الكسور إذ إن المقام لا يساوي صفراً لكل

ما يأتي:

$$i) \left(\frac{12x^3 + 24x^2}{6x} = \frac{12x^3}{6x} + \frac{24x^2}{6x} \right)$$

$$= 2x^{3-1} + 4x^{2-1} = 2x^2 + 4x$$

$$ii) \left(\frac{x^6y^2 - x^3y^5 - 3x^2y^7}{x^2y} = \frac{x^6y^2}{x^2y} - \frac{x^3y^5}{x^2y} - \frac{3x^2y^7}{x^2y} = x^{6-2}y^{2-1} - x^{3-2}y^{5-1} - 3x^{2-2}y^{7-1} \right)$$

$$= x^4y - xy^4 - 3x^0y^6 = x^4y - xy^4 - 3y^6$$

$$iii) \left(\frac{12z^5w^2 + 9z^4w^5 + 15z^2w^7}{3z^2w} = \frac{12z^5w^2}{3z^2w} + \frac{9z^4w^5}{3z^2w} + \frac{15z^2w^7}{3z^2w} \right)$$

$$= 4z^{5-2}w^{2-1} + 3z^{4-2}w^{5-1} + 5z^{2-2}w^{7-1} = 4z^3w + 3z^2w^4 + 5w^6$$

$$iv) \left(\frac{5a^9b^6 - 25a^3b^4}{5a^5b^4} = \frac{5a^9b^6}{5a^5b^4} - \frac{25a^3b^4}{5a^5b^4} = a^{9-5}b^{6-4} - 5a^{3-5}b^{4-4} \right)$$

$$= a^4b^2 - 5a^{-2}b^0 = a^4b^2 - \frac{5}{a^2}$$


$$v) \left(\frac{\sqrt{15}x^7 - \sqrt{20}x^4}{\sqrt{10}x^3} = \frac{\sqrt{15}x^7}{\sqrt{10}x^3} - \frac{\sqrt{20}x^4}{\sqrt{10}x^3} = \frac{\sqrt{5} \times \sqrt{3}}{\sqrt{5} \times \sqrt{2}} x^{7-3} - \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{2}} x^{4-3} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} x^4 - \sqrt{2} x \right)$$

$$vi) \left(\frac{64r^4v^2 - 16r^2v^2 - 32}{8rv} = \frac{64r^4v^2}{8rv} - \frac{16r^2v^2}{8rv} - \frac{32}{8rv} = 8r^3v - 2rv - \frac{4}{rv} \right)$$

$$vii) \left(\frac{\sqrt{49}x^2y^2 + \sqrt[3]{8}x^5y^6 - 7xy}{14xy} = \frac{\sqrt{49}x^2y^2}{14xy} + \frac{\sqrt[3]{8}x^5y^6}{14xy} - \frac{7xy}{14xy} \right)$$

$$= \frac{7x^2y^2}{14xy} + \frac{2x^5y^6}{14xy} - \frac{7xy}{14xy} = \frac{1}{2}xy + \frac{1}{7}x^4y^5 - \frac{1}{2}$$

(مثال 4)

في الشكل المجاور إذا كانت قاعدة المثلث $2xy$ ومساحته $x^2 - xy + y^2$ جد ارتفاعه بالامتار؟

2xy

$$\frac{2 \text{ مساحة المثلث}}{\text{القاعدة}} = \text{ارتفاع المثلث}$$

$$= \frac{2x^2 - 2xy + 2y^2}{2xy}$$

$$= \frac{2x^2}{2xy} - \frac{2xy}{2xy} + \frac{2y^2}{2xy} = \frac{x}{y} - 1 + \frac{y}{x}$$

تأكد من فهمك

جد ناتج القسمة لكل مما يأتي إذ إن المقام لا يساوي صفراً :

$$1 \quad \frac{15m^7n^6}{24m^6n^3}$$

$$2 \quad \frac{-24x^3y^3}{36x^2y^4}$$

$$3 \quad \frac{8z^5}{-12z^2}$$

الأسئلة (1-6)
مشابهة الى المثال (2)

$$4 \quad \frac{56h^{12}k^{10}}{-21h^8k^5}$$

$$5 \quad \frac{-18r^2v^6}{-15r^2v^2}$$

$$6 \quad \frac{72x^5y^6}{24x^3y^4}$$

الأسئلة (7-12)
مشابهة الى المثال (3)

$$7 \quad \frac{-84x^6y^5 + 12x^5y^5}{4x^5y^5}$$

$$8 \quad \frac{36m^7 - 25m^6 + 18m^5}{6m^7}$$

$$9 \quad \frac{\sqrt{5} h^6 - \sqrt{2} gh^2}{10h^3}$$

$$10 \quad \frac{\sqrt{18}z^4w^6y^5 - 15z^5w^4y^6}{3x^5y^5}$$

$$11 \quad \frac{-2m^5n^6 + m^7n^4}{4m^4n^5}$$

$$12 \quad \frac{\sqrt[3]{-8} v^7 - 20v^4}{4v^3}$$

تدرب وحل التمرينات

جد ناتج القسمة لكل مما يأتي إذ إن المقام لا يساوي صفراً :

$$13 \quad \frac{12b^5}{4b^2}$$

$$14 \quad \frac{-32m^5n^2}{-8m^3n^4}$$

$$15 \quad \frac{81x^7y^8z^6}{27x^7y^7z^3}$$

$$16 \quad \frac{36m^5n^5}{3m^6n^3}$$

$$17 \quad \frac{49r^2v^2}{7rv}$$

$$18 \quad \frac{\sqrt{36} h^3k^5}{6hk}$$

$$19 \quad \frac{-r^4v^3 - 4r^6v^5}{3r^3v^5}$$

$$20 \quad \frac{6w^5z^2 + 9w^2z^2}{3w^5z^3}$$

$$21 \quad \frac{13a^9b^6c^5 - 52a^7b^4c^6}{13a^5b^3c^2}$$

$$22 \quad \frac{8x^5}{12x^4}$$

$$23 \quad \frac{\sqrt{36}m^6 + \sqrt[3]{27} m^3 + 8m^2}{4m^{-2}}$$

$$24 \quad \frac{72n^7 - 63n^6 - 54n^5}{9n^5}$$

$$25 \quad \frac{48z^4 + 16z^3 + 8z^2}{4z^2}$$

$$26 \quad \frac{12m^5n^4 + 9m^4n^2 + 12m^2n^2}{3m^2n^2}$$

تدرب وحل مسائل حياتية



27 **هندسة:** علب معدنية على شكل اسطوانة اذا كان لديك القانون

$$\text{قانون } h = \frac{m - 2\pi r^2}{2\pi r} \text{ إذ } m \text{ المساحة الكلية للعبة المعدنية، } r \text{ نصف}$$

قطر قاعدتها، h ارتفاعها، فاذا كان $m = 280\text{cm}^2$ ، $r = 5\text{cm}$ جد قيمة h .

28 **هندسة:** اذا كان $Z = \frac{n^2 - m^2}{n}$ جد قيمة المقدار Z اذا علمت ان

$$n=5 , m=4$$

29 اثبت أن المقدار الجبري لا يحتوي على متغير

$$\frac{25r^2v^4 - 15r^3v^2 - 5r^2v^2}{5r^2v^2} - \frac{25v^2 - 15r + 5}{5}$$

30 **ألعاب نارية:** انطلق سهم ناري عمودياً نحو الاعلى وفقاً للقانون

$$v = \frac{h + 5t^2}{t} \text{ إذ } v \text{ يمثل سرعة السهم عند الانطلاق (m/sec) ويرمز}$$

h الى الارتفاع الذي بلغه السهم (m) ويرمز t الى الزمن (sec) جد سرعة انطلاق السهم اذا علمت أنه بلغ ارتفاع 275m خلال 5 ثواني.

فكر

31 **تحذّر:** ضع المقدار الجبري في أبسط صورة:

$$\frac{-8z^4 - 10z^3 + z^2}{2z^2} + \frac{4z^3 + 5z^2 + 6z}{z}$$

32 **أصحح الخطأ:** قسم احمد المقدار الجبري $\frac{20x^3y^2 + 12x^2y^2 + 28xy}{4xy}$ فكان الناتج القسمة

هو $5x^2y + 3x^2y^2 - 7x$ ، بين خطأ أحمد وصححه.

اكتب

مثالاً واحداً على قسمة مقدار جبري من ثلاثة حدود على حد جبري وجد الناتج.

Factoring an Algebraic Expressions

تَعَلَّم



يقع الهرم الأكبر (هرم خوفو) في مصر إذ أن الهرم رباعي منتظم المساحة الكلية له $m=x^2+2xy$ إذ أن x تمثل طول قاعدة الهرم y يمثل الارتفاع أحد الأوجه، كيف اجد العامل المشترك الأكبر للمقدار الذي يمثل المساحة الكلية للهرم؟

فكرة الدرس

- تحليل المقدار باستعمال العامل المشترك.
 - تحليل المقدار باستعمال الفرق بين مربعين .
 - تحليل المقدار باستعمال الفرق بين مقاديرين مربعين.
- المفردات**
- العامل المشترك.
 - الفرق بين مربعين.
 - الفرق بين مقاديرين مربعين.

[3-5-1] تحليل مقدار جبري باستخدام العامل المشترك (ع . م . أ)

Factoring an Algebraic Expression by using a Common Factor

تعلمت سابقا ضرب حد جبري في مقدار جبري وضرب مقدار جبري في مقدار جبري وفي هذا الدرس سوف تتعلم التحليل بأستخراج العامل المشترك الأكبر ويرمز له (ع . م . أ) وهو عكس عملية الضرب والعامل المشترك الأكبر يتضمن العامل العددي والمتغيرات المشتركة بأصغر أس.

مثال (1) جد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) الذي يمثل المساحة:

$$\frac{x^2 + 2xy}{x} + \frac{2xy}{x}$$

$$x^2 + 2xy = x(x+2y)$$

$$x(x+2y) = x^2 + 2xy$$

اجد العامل المشترك الأكبر للمقدار وهو x

نقسم كل حد جبري على العامل المشترك

فيكون التحليل

التحقق من صحة الحل هو ضرب الناتج مع العامل المشترك الأكبر

مثال (2) حلل المقدار الجبري باستخدام العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) وتحقق من صحة الحل:

$$i(25c^2d^2 + 45d - 5cd^3)$$

$$= 5d \left(\frac{25c^2d^2}{5d} + \frac{45d}{5d} - \frac{5cd^3}{5d} \right)$$

$$= 5d (5c^2d + 9 - cd^2)$$

$$5d(5c^2d + 9 - cd^2)$$

$$= 25c^2d^2 + 45d - 5cd^3$$

التحقق

$$ii(28h^2k - 8k + 12)$$

$$= 4 \left(\frac{28h^2k}{4} - \frac{8k}{4} + \frac{12}{4} \right)$$

$$= 4 (7h^2k - 2k + 3)$$

$$4(7h^2k - 2k + 3) = 28h^2k - 8k + 12$$

التحقق

$$iii \left(\frac{1}{4}z^2w^2 + \frac{5}{16}zw + \frac{3}{8}zw^3 \right)$$

$$= \frac{1}{4}zw \left(\frac{\frac{1}{4}z^2w^2}{\frac{1}{4}zw} + \frac{\frac{5}{16}zw}{\frac{1}{4}zw} + \frac{\frac{3}{8}zw^3}{\frac{1}{4}zw} \right)$$

$$= \frac{1}{4}zw \left(zw + \frac{5}{4} + \frac{3}{2}w^2 \right)$$

$$\frac{1}{4}zw(zw + \frac{5}{4} + \frac{3}{2}w^2)$$

$$= \frac{1}{4}z^2w^2 + \frac{5}{16}zw + \frac{3}{8}zw^3$$

التحقق

2-3-5] تحليل مقدار جبري باستخدام الفرق بين مربعين

Factoring an Algebraic Expressions Using Difference of Two Squares

تعلمت سابقا تحليل المقدار الجبري باستخدام العامل المشترك الاكبر وسوف تتعلم في هذا البند التحليل

باستعمال الفرق بين المربعين أو الطريقتين معا حيث

$$i) (a^2 - b^2) = (a+b)(a-b)$$

$$ii) (ka^2 - kb^2) = k(a^2 - b^2) = k(a+b)(a-b)$$

مثال 3) حل كل مقدار باستخدام الفرق بين مربعين

$$i) (x^2 - y^2)$$

$$= (x+y)(x-y)$$

$$ii) (z^2 - 36)$$

$$= (z-6)(z+6)$$

$$iii) (4h^2 - 81w^2)$$

$$= (2h-9w)(2h+9w)$$

$$iv) (y^2 - 7)$$

$$= (y - \sqrt{7})(y + \sqrt{7})$$

$$v) (225m^2n^2 - 625a^2b^2)$$

$$= (15mn + 25ab)(15mn - 25ab)$$

$$vi) (25h^4 - 5a^2)$$

$$= (5\sqrt{5}h^2 - a)(5\sqrt{5}h^2 + a)$$

$$vii) (144z^2w^2 - 2)$$

$$= (2\sqrt{72}zw - 1)(2\sqrt{72}zw + 1)$$

3-3-5] تحليل مقدار جبري باستخدام فرق بين مقدارين مربعين

Factoring an Algebraic Expressions Using Difference of Two Squares Expressions

سبق ان تعلمت التحليل باستخدام الفرق بين مربعين وتحليل المقادير الاكثر تعقيدا يمكن استعمال تحليل

الفرق بين مقدارين مربعين لتسهيل بعض العمليات.

$$i) (x+y)(x+z)$$

$$= (x+y)(x+z) - (x+y)(x+z)$$

$$= (x+y)(x+z) - (x+y)(x-z)$$

$$= (2x+y+z)(y-z)$$

استعمال قاعدة الفرق بين المربعين

رفع الاقواس

بسط المقدار

$$ii) (2m+3)(3m-4)$$

$$= (2m+3)(3m-4) - (2m+3)(3m-4)$$

$$= (2m+3)(3m-4) - (2m+3)(-3m+4)$$

$$= (5m-1)(-m+7)$$

استعمال قاعدة الفرق بين المربعين

رفع الاقواس

بسط المقدار

$$iii) (3w+5)(w+4)$$

$$= (3w+5)(w+4) - (3w+5)(w+4)$$

$$= (3w+5)(w+4) - (3w+5)(w-4)$$

$$= (4w+9)(2w+1)$$

استعمال قاعدة الفرق بين المربعين

رفع الاقواس

بسط المقدار

تأكّد من فهمك

حلّل المقدار باستعمال العامل المشترك الأكبر) ع . م . أ.:

1 $12x+9$

2 $36y-18$

3 $15m+21$

الأسئلة (1-6)

4 $28z^2 - 7z + 7$

5 $16n^2m + 12m - 4$

6 $\sqrt{3}h^2 - 3h$

مشابه للمثال)2)

حلّل المقدار باستعمال الفرق بين مربعين:

7 $h^2 - 16$

8 $4y^2 - 9$

9 $169x^2 - 11$

10 $81a^2 - b^2$

الأسئلة (7-14)

مشابه للمثال)3)

11 $49 - y^2$

12 $25h^2 - 9k^2$

13 $36 - 25r^2$

14 $14z^2 - 2$

حلّل المقدار باستعمال الفرق بين مربعين:

15 $(3m+1)^2 - (n+6)^2$

16 $(2x+y)^2 - (4x+3y)^2$

الأسئلة (15-18)

مشابهة للمثال)4)

17 $(x-2)^2 - (x+5)^2$

18 $(3-z)^2 - (6-z)^2$

تدرب وحلّ التمرينات

حلّل المقدار باستعمال العامل المشترك الأكبر) ع . م . أ. (ومن ثمّ تحقق من صحّة الحل:

19 $2x^5 - 6x^2 + 10x^3$

20 $-24y^6 + 8y^5 - 4y^4$

21 $64h^2k^2 - 16hk$

22 $15m^4n^4 + 6mn^3 + 3m^2n^2$

23 $72x^3 + 18x^2 + 9$

24 $36m^2n^2 + 4mn + 8$

حلّل المقدار باستعمال الفرق بين مربعين:

25 $4x^2 - 16$

26 $81 - 25n^2$

27 $36h^4 - 4$

28 $169a^2 - 3$

29 $625b^2 - 2$

30 $k^2 - 5$

حلّل المقدار باستعمال العامل المشترك الأكبر) ع . م . أ. (ومن ثمّ الفرق بين المربعين

31 $5y^2 - 20$

32 $12x^2 - 27$

33 $14w^2 - 2$

34 $18k^2 - 32$

حلّل المقدار باستعمال الفرق بين مربعين


35 $(3x+5)^2 - (x+4)^2$

36 $(5y-3)^2 - (32-y)^2$

37 $(4m+n)^2 - (5m+2n)^2$


38 $(6z+1)^2 - (w+5)^2$

تدرب وحل مسائل حياتية



39 إذا كانت المساحة الكلية للشكل المجاور تعطى بالقانون $x = r^2 + \frac{1}{8}\pi r^2$

حلل المقدار x باستعمال العامل المشترك الأكبر) ع.م.أ. (وجد قيمة x عندما $r=4$.



40 إذا كان لدينا مربع طول ضلعه $4x$ ومثلث قائم الزاوية طول الضلعين القائمين

$x+4$ ، $4x$ جد مساحة المربع والمثلث معاً ثم حلل المقدار.



41 علبة على شكل اسطوانة المساحة الكلية لها $2\pi r^2 + 2\pi r h$ بنسب المقدار

باستعمال العامل المشترك الأكبر) ع.م.أ. (ثم جد المساحة عندما $r=3$ ، $h=7$.

فكر

42 تحد: إذا كان المقدار $z = 5x^4 - 10x^3 - 6$ ، $y = 5x^3 - 15x^2 + 6$ جد ناتج جمع المقدارين ثم

حلل الناتج باستعمال العامل المشترك الأكبر وهل يمكن تحليل كل من مقدار Z ، y .

43 مربع طول ضلعه y cm ومستطيل يزيد طوله 3 cm على طول ضلع المربع وينقص عرضه

3 cm عن طول ضلع المربع ما مساحة المستطيل؟ وهل المساحة تمثل الفرق بين مربعين؟

44 أين الخطأ: حلل حسام وقاسم المقدار $36m^4 - 100n^2$ باستعمال الفرق بين مربعين وكتبا الناتج

كما يأتي:

حل قاسم

$$36m^4 - 100n^2$$

$$(6m^2 + 10n)(6m^2 - 10n)$$

حل حسام

$$36m^4 - 100n^2$$

$$(6m^2 - 10n)(6m^2 - 10n)$$

بين أيهما كتب الناتج صحيح.

اكتب

طريقتين مختلفتين لتحليل المقدار الجبري الآتي:

$$(4x^2 - 4y^2)$$

جدّ ناتج جمع او طرح المقادير الجبريّة الآتية :

1) $\sqrt[3]{8} x^2y^2 + 4xy - 2(+)\sqrt[3]{27} x^2y^2 - 6xy + 3$ (2) $\sqrt{9} r^3v^2 + 12gh - 6(+)\sqrt{100} r^3v^2 - 2gh + 1$

3) $\frac{1}{4}m^4n^4 + 7hk + 8(+)\frac{1}{16}m^4n^4 + 9hk - 12$ (4) $\sqrt{5} h^2k^3 - 20x + 2(+)\sqrt{5} h^2k^3 + 5x - 3$

5) $\sqrt[3]{125} a^2b^2 + 4b + 3(-)15a^2b^2 + 3b - 6$ (6) $\frac{3}{12}r^6v^3 - 24h - 6(-)\frac{3}{12}r^6v^3 - 8h + 1$

جدّ ناتج الضرب للحدود الجبريّة الآتية :

7) $6x^2y()12xy$ (8) $\frac{1}{4}gh()32gh$ (9) $\sqrt{25} a^4b^2()5a^2b^2$ (10) $\sqrt[3]{1000} (h^4k^3)10(hk$

11) $\sqrt{7} rv)(\sqrt{7} r^2v^2 + rv + 2$ (12) $\frac{1}{9}wz)(81w^3z^3 + zw + 3$ (13) $-10z^2w^2)(\sqrt{100} zw + 10$

جدّ ناتج ضرب المقدارين الجبريّين لكل مما يأتي:

14) $2x+y)(x+y$ (15) $zw+4)(zw+5$ (16) $\frac{3}{5}gh-3)(\frac{1}{5}gh-5$

17) $3x+4)(x^2+3x+1$ (18) $9r-1)(2r^4-3r+1$ (19) $4m^2n^2-n)(4m^2n^2-n+2$

جدّ ناتج ضرب المقدارين الجبريّين باستعمال الطريقة العمودية لكل مما يأتي:

20) $\frac{4}{16}a^2b^2 + \frac{25}{5}(a^2b^2 - \frac{1}{2}$ (21) $5y^2-y)(-3y^2+y+2$ (22) $8z^2w^2+4)(2zw+2$

جدّ ناتج القسمة للمقادير الجبريّة الآتية:

23) $\frac{-35x^4}{5x^{-2}}$ (24) $\frac{12y^3}{36y^2}$ (25) $\frac{\sqrt{100} r^6}{\sqrt{25} r^{-8}}$ (26) $\frac{30v^4}{6v^{-8}}$ (27) $\frac{-35h^2}{5h^{-7}}$

28) $\frac{56m^2n^4-7m^2n^2+42}{7mn}$ (29) $\frac{-25zw^2+10zw-5}{5zw}$ (30) $\frac{81-27ab-3a}{9b}$

حلّ المقادير الجبريّة باستعمال العامل المشترك الأكبر :

31) $14y^2+2y-24$ (32) $4z^4w^2-16z^2w^2+48zw$ (33) $100c^3d^3+50c^2d^2+25cd$

حلّ المقادير الجبريّة باستعمال الفرق بين مربعين :

34) $4z^2-16$ (35) $144x^4-64$ (36) $25r^2-3$ (37) $81g^2h^2-36$

حلّ المقادير باستعمال العامل المشترك الأكبر ثم الفرق بين مربعين:

38) $18v^2-32$ (39) $50z^2-2$ (40) $400x-4xy^2$ (41) $81w-169w^3$

المعادلات والمتباينات Inequalities and Equations

- [4-1] **الدرس** حلُّ معادلاتٍ من الدرجة الأولى بمتغيرٍ واحدٍ بخطوتين في R .
- [4-2] **الدرس** حلُّ معادلاتٍ من الدرجة الأولى بمتغيرٍ واحدٍ بعدة خطوات في R .
- [4-3] **الدرس** حلُّ معادلاتٍ من الدرجة الثانية بمتغيرٍ واحدٍ في R .
- [4-4] **الدرس** حلُّ المتباينات الجبرية ذات خطوتين في R .
- [4-5] **الدرس** حلُّ المتباينات الجبرية متعددة الخطوات في R .

في حديقة الحيوان بحيرتين لتربية التماسيح، عدد التماسيح في البحيرة الأولى ضعف عدد التماسيح في البحيرة الثانية ومجموع التماسيح في البحيرتين 60 تمساحاً، باستعمال المعادلة $2x + x = 60$ يمكن حساب عدد التماسيح في كل بحيرة، إذ يمثل المتغير x عدد التماسيح في البحيرة الثانية.

جد قيمة العبارة الجبرية في كل مما يأتي باستعمال قيمة المتغير المعطاة :

1 $7x - 3^2 + 7$, $x = 4$

2 $3)y - 2(-10$, $y = -5$

3 $2^3)n - 6(-15$, $n = -16$

4 $36 \div d(-4^2)1 - d$, $d = 6$

5 $|-8| + y^3 - 24$, $y = 3$

6 $3v \div 5 - |-12| \div 2$, $v = -5$

حل معادلات الجمع و الطرح باستعمال الحساب الذهني :

7 $x + 21 = 21$

8 $y - 9 = 11$

9 $80 - z = 20$

10 $|-10| + x = 33$

11 $m - \sqrt{16} = 0$

12 $\sqrt{49} - n = 0$

حل معادلات الجمع و الطرح باستعمال العلاقة بين الجمع والطرح :

13 $w + 132 = 61$

14 $m - 22 = -32$

15 $y + 14 = |-10|$

16 $63 - x = |-43|$

17 $\sqrt{64} - h = 8$

18 $d + \sqrt[3]{27} = 8$

حل معادلات الضرب والقسمة باستعمال العلاقة بين الضرب والقسمة :

19 $3k = 15$

20 $S \div 8 = -9$

21 $\sqrt{4}n = -24$

22 $|-7| m = 63$

23 $-88 \div y = |-11|$

24 $x \div \sqrt[3]{8} = 20$

حل المعادلات التالية في Q :

25 $7y - 4 = 51$

26 $\sqrt{16} - 2x = 21$

27 $3x \div 9 = 5 + \frac{1}{2}$

28 $\sqrt[3]{27} \div m = 5^2 - 1$

29 $|-18| h = 72 \div (-9)$

30 $z \div |-11| = 3^3 \div 22$

اكتب مثالا واحدا لكل خاصية من الخواص الآتية :

31 لكل $a, b, c \in Q$ إذا كان $a \leq b$ فإن $a + c \leq b + c$

32 لكل $a, b, c \in Q$ إذا كان $a > b$ وأن $c > 0$ فإن $ac < bc$

33 لكل $a, b, c \in Q$ إذا كان $a \geq b$ وأن $c < 0$ فإن $\frac{a}{c} \geq \frac{b}{c}$

استعمل خصائص المتباينات لحل كل متباينة من المتباينات الآتية :

34 $y - 10 > 12$

35 $x + 5^2 \geq 18$

36 $-9 + m \leq 0$

37 $\sqrt[3]{8} + h \leq 26$

38 $\frac{x}{11} < \frac{1}{3}$

39 $-7y \leq 19$

40 $\frac{y}{7} > -10$

41 $4x + 10 > -48$

42 $-3(n - 7) \geq 21$



تَعَلَّم

لدى أحمد 5 أقفاص من طيور الكناري ولدى فراس 4 أقفاص من الطيور. اخرج أحمد 8 طيور من أقفاصه و اضافها الى طيور فراس ليصبح لدى كل منهما عدد الطيور نفسه، إذا وزعت الطيور بشكلٍ متساوٍ على الأقفاص، فجد عدد الطيور في كل قفص.

فكرة الدرس

• حل معادلة من الدرجة الأولى بمتغير واحد بخطوتين .

المفردات

• معادلة بمتغير واحد .
• معادلة من الدرجة الأولى .
• حل المعادلة .
• التحقق .

[4-1-1] حل المعادلات باستعمال الجمع والطرح

Solving the Equations by using Addition and Subtraction

المعادلة من الدرجة الأولى بمتغير واحد هي المعادلة التي فيها متغير واحد ومن القوة واحد . حل المعادلة يعني إيجاد قيمة المتغير فيها، ولحل المعادلة ضع المتغير في طرف والأعداد في الطرف الآخر.

جد عدد الطيور في كل قفص .

(مثال 1)

افرض عدد الطيور في كل قفص هو x

لذا المعادلة التي تمثل المسألة هي

الطريقة الأولى: الطريقة الرأسية

أكتب المعادلة

اضف الى كل طرف -4x

اضف + 8 الى كل طرف

لذا عدد الطيور في كل قفص هو 16 طيراً

$$5x - 8 = 4x + 8$$

$$5x - 8 = 4x + 8$$

$$\frac{-4x \quad -4x}{x - 8 = +8}$$

$$x - 8 = +8$$

$$\frac{+8 \quad +8}{x = 16}$$

$$5x - 8 = 4x + 8$$

$$5x - 8 - 4x = 4x - 4x + 8$$

$$x - 8 = 8$$

$$x - 8 + 8 = 8 + 8$$

$$x = 16$$

الطريقة الثانية: الطريقة الأفقية

أكتب المعادلة

اضف الى كل طرف -4x

اضف + 8 الى كل طرف

لذا عدد الطيور في كل قفص هو 16 طيراً

؟

$$5x - 8 = 4x + 8$$

$$5(16) - 8 = 4(16) + 8$$

$$72 = 72 \quad \checkmark$$

(التحقق: عوض عن قيمة المتغير) x=16 التي حصلت عليها من الحل بالمعادلة :

مثال 2)

حل المعادلات التالية باستعمال الجمع والطرح :

$$i) (3y - 12 = 2y - |-30| \Rightarrow 3y - 2y - 12 = 2y - 2y - |-30| \Rightarrow y - 12 = -30$$

$$\Rightarrow y - 12 + 12 = -30 + 12 \Rightarrow y = -18$$

$$ii) (20 + 2h = 3h - 3^2 \Rightarrow 20 + 2h - 2h = 3h - 9 - 2h \Rightarrow 20 = h - 9$$

$$\Rightarrow 20 + 9 = h - 9 + 9 \Rightarrow h = 29$$

$$iii) (2x + 2\sqrt{3} = x - 3\sqrt{3} \Rightarrow 2x + 2\sqrt{3} - x = x - 3\sqrt{3} - x \Rightarrow x + 2\sqrt{3} = -3\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow x + 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = -3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} \Rightarrow x = -5\sqrt{3}$$

$$iv) (|-3|m = 10 - \sqrt[3]{-8} m \Rightarrow 3m = 10 + 2m \Rightarrow 3m - 2m = 10 + 2m - 2m \Rightarrow m = 10$$

[4-1-2] حلُّ المعادلات باستعمال الضرب والقسمة

Solving the Equations by using Multiplication and Division

استعمل العلاقة بين الضرب والقسمة لإيجاد قيمة المتغير في معادلات الدرجة الأولى بمتغير واحد

مثال 3)

اقلام تلوين: اشترت سري 5 اقلام تلوين. فاحتفظت لنفسها

اقلام من كلِّ علبة ووزعت الباقي على اخواتها الأربع بالتساوي فكل

حصة كلِّ واحدة من اخواتها 15 قلماً. ما عدد الأقالِم في كلِّ علبة



افرض عدد الأقالِم في كلِّ علبة هو n

لذا المعادلة التي تمثل المسألة هي

$$5)n - 3(\div 4 = 15$$

$$5)n - 3($$

$$\frac{5)n - 3(}{4} = 15$$

$$\frac{5)n - 3(}{4})4(= 15)4($$

أضرب كل طرف في 4

$$5)n - 3(= 60$$

$$5n - 15 = 60$$

$$5n - 15 + 15 = 60 + 15$$

$$5n = 75$$

$$n = 15$$

أضرب 5 في داخل القوس

أضف 15 الى كل طرف

أقسم كل طرف على 5

لذا عدد الأقالِم في كلِّ علبة هو 15 قلماً

التحقق: عوض عن قيمة المتغير (n=15) التي حصلت عليها من الحل بالمعادلة :

$$5)n - 3(\div 4 = 15$$

$$5)15 - 3(\div 4 = 15$$

$$15 = 15 \checkmark$$

مثال 4)

حلُّ المعادلات التالية باستعمال الضرب والقسمة :

$$i) (x \div 12 = 4 \Rightarrow x = 4)12(\Rightarrow x = 48$$

$$ii) (\sqrt{36} y \div 2 = |-5| \Rightarrow 6y \div 2 = 5 \Rightarrow 6y = 10 \Rightarrow \frac{6y}{6} = \frac{10}{6} \Rightarrow y = \frac{10}{6} \Rightarrow y = \frac{5}{3}$$

حل المعادلات الآتية : (مثال 5)

$$i) (5y + 7 = 3y - 2^3 \Rightarrow 5y - 3y = -8 - 7 \Rightarrow 2y = -15 \Rightarrow y = \frac{-15}{2}$$

$$ii) (\sqrt{16}x - 3\sqrt{7} = \sqrt{9}x \Rightarrow 4x - 3\sqrt{7} = 3x \Rightarrow 4x - 3\sqrt{7} - 3x = 3x - 3x \\ \Rightarrow x - 3\sqrt{7} = 0 \Rightarrow x - 3\sqrt{7} + 3\sqrt{7} = 0 + 3\sqrt{7} \Rightarrow x = 3\sqrt{7}$$

$$iii) (3)6t + 5(=3)3t + 12(\Rightarrow 18t + 15 = 9t + 36 \Rightarrow 18t - 9t = 36 - 15 \\ \Rightarrow 9t = 21 \Rightarrow t = \frac{21}{9} \Rightarrow t = \frac{7}{3}$$

$$iv) (\frac{2x}{5} = \frac{7}{20} \Rightarrow \frac{2x)5(= \frac{)5(7}{20} \Rightarrow 2x = \frac{7}{4} \Rightarrow \frac{2x}{2} = \frac{7}{4)2(\Rightarrow x = \frac{7}{8}$$

تأكّد من فهمك

حل المعادلات التالية باستعمال الجمع والطرح وتحقق من صحة الحلّ :

1 $4x - 10 = 3x + 20$

2 $25 + m = 2m - 16$

3 $2y + 2^4 = y - 3$

4 $\sqrt{49} - d = 21 - 2d$

5 $|-13|x = \sqrt[3]{-27} + 12x$

6 $7y - 6^2 = 6y - 36$

7 $3h + 4\sqrt{5} = 2h + 7\sqrt{5}$

8 $\sqrt{9}x = |-17| + 2x$

(الأسئلة 1-8)

مشابهة للمثالين 1,2)

حل المعادلات التالية باستعمال الضرب و القسمة وتحقق من صحة الحلّ :

9 $2x \div 16 = \frac{1}{3}$

10 $\sqrt[3]{8}y \div |-6| = 3^2$

11 $3m - 9 = 5 - 2m$

12 $\sqrt{3}z \div 12 = \sqrt{3} \div 5$

13 $\frac{\sqrt{5}x}{2} = \frac{1}{3}$

14 $\frac{6y}{5\sqrt[3]{27}} = \frac{6}{5}$

15 $2)h + 5(= \sqrt{64}$

16 $|-14|n = 63 \div)-9($

(الأسئلة 9-16)

مشابهة للأمثلة 3,5)

تدرب وحل التمرينات

حل المعادلات التالية باستعمال الجمع والطرح وتحقق من صحة الحلّ :

17 $5y - 20 = 4y + 2$

18 $6x + 3^2 = 5x - 5$

19 $f = \sqrt[3]{-64} + 2f$

20 $3z - 2\sqrt{3} = 2z + 7\sqrt{3}$

حل المعادلات التالية باستعمال الضرب و القسمة وتحقق من صحة الحلّ :

21 $4y \div 24 = \frac{1}{5}$

22 $\sqrt[3]{27}z \div |-7| = 3^3$

23 $\sqrt{2}x \div 9 = \sqrt{2} \div 5$

24 $\frac{\sqrt{3}y}{2} = \frac{1}{3}$

25 $5)k + 6(= \sqrt[3]{-125}$

26 $|-8|n = 72 \div)-12($

تدرب وحل مسائل حياتية



27 **شراء:** اشترى أنور سيارة بقيمة 28 مليون دينار. دفع 6

ملايين دفعة أولى، وقسّط الباقي على 11 شهراً. أكتب معادلة

تمثل المسألة وحلّها لكي تجد قيمة القسط الشهري.



28 **غوص:** نزلت غواصة إبحار من سطح البحر فقطعت $\frac{6}{10}$

من عمق البحر وتوقفت. على أي عمق يقع قاع البحر إذا كانت

الغواصة قد توقفت على عمق 180 m من سطح البحر؟



29 **حديقة الحيوان:** حلّ المعادلة $3n + 15 = 2n + 32$ لإيجاد

قيمة n التي تمثّل عدد القروود في حديقة الحيوان .



30 **حدائق:** زرعت منطقة مستطيلة الشكل بالورد، طولها ثلاثة

أمثال عرضها. ما أبعاد المنطقة المزروعة بالورد إذا كان محيطها

52 m ؟

فكّر

خذ: حل المعادلات الآتية :

31 $\sqrt{2} x - 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2} - \sqrt{2} x$

32 $|-11| f = \sqrt[3]{-64} + 12f$

33 **أصحّ الخطأ :** حلت إيمان المعادلة الآتية : $\frac{v}{5^2} = \frac{\sqrt{5}}{5^3}$ ، وكتبت $v = \frac{1}{5}$

حدد خطأ إيمان وصححه .

34 **حسّ عدديّ:** عمر سمير ضعف عمر سعد ، بعد مرور 6 سنوات يصبح عمر سمير 22 سنة .

ما عمر سعد قبل 6 سنوات ؟

أكتب

$6n - 50 = 20$

مسألة حياتية تمثل المعادلة التالية وجد حلّها :



تَعَلَّم

على الساحل 600 فقمة، زادت $\frac{1}{6}$ عددها نتيجة الولادة، وبعد تعرضها الى هجوم من قبل الحيتان الزرق، قل عددها الى 550 فقمة. ماعدد الفقمة المفقودة؟

فكرة الدرس

- حل معادلة من الدرجة الأولى بمتغير واحد بعدة خطوات.
- خاصية التوزيع.
- خاصية التجميع.

[4-2-1] حلُّ المعادلات التي تتضمن متغيراً في أحد طرفيها أو كليهما
Solving the Equations Which has variable in one side or both sides

لحلُّ المعادلة التي تحتوي على متغير واحد، اعزل الحد الذي يحتوي على المتغير في أحد طرفيها ثم اجعل معامل واحد باستعمال خواص الاعداد الحقيقية (التوزيع، التجميع،).

(مثال 1)

لايجاد عدد الفقمة المفقودة، افرض أن عدد الفقمة المفقودة هو n

$$600 + \frac{1}{6} \times 600 - n = 550$$

$$600 + 100 - n = 550$$

$$700 - n = 550$$

$$-n = 550 - 700$$

$$-n = -150$$

$$n = 150$$

لذا عدد الفقمة المفقودة هو 150 فقمة.

التحقق: عوض عن قيمة المتغير $n=150$ (التي حصلت عليها من الحل بالطرف الأيسر) LS (من المعادلة :

$$600 + \frac{1}{6} \times 600 - n = 550$$

$$LS = 600 + \frac{1}{6} \times 600 - n = 600 + 100 - 150 = 550 = RS \quad (\text{الطرف الأيمن})$$

(مثال 2) حل المعادلات التالية باستعمال خصائص الاعداد الحقيقية :

$$i) (2)z - 8(+16 = |-36| \Rightarrow 2z - 16 + 16 = 36 \Rightarrow 2z = 36 \Rightarrow z = 36 \div 2 \Rightarrow z = 18$$

$$ii) (4)x - 5\sqrt{3} = 3x - 2\sqrt{3} \Rightarrow 4x - 20\sqrt{3} = 3x - 2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow 4x - 3x = 20\sqrt{3} - 2\sqrt{3} \Rightarrow x = 18\sqrt{3}$$


$$iii) (\frac{1}{5})3y + 10(-7 = \frac{2}{5})y - 15(\Rightarrow \frac{3}{5}y + 2 - 7 = \frac{2}{5}y - 6$$

$$\Rightarrow \frac{3}{5}y - \frac{2}{5}y = 5 - 6 \Rightarrow \frac{1}{5}y = -1 \Rightarrow y = -5$$

[4-2-2] حلُّ المعادلات التي تتضمن القيمة المطلقة

Solving the Equations containing Absolute Value

إنَّ حلَّ المعادلة التي تحتوي على القيمة المطلقة للمتغير مثل $|x| = 3$ يعني إيجاد المسافة بين x و



لذا فإن حل المعادلة $|x| = 3$ هو إما $x = 3$ أو $x = -3$ ومجموعة الحل هي $\{3, -3\}$

(مثال 3) **حديقة الحيوان:** المعادلة $|x-27| = 2$ تمثل درجة حرارة المكان المخصص للأفاعي.

جدُّ درجة الحرارة العظمى والصغرى لمكان الأفاعي في حديقة الحيوان.



$$x - 27 = 2$$

الحالة الأولى:

$$x = 2 + 27 \Rightarrow x = 29$$


لذا درجة الحرارة العظمى هي 29 درجة سليزية

$$x - 27 = -2$$


الحالة الثانية:

$$x = 27 - 2 \Rightarrow x = 25$$

لذا درجة الحرارة الصغرى هي 25 درجة سليزية ويمكن تمثيل الحل بيانياً على مستقيم الأعداد:




(مثال 4) أكتب معادلة القيمة المطلقة التي تمثلها البياني على مستقيم الأعداد هو:



جدُّ نقطة تبعد المسافة نفسها بين العدد 11 والعدد 3، وهذه النقطة هي منتصف المسافة بين العددين

أي العدد 7

لذا المعادلة المطلوبة هي $|x-7| = 4$



(مثال 5) حل المعادلات الآتية:

$$i) (|y + 9| = 5 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} y+9 = 5 \Rightarrow y = -4 \\ y+9 = -5 \Rightarrow y = -14 \end{array} \right. \text{ أو } \left. \right\} \Rightarrow \{-4, -14\} \text{ مجموعة الحل للمعادلة}$$

$$ii) (|2n - 7| = 6 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2n-7 = -6 \Rightarrow 2n=1 \Rightarrow n = \frac{1}{2} \\ 2n-7 = 6 \Rightarrow 2n=13 \Rightarrow n = \frac{13}{2} \end{array} \right. \text{ أو } \left. \right\} \Rightarrow \left\{ \frac{1}{2}, \frac{13}{2} \right\} \text{ مجموعة الحل}$$

$$iii) (|x - 5| = -3$$

يعني أنَّ المسافة بين x و 5 تساوي -3

وبما أنه لا يمكن أن تكون المسافة سالبة، لذا فإنَّ مجموعة الحل لهذه المعادلة هي المجموعة

الخالية \emptyset .

تأكّد من فهمك

حل المعادلات التالية باستعمال خصائص الأعداد الحقيقية :

1 $8y - 12 = 4y + 12$

2 $|-15| + z = 3z + 15$

الأسئلة (1 - 6)

3 $3)y + 5^2(= y + 70$

4 $3\sqrt{2} - x = x - 5\sqrt{2}$

مشابه للمثال (2)

5 $\sqrt{5}) n + 3(= 4\sqrt{5}$

6 $\sqrt{25} y = 3) y - 15(+ 2$

حل المعادلات التالية باستعمال الخصائص وتحقق من صحة الحلّ :

7 $2)x + 20(= 5)x - 10($

8 $\sqrt[3]{64} y \div |-6| = 8 \sqrt{2}$

الأسئلة (7 - 10)

9 $\frac{1}{5}t - \sqrt{25} (+ 3= 2)4- t ($

10 $\frac{2v}{1+\sqrt[3]{27}} = \frac{3v}{8}$

مشابه الى المثالين (1,2)

حل المعادلات الآتية:

11 $|x - 22| = 8$

12 $|4y + 30| = \sqrt{49}$

الأسئلة (11 - 14)

13 $|\frac{1}{5} m + 9| = \sqrt[3]{-27}$

14 $|3z - 9| = 2^3$

مشابه الى المثالين (3,5)

حل المعادلات التالية باستعمال خصائص الأعداد الحقيقية :

15 $4x + 8 = 12 - 2x$

16 $7) t + 1^2(= \frac{1}{2} t - 2$

17 $\sqrt{7}) v + 8(= 2\sqrt{7}$

حل المعادلات التالية باستعمال الخصائص وتحقق من صحة الحلّ :

18 $4)y - 15(= 3)y + 15($



19 $\frac{1}{2}x - 5(+ \frac{5}{2} = \frac{1}{4})x - 4($

حلّ المعادلات الآتية:

20 $|y - 13| = 9$

21 $|\frac{1}{2}m + 9| = \sqrt[3]{-125}$

أكتب معادلة القيمة المطلقة التي تمثيلها البياني على مستقيم الأعداد هو:



تدرب وحل مسائل حياتية



24 **طقس:** معدل درجة الحرارة في شمال العراق في شهر شباط 2 درجة سلسيزية، تزيد أو تنقص بمقدار 3 درجة سلسيزية. أكتب معادلة تمثل درجة الحرارة الصغرى والعظمى لشهر شباط.



25 **مترو الأنفاق:** معدل سرعة قطار مترو الأنفاق 60 km/h وتقل سرعته عند المنعطفات بمقدار 20 km/h وتزداد عندما يكون الطريق مستقيماً بمقدار 20 km/h. أكتب معادلة لإيجاد أكبر سرعة وأصغر سرعة للقطار.



26 **شراء:** يريد وليد شراء جهاز حاسوب بثمن 650000 دينار، لديه في الوقت الحاضر 200000 دينار ويوفر كل اسبوع 50000 دينار. بعد كم أسبوع سيجمع وليد مبلغ جهاز الحاسوب؟

فكر

تحذ: حل المعادلات الآتية:


27
$$\frac{\sqrt{3}x}{4+\sqrt[3]{-27}} = \frac{2\sqrt{3}x}{5}$$

28
$$|4y - 9| = |26 - 5\sqrt{64}|$$

29 **أصح الخطأ:** حلت هبة المعادلة الآتية: $(\frac{1}{3})z - 6 = (\frac{1}{3})z - 3$


وكتبت $z = 6$. حدد خطأ هبة وصححه.

30 **جس عددي:** أكتب معادلة القيمة المطلقة التي تمثيلها البياني على مستقيم الأعداد هو:



مسألة حياتية تمثل معادلة القيمة المطلقة التي تمثيلها البياني هو:

أكتب





تعلّم

يقع برج بغداد في منطقة اليرموك غرب بغداد وبني سنة 1991 ويبلغ ارتفاعه 204m. ومساحة قاعدة البرج المربعة $36m^2$. جد طول ضلع قاعدة البرج .

فكرة الدرس

- حل معادلة من الدرجة الثانية بمتغير واحد في R.
- المفردات
- معادلة من الدرجة الثانية.
- خاصية الضرب الصفري.

[4-3-1] حل المعادلات باستعمال الجذر التربيعي

Solving the Equations by Using Square Root

المعادلة من الدرجة الثانية بمتغير واحد هي المعادلة التي فيها أكبر قوة للمتغير هي القوة الثانية .
مثلاً $x^2 = 25$ ، $14x^2 - 2x = 0$ ، وحلها يعني إيجاد قيمتين للمتغير x .

مثال 1) مساحة قاعدة البرج هو $36m^2$. جد طول ضلع القاعدة.

$$x^2 = 36$$

$$x = \sqrt{36} \text{ أو } x = -\sqrt{36}$$

$$x = 6 \text{ أو } x = -6$$

المعادلة التي تمثل مساحة القاعدة هي

يوجد جذران تربيعيان للعدد 36

6 و -6 هما جذرا العدد 36

لذا طول ضلع قاعدة البرج هو 6m .

والقيمة $x = -6$ تهمل لأن طول القاعدة لا يمكن ان يكون سالباً .

حل المعادلات التالية باستعمال الجذر التربيعي :

مثال 2)

$$i) (y^2 = 32 \Rightarrow y = \sqrt{32} \text{ أو } y = -\sqrt{32} \Rightarrow y = 4\sqrt{2} \text{ أو } y = -4\sqrt{2})$$

$$ii) (16z^2 = 4 \Rightarrow \frac{1}{16} \times 16z^2 = \frac{1}{16} \times 4 \Rightarrow z^2 = \frac{1}{4} \\ \Rightarrow z = \sqrt{\frac{1}{4}} \text{ أو } z = -\sqrt{\frac{1}{4}} \Rightarrow z = \frac{1}{2} \text{ أو } z = -\frac{1}{2})$$

$$iii) (8x^2 = 1 \Rightarrow \frac{1}{8} \times 8x^2 = \frac{1}{8} \times 1 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{8} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{1}{8}} \text{ أو } x = -\sqrt{\frac{1}{8}} \\ \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{8}} \text{ أو } x = -\frac{1}{\sqrt{8}} \Rightarrow x = \frac{1}{2\sqrt{2}} \text{ أو } x = -\frac{1}{2\sqrt{2}})$$

$$iv) (t^2 - 1 = 11 \Rightarrow t^2 = 12 \Rightarrow t = \sqrt{12} \text{ أو } t = -\sqrt{12} \Rightarrow t = 2\sqrt{3} \text{ أو } t = -2\sqrt{3})$$

Solving the Equations by Using Zero Product Property

خاصية الضرب الصفري: إذا كان نتيجة ضرب عددين يساوي صفراً فإنه يجب أن يكون أحد العددين يساوي صفراً، مثلاً $5 \times 0 = 0$ ، $0 \times 8 = 0$ ، ولذا فإنه إذا كان $ab = 0$ يؤدي الى $a=0$ أو $b=0$.



مثال 3) رياضة: يمثل القانون $L = -5t^2 + 30t$ ارتفاع سهم بالأمتار والذي أطلقه مختار في الهواء، إذ تمثل t الزمن بالثواني. احسب الزمن اللازم لكي يعود السهم من الارتفاع الذي انطلق منه.

$L = 0$ يكون السهم عند الارتفاع الذي انطلق منه. عندما يكون
لذا $-5t^2 + 30t = 0$

نحلل باستخراج العامل المشترك خاصية الضرب الصفري
أو $5t(-t + 6) = 0$

$$5t = 0 \Rightarrow t = 0$$

$$-t + 6 = 0 \Rightarrow t = 6$$

$t = 0$ هو زمن انطلاق السهم بالثواني.

$t = 6$ هو الزمن الذي استغرقه السهم للعودة الى الارتفاع الذي انطلق منه بالثواني .

مثال 4) حل المعادلات التالية باستعمال خاصية الضرب الصفري:

i) $x - 3$) $x + 5$) $(= 0 \Rightarrow x - 3 = 0$ أو $x + 5 = 0 \Rightarrow x = 3$ أو $x = -5$

ii) $t + 8$) $t + 8$) $(= 0 \Rightarrow t + 8 = 0$ أو $t + 8 = 0 \Rightarrow t = -8$ أو $t = -8$

iii) $y - 12$) $y - 9$) $(= 0 \Rightarrow y - 12 = 0$ أو $y - 9 = 0 \Rightarrow y = 12$ أو $y = 9$

iv) $2z - 7$) $z + 3$) $(= 0 \Rightarrow 2z - 7 = 0$ أو $z + 3 = 0 \Rightarrow z = \frac{7}{2}$ أو $z = -3$

v) $n + \sqrt{3}$) $n - \sqrt{2}$) $(= 0 \Rightarrow n + \sqrt{3} = 0$ أو $n - \sqrt{2} = 0 \Rightarrow n = -\sqrt{3}$ أو $n = \sqrt{2}$

vi) $x^2 - x = 0 \Rightarrow x$) $x - 1$) $(= 0 \Rightarrow x = 0$ أو $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$

vii) $4y^2 - 16y = 0 \Rightarrow 4y$) $y - 4$) $(= 0 \Rightarrow 4y = 0$ أو $y - 4 = 0 \Rightarrow y = 0$ أو $y = 4$

viii) $5z - 5z^2 = 0 \Rightarrow 5z$) $1 - z$) $(= 0 \Rightarrow 5z = 0$ أو $1 - z = 0 \Rightarrow z = 0$ أو $z = 1$

ix) $\sqrt{12} h^2 + 2h = 0 \Rightarrow 2\sqrt{3} h^2 + 2h = 0 \Rightarrow 2h$) $\sqrt{3}h + 1$) $(= 0$

$$\Rightarrow 2h = 0 \text{ أو } \sqrt{3}h + 1 = 0 \Rightarrow h = 0 \text{ أو } h = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

تأكّد من فهمك

حلّ المعادلات التالية باستعمال الجذر التربيعي :

1 $x^2 = 25$

2 $4y^2 = 1$

3 $12z^2 = 4$

الأسئلة (1-6)
مشابهة للمثال (2)

4 $n^2 - 3 = 13$

5 $7 + m^2 = 43$

6 $\frac{1}{2}x^2 = 9$

حلّ المعادلات التالية باستعمال خاصية الضرب الصفري :

7 $y - 4() y + 7(= 0$

8 $x + 10() x + 10(= 0$

الأسئلة (7-12)

9 $13 - m() 6 - m(= 0$

10 $h - 15() h - 8(= 0$

مشابهة للمثال (4)

11 $3x - 11() x + 9(= 0$

12 $v + \sqrt{5}() v - \sqrt{7}(= 0$

13 $y^2 - y = 0$

14 $5z^2 + 25z = 0$

الأسئلة (13 - 16)

15 $3t - t^2 = 0$

16 $\sqrt{18} x^2 + 3x = 0$

مشابهة للمثال (4)

تدرب وحلّ التمرينات

حلّ المعادلات التالية باستعمال الجذر التربيعي :

17 $y^2 = 36$

18 $7z^2 = 1$

19 $t^2 - 4 = 12$

20 $7 + n^2 = 56$

21 $z^2 = \frac{4}{9}$

22 $v^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

حلّ المعادلات التالية باستعمال خاصية الضرب الصفري :

23 $x - 5() x + 6(= 0$

24 $15 - n() 7 - n(= 0$

25 $5t - 13() t + 8(= 0$

26 $\sqrt{3} - v() \sqrt{3} + v(= 0$

27 $z^2 - z = 0$

28 $12n - 2n^2 = 0$

29 $2\sqrt{5} v^2 + 2\sqrt{5} v = 0$

تدرب وحل مسائل حياتية



30 **سجادة:** غرفة مربعة الشكل طول ضلعها x متر، فُرِشَتْ في وسطِ ارضيتها سجادة مربعة الشكل مساحتها $25m^2$. فكأنت مساحة المنطقة غير المغطاة بالسجادة $24m^2$. ما طول ضلع الغرفة؟



31 **كرة الريشة:** ضربت دينا كرة الريشة بالمضرب نحو الأعلى بسرعة 30 m/sec . إذا كان القانون $H = -5t^2 + 25t$ يعبر عن ارتفاع كرة الريشة في الهواء بالأمتار بدلالة الزمن بالثواني. احسب الزمن الذي استغرقته كرة الريشة للعودة الى سطح الأرض .



32 **رمية:** يمثل القانون $H = -5t^2 + 40t + 3$ ارتفاع السهم الذي اطلقه خالد في الهواء. إذ تمثل t الزمن بالثواني. جد ارتفاع السهم بعد 2 ثانية من اطلاقه. وما الزمن الازم لكي يعود السهم الى ارتفاع $3m$ ؟

فكر

تحذّر: حل المعادلات الآتية :

33 $x^2 - \frac{2}{3} = \left| -\frac{1}{2} \right|$

34 $3y^2 - 48 = 0$

35 $(z - 2\sqrt{5}) (2z + 2\sqrt{5}) = 0$

36 **أصحح الخطأ:** حلت جميلة المعادلة الآتية : $\left(\frac{1}{3}x - \frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{4}\right) = 0$

وكتبت $x = \frac{4}{3}$ أو $x = -\frac{4}{3}$. حدد خطأ جميلة وصححه.

37 **حسب عدديّ:** أثبت أن $(y^2 + 2y - 15) (y - 3) + 5(y - 3) = 0$ ، ثم جد حل المعادلة : $y^2 + 2y = 15$

أكتب

$x(x + 4) = 60$

مسألة حياتية تمثل المعادلة الآتية :

Solving Two-steps Algebraic Inequalities in R



تَعَلَّم

ياسين عمره 14 سنة يتدرب على كرة القدم، ويفكر في المشاركة في الفريق الوطني. أكتب متباينة وحلها لتحديد بعد كم سنة يمكنه الانضمام للفريق الوطني.

فريق الناشئين (العمر 16 - 21) ، الفريق الوطني (العمر 27 فما فوق) ، فريق الشباب (العمر 22 - 26).

فكرة الدرس

• حل المتباينات الجبرية ذات الخطوتين باستعمال العمليات الأربع وتمثيل الحل على مستقيم الأعداد.

المفردات

• المتباينة الجبرية.
• مجموعة الحل.



[4-4-1] حل المتباينات الجبرية ذات الخطوتين باستعمال الجمع والطرح

Solving Two-steps Algebraic Inequalities by Using addition and subtraction

تسمى المتباينة التي تحتوي على متغير أو أكثر متباينة جبرية، وكل عدد يجعل المتباينة صحيحة هو حل للمتباينة، وتسمى مجموعة الحلول للمتباينة بمجموعة الحل، ويمكن تمثيلها على مستقيم الأعداد الحقيقية.

من خواص المتباينات على الأعداد الحقيقية :

- 1) خاصية الجمع : لكل $a, b, c \in R$ ، إذا كان $a \geq b$ فإن $a + c \geq b + c$
 - 2) خاصية الطرح : لكل $a, b, c \in R$ ، إذا كان $a \geq b$ فإن $a - c \geq b - c$
- العلاقات 1) و 2) تبقى صحيحة في حالة استبدال \geq بالعلاقات $>$ ، $<$ ، \leq .

مثال 1) أكتب متباينة تمثل المسألة وحلها لإيجاد عدد السنوات التي ينتظرها ياسين ليتمكن من الانضمام للفريق الوطني.

$$x + 14 \geq 27$$

$$x + 14 - 14 \geq 27 - 14$$

$$x \geq 13$$

المتباينة التي تمثل المسألة هي

اضف 14- الى طرفي المتباينة

يمكن ياسين بعد 13 سنة في الأقل من الانضمام الى الفريق الوطني.

مثال 2) حل المتباينات التالية في R باستعمال خصائص الجمع والطرح ومثله على مستقيم الأعداد:

i) $3x - 12 \leq 2x - 6 \Rightarrow 3x - 2x \leq 12 - 6 \Rightarrow x \leq 6$

ii) $2z - \frac{5}{7} < z - \frac{12}{7} \Rightarrow 2z - z < \frac{5}{7} - \frac{12}{7} \Rightarrow z < -1$

مثال 3) حل المتباينات التالية في R باستعمال خصائص الجمع والطرح :

i) $(3)y - \sqrt{2} (> 2y + \sqrt{2} \Rightarrow 3y - 3\sqrt{2} > 2y + \sqrt{2} \Rightarrow 3y - 2y > \sqrt{2} + 3\sqrt{2} \Rightarrow y > 4\sqrt{2}$

ii) $(8)\frac{1}{8}h + \frac{3}{16} (> 0 \Rightarrow 8 \times \frac{1}{8}h + 8 \times \frac{3}{16} > 0 \Rightarrow h + \frac{3}{2} > 0 \Rightarrow h > -\frac{3}{2}$

iii) $(11)m + 3 (< 10)m - 2 (\Rightarrow 11m + 33 < 10m - 20 \Rightarrow m < -53$

[4-4-2] حل المتباينات الجبرية ذات الخطوتين باستعمال الضرب والقسمة : Solving Two-steps Algebraic Inequalities by Using multiplication and division

يمكن حل المتباينات الجبرية باستعمال خواص الضرب والقسمة على الأعداد الحقيقية :

3) خاصية الضرب: i) لكل $a, b, c \in \mathbb{R}$. إذا كان $c < 0$. فإن $a \geq b$ فإن $ac \leq bc$

ii) لكل $a, b, c \in \mathbb{R}$. إذا كان $c > 0$. فإن $a \geq b$ فإن $ac \leq bc$

4) خاصية القسمة: i) لكل $a, b, c \in \mathbb{R}$. إذا كان $a \geq b$ وأن $c > 0$ فإن $\frac{a}{c} \leq \frac{b}{c}$

ii) لكل $a, b, c \in \mathbb{R}$. إذا كان $a \geq b$ وأن $c < 0$ فإن $\frac{a}{c} \geq \frac{b}{c}$



مثال 4) طيور: لدى أنور 18 طائراً ولدى أثير 98 طائراً. يريد أنور

أن يضاعف عدد الطيور ليكون عددها أكثر من عدد طيور أثير

بمقدار 10 طيور في الأقل. كم مرة يجب أن يضاعف أنور عدد

الطيور التي لديه ؟

اكتب المتباينة التي تمثل المسألة

$$18x - 10 \geq 98$$

اضف 10 الى طرفي المتباينة

$$18x - 10 + 10 \geq 98 + 10$$

اقسم طرفي المتباينة على 18

$$18x \geq 108$$

يجب أن يضاعف أنور عدد طيوره 6 مرات في الأقل

$$x \geq 6$$

مثال 5) حل المتباينات التالية في \mathbb{R} باستعمال خواص الضرب والقسمة ومثله على مستقيم الأعداد:

i) $\left(\frac{6y}{-2} > 3\right) \Rightarrow \frac{6y}{-2} \times \frac{-2}{6} < 3 \times \frac{-2}{6} \Rightarrow y < -1$

ii) $2x - 2 \leq \frac{-5}{2} \Rightarrow 2x \leq \frac{-5}{2} + 2 \Rightarrow 2x \leq \frac{-1}{2} \Rightarrow x \leq \frac{-1}{4}$

مثال 6) حل المتباينات التالية في \mathbb{R} باستعمال خواص الضرب والقسمة :

i) $\left(\frac{9x}{4} > \frac{3}{5}\right) \Rightarrow \frac{9x}{4} \times \frac{1}{9} > \frac{3}{5} \times \frac{1}{9} \Rightarrow \frac{x}{4} \times 4 > \frac{3}{45} \times 4 \Rightarrow x > \frac{12}{45} \Rightarrow x > \frac{4}{15}$

ii) $\left(\frac{-2t}{7} \geq \frac{5}{14}\right) \Rightarrow \frac{-2t}{7} \times \frac{7}{2} \geq \frac{5}{14} \times \frac{7}{2} \Rightarrow -t \geq \frac{5}{4} \Rightarrow -t(-1) \leq \frac{5}{4}(-1) \Rightarrow t \leq \frac{-5}{4}$

حل المتباينات التالية في \mathbb{R} باستعمال خواص المتباينات على الأعداد الحقيقية :

iii) $(6z < 3) z - 6 \Rightarrow 6z < 3z - 18 \Rightarrow 6z - 3z < -18 \Rightarrow 3z < -18 \Rightarrow z < -6$

iv) $\left(\frac{m}{8} > \frac{1}{3} - 2\right) \Rightarrow \frac{m}{8} > \frac{-5}{3} \Rightarrow \frac{m}{8} \times 8 > \frac{-5}{3} \times 8 \Rightarrow m > \frac{-40}{3}$

v) $\left(\frac{5}{-9} \leq \frac{k}{3}\right) \Rightarrow \frac{5}{-9} \times 9 \leq \frac{k}{3} \times 9 \Rightarrow -5 \leq 3k \Rightarrow 3k \geq -5 \Rightarrow k \geq \frac{-5}{3}$

تأكد من فهمك

حل المتباينات التالية في R باستعمال الخصائص ومثله على مستقيم الأعداد :

1 $2y - 8 \leq 3y - 8$

2 $2x - 6 > x - \sqrt{16}$

(الأسئلة 1 - 4)

3 $4t + \frac{2}{3} \geq 3t - \frac{5}{3}$

4 $\frac{3}{5} < z - \frac{9}{10}$

(مشابهة الى الأمثلة 1.2)

حل المتباينات التالية في R باستعمال خصائص الجمع والطرح :

5 $7) x - \sqrt{3} (> 6x + \sqrt{3}$

6 $2y + \sqrt[3]{-27} \geq 3y - \sqrt[3]{8}$

(الأسئلة 5 - 8)

7 $5) \frac{1}{5} m + \frac{3}{10} (> 0$

8 $9) z - 4 (< 10) z + 3 (< 10)$

(مشابهة الى المثال 3)

حل المتباينات التالية في R باستعمال الخصائص الضرب والقسمة :

9 $\frac{3t}{4} \geq \frac{5}{7}$

10 $\frac{-5x}{7} > \frac{7}{21}$

11 $\frac{y}{7} \leq \frac{5}{14}$

(الأسئلة 9 - 11)

(مشابهة الى المثال 6)

حل المتباينات التالية في R باستعمال خصائص المتباينات على الأعداد الحقيقية :

12 $5)v + \sqrt{7} (> 2v - \sqrt{7}$

13 $2z + \sqrt[3]{-125} > 6z - \sqrt[3]{27}$

14 $9) \frac{1}{3} x + \frac{7}{9} (< 0$

15 $\frac{5}{6}) t - 6 (< 11) t + 2 (< 11)$

(الأسئلة 12 - 17)

16 $\frac{-h}{13} > \frac{1}{26} - 1$

17 $\frac{2x}{3} + 4 \leq \frac{8}{3} - 5$

(مشابهة الى الأمثلة 3.6)

تدرب وحل التمرينات

حل المتباينات التالية في R باستعمال خصائص الجمع والطرح :

18 $9) z - \sqrt{5} (> 8z - \sqrt{5}$

19 $7) \frac{1}{7} m + \frac{5}{14} (> 0$

حل المتباينات التالية في R باستعمال خصائص الضرب والقسمة :

20 $\frac{2p}{3} \geq \frac{-6}{21}$

21 $\frac{-4x}{9} > \frac{-8}{27}$

حل المتباينات التالية في R باستعمال خصائص المتباينات على الأعداد الحقيقية :

22 $6)x - \sqrt{3} (> 4x - \sqrt{3}$

23 $8y + \sqrt[3]{-8} > 4y - \sqrt{121}$

24 $7) \frac{1}{4} x - \frac{3}{14} (< 0$

تدرب وحل مسائل حياتية



25 **خرزة:** تريدُ صبا أن تهدي أختها في عيد ميلادها عقداً من خرز اللؤلؤ، يتألف من 100 خرزة ويتطلبُ صنعه 7 ساعات، إذا كان في العقد 16 خرزة فما أقل عددٍ من الخرز ينبغي لها ادخاله في كل ساعة لأكمال العقد؟



26 **كرة القدم:** في مباراة الدوري لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، فاز فريق القوة الجوية في 7 مباريات وخسر في 3 مباريات وبقي أمامه 22 مباراة. ما أقل عددٍ من المباريات الباقية يجب أن يفوز بها الفريق لكي يفوزَ بأكثر من نصفِ العدد الكلي للمباريات؟



27 **مدينة الألعاب:** يحتاج شباك التذاكر في مدينة الألعاب الى 1400000 دينار لتغطية نفقاته التشغيلية يومياً. إذا باع بمبلغ 650000 دينار حتى الظهر بسعر التذكرة 750 ديناراً، فكم تذكرة عليه بيعها في الأقل لتلايقع تحت العجز المالي؟

فكّر

تحذّر: حل المتباينات الآتية :

$$28 \quad 2y - \frac{3}{4} > | -\frac{3}{2} | \quad 29 \quad 7) \frac{1}{5}z - 1(< 1 \quad 30 \quad) \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{5}}{2} () 4 + \sqrt[3]{-8}) \geq 0$$

31 **أصحّ الخطأ:** حل عثمان المتباينة التالية: $\frac{v}{5} - \frac{1}{4} \leq \frac{3}{4} - 1$ وكتب مجموعة الحل هي: $\{5, 6, 7, \dots\}$ حدد خطأ عثمان وصححه .

32 **حسّ عدديّ:** أثبت أن قيم h التي تجعل المتباينة التالية صحيحة هي اعداداً سالبة فقط :

$$3h + \frac{1}{3} > | -\frac{1}{6} | - \frac{1}{3}$$

أكتب

مسألة حياتية تمثل المتباينة الآتية :

$$500x + 600000 \leq 1600000$$



تعلّم

إذا أراد 8 جنود الصعود الى المروحية ويحمل كل واحد منهم 20kg من معداته الشخصية .
أكتب متباينة وحلها لايجاد الوزن الإضافي المسموح به لكل جندي على أن لا تزيد حملوئهم الكلية على 880kg.

فكرة الدرس

- حل المتباينات الجبرية متعددة الخطوات باستعمال الخصائص وتمثيل الحل على مستقيم الأعداد .
- المفردات
- المتباينة الجبرية.
- المتغير.

[4-5-1] حل المتباينات الجبرية متعددة الخطوات والتي تتضمن متغيراً في أحد طرفيها .

Solving Multi-steps Algebraic Inequalities Which has variable in one side

حل متباينة تحتوي على متغير في احد طرفيها. استعمل الخواص لعزل الحد الذي يحتوي على المتغير في طرف المتباينة. ثم اجعل معامل واحد باستعمال خاصية الضرب او القسمة وجد مجموعة الحل للمتباينة. ويمكن تمثل مجموعة الحل على مستقيم الأعداد الحقيقية .

مثال 1) أكتب متباينة تمثل المسألة وحلها لايجاد عدد الكيلوغرامات الإضافية المسموح بها الى لكل جندي .

$$8(w + 20) \leq 880$$

$$8w + 160 \leq 880$$

$$8w \leq 720$$

$$w \leq 90$$

نفرض أن المتغير w يمثل الوزن الإضافي المسموح به لكل جندي

اضف 160 - الى طرفي المتباينة

اقسم طرفي المتباينة على 8

يستطيع كل جندي أن يحمل 90kg من الوزن الإضافي الى المروحية

مثال 2) حل المتباينات التالية في R باستعمال خصائص ومثله على مستقيم الأعداد :

$$i) 3(y-2) \leq 6 - \sqrt[3]{27} \Rightarrow 3y - 6 \leq 3 \Rightarrow 3y \leq 9 \Rightarrow y \leq 3$$

$$ii) \left(\frac{1}{2}\right)x - \frac{4}{3} + \frac{1}{2}x < -\frac{10}{6} \Rightarrow \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x < -\frac{10}{6} + \frac{4}{6} \Rightarrow x < -1$$

مثال 3) حل المتباينات التالية في R باستعمال خصائص المتباينات على الأعداد الحقيقية :

$$i) (5)z - \sqrt{3} \geq 10 (2 - \sqrt{3}) \Rightarrow z - \sqrt{3} \geq 4 - 2\sqrt{3} \Rightarrow z \geq 4 - 2\sqrt{3} + \sqrt{3} \Rightarrow z \geq 4 - \sqrt{3}$$

$$ii) \left(\frac{1}{3}\right)v + \sqrt[3]{-27} - \frac{4}{3}v > |-3| \Rightarrow \frac{1}{3}v - \frac{4}{3}v - 3 > 3 \Rightarrow -v > 6 \Rightarrow v < -6$$

$$iii) (9 - \sqrt[3]{-8} < 5)x - 1 \Rightarrow 9 + 2 < 5x - 5 \Rightarrow 11 < 5x - 5 \Rightarrow 16 < 5x \Rightarrow x > \frac{16}{5}$$

$$iv) \left(\frac{-4}{7}\right)\frac{7}{2}h + \frac{14}{8} > 0 \Rightarrow \frac{-4}{7} \times \frac{7}{2}h + \frac{-4}{7} \times \frac{14}{8} > 0 \Rightarrow -2h - 1 > 0 \Rightarrow -2h > 1 \Rightarrow h < -\frac{1}{2}$$

**[4-5-2] حل المتباينات الجبرية متعددة الخطوات والتي تتضمن متغيراً في طرفيها :
Solving Multi-step Algebraic Inequalities Which has variable in both sides**

لحل المتباينات الجبرية متعددة الخطوات والتي تتضمن متغيراً في طرفيها أتبع ما يأتي :

- 1- استعمل خاصية التوزيع للتخلص من الأقواس إن وجدت. 2- احصر المتغير في طرف واحد من المتباينة.
- 3- استعمل ترتيب العمليات لتبسيط المتباينة. 4- استعمل الخصائص لإيجاد مجموعة الحل للمتباينة.

مثال (4) حيوانات: وزن الدب 600kg قبل مرحلة السبات ، وزنه الطبيعي لا يقل من 440kg

، يمكن أن يفقد من وزنه 8kg في الأسبوع عند السبات. فكم اسبوعاً يستطيع أن يصمد في



السبات ليصل الى وزنه الطبيعي؟

نفرض ان المتغير x يمثل عدد الاسبوع

اكتب المتباينة التي تمثل المسألة

اضف الى طرفي المتباينة -600

اقسم طرفي المتباينة على -8

$$600 - 8x \geq 440$$

$$- 8x \geq 440 - 600$$

$$-8 x \geq -160$$


$$x \leq 20$$

يستطيع الدب أن يصمد 20 اسبوعاً على الاكثر.

مثال (5) حل المتباينات التالية في R باستعمال الخصائص ومثله على مستقيم الأعداد:


i) $(\frac{2x}{5} > 4)x - 9(\Rightarrow \frac{2x}{5} > 4x - 36 \Rightarrow 2x > 20x - 180$

$$\Rightarrow 180 > 18x \Rightarrow 10 > x \Rightarrow x < 10$$



ii) $3(y - 2) \leq 5(2 - y) \Rightarrow 3y - 6 \leq 10 - 5y$

$$\Rightarrow 3y + 5y \leq 10 + 6 \Rightarrow 8y \leq 16 \Rightarrow y \leq 2$$



مثال (6) حل المتباينات التالية في R باستعمال الخصائص المتباينات على الأعداد الحقيقية:

i) $(8)t - 3(> 7)t - 5(\Rightarrow 8t - 24 > 7t - 35 \Rightarrow 8t - 7t > 24 - 35 \Rightarrow t > -11$

ii) $(\frac{-2x}{5} \leq \frac{x}{7} \Rightarrow 7(-2x) \leq 5x \Rightarrow -14x \leq 5x \Rightarrow 0 \leq 5x + 14x \Rightarrow 0 \leq 19x \Rightarrow x \geq 0$

iii) $(\frac{1}{4})z + 4(< \frac{1}{2})\sqrt{2} - z(\Rightarrow \frac{1}{4}z + 1 < \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2}z \Rightarrow \frac{1}{4}z + \frac{1}{2}z < \frac{1}{\sqrt{2}} - 1$

$$\Rightarrow \frac{3}{4}z < \frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow z < \frac{4 - 4\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$$

iv) $(\frac{h}{4} + \frac{1}{3} \geq \frac{h}{2} - \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \geq \frac{h}{2} - \frac{h}{4} \Rightarrow \frac{2}{3} \geq \frac{h}{4} \Rightarrow 8 \geq 3h \Rightarrow \frac{8}{3} \geq h$

v) $(\frac{7}{\sqrt[3]{-27}} - 2y \leq \frac{2}{3} - y \Rightarrow \frac{7}{-3} - 2y \leq \frac{2}{3} - y \Rightarrow \frac{7}{-3} - \frac{2}{3} \leq 2y - y \Rightarrow \frac{-9}{3} \leq y$

$$\Rightarrow -3 \geq y$$

تأكّد من فهمك

حل المتباينات التالية في R باستعمال الخصائص ومثله على مستقيم الأعداد:

1 $5(x-1) \leq 8 - \sqrt[3]{-8}$

2 $\frac{1}{3}z - \frac{7}{2} \left(+ \frac{1}{3}z \geq -\frac{23}{6} \right)$

الأسئلة (1 - 4)
مشابهة للمثال 2.5

3 $\frac{t}{2} < 2 \left(\frac{1}{\sqrt{16}} - t \right)$

4 $7(n-1) \leq 9(1-n)$

حل المتباينات التالية في R باستعمال خصائص المتباينات على الأعداد الحقيقية:

5 $2(x - \sqrt{5}) \leq 11(1 - \sqrt{5})$

6 $\frac{1}{2}y - \sqrt[3]{-8} - \frac{3}{2}y > |-7|$

الأسئلة (5 - 8)
مشابهة للمثال 3

7 $12 - \sqrt[3]{-125} \geq 6(z-1)$

8 $-\frac{5}{7} \left(\frac{7}{3}m + \frac{14}{5} \right) < 0$

9 $6(4-h) \leq 7(h-5)$

10 $-\frac{3z}{7} \geq \frac{1}{7} + z$

الأسئلة (9 - 14)
مشابهة للمثالين 3.6

11 $\frac{1}{9}x - \sqrt{2} \left(> \frac{1}{3} \right) \sqrt{2} - x$

12 $\frac{n}{6} + \frac{3}{2} < \frac{n}{3} - \frac{1}{3}$

13 $\frac{5}{\sqrt[3]{-8}} - 4k \leq \frac{5}{2} - k$

14 $\frac{1}{2}(y-3) \geq \frac{1}{4}\sqrt{2} + y$

تدرب وحل التمرينات

حل المتباينات التالية في R باستعمال خصائص المتباينات على الأعداد الحقيقية:

15 $7)y+3(> 9 - \sqrt[3]{-27}$

16 $\frac{1}{7}t - \frac{1}{8} \left(+ \frac{1}{7}t \geq -\frac{6}{7} \right)$

17 $\frac{x}{5} \leq 4 \left(\frac{1}{\sqrt{36}} - 2x \right)$

18 $8)h + 3(< 12) 1 - h$

19 $5)z - \sqrt{3} \left(> 7) 1 - \sqrt{3} \right)$

20 $\frac{1}{6}m - \sqrt[3]{-27} - \frac{2}{3}m \leq |-9|$

21 $14k - \sqrt[3]{-64} \geq 7(k-1)$

22 $-\frac{8}{3} \left(\frac{6}{8}x + \frac{3}{4} \right) < 0$

23 $9)3 + y(> 6) y - 4$

24 $-\frac{2n}{7} \geq \frac{3}{5} + n$

25 $\frac{1}{6}z - \sqrt{3} \leq \frac{1}{6}\sqrt{3} - z$

26 $\frac{h}{4} + \frac{2}{3} > \frac{h}{3} + \frac{4}{3}$

27 $\frac{8}{\sqrt[3]{-125}} - 2x < \frac{2}{5} - x$

28 $\frac{1}{9}(y+6) \geq \frac{1}{6}\sqrt{6} - y$



29 **حديقة الحيوان:** باع شباك التذاكر في حديقة الحيوان تذاكر بمبلغ 450000 دينار بسعر التذكرة 500 دينار لحد الظهر، ويحتاج شباك التذاكر الى مبلغ 1850000 دينار يومياً لتغطية نفقاته التشغيلية. ما أقل عدد من التذاكر عليه بيعها لتغطية النفقات التشغيلية؟



30 **كرة السلة:** ضمن مباريات الدوري لكرة السلة فاز الفريق الأصفر في 22 مباراة وخسر 10 مباريات وبقى أمامه 40 مباراة ليخوضها. ما أقل عدد من المباريات الباقية التي ينبغي للفريق الفوز بها، لكي يفوز بأكثر من نصف العدد الكلي من المباريات؟



31 **طائرات ورقية:** تريد نادية عمل طائرة ورقية من قطعة ورقية مستطيلة الشكل يزيد طولها بمقدار 15cm على عرضها. ما أقل طول للقطعة الورقية بحيث يكون محيطها أكبر من 130cm؟

فكر

نحدد: حل المتباينات الآتية:

$$32 \quad \frac{1}{2}x + \sqrt[3]{-125} - \frac{5}{2}x < |-6| \quad 33 \quad \frac{3}{5}y - \frac{1}{3}(5 + \sqrt[3]{-125}) \geq 2y$$

$$34 \quad \text{أصح الخطأ:} \text{ حلت وردة المتباينة الآتية: } \left(\frac{5}{3}\right) \left(\frac{h}{5} + \frac{3}{4}\right) \leq \frac{5}{4} - 2$$

وكتبت مجموعة الحل هي: $\{-6, -5, -4, \dots\}$ حدد خطأ وردة وصححه

35 **جس عددي:** أثبت أن قيم z التي تجعل المتباينة التالية صحيحة هي اعداد سالبة فقط.

$$7z - \frac{1}{7} > \left| -\frac{1}{7} \right| - \frac{4}{14}$$

مسألة حياتية تمثل المتباينة الآتية :

أكتب

$$) x + 6(\leq 40$$

حل المعادلات التالية باستعمال الخصائص الأعداد الحقيقية وتحقق من صحة الحل :

1 $z = \sqrt[3]{-8} + 2z$

2 $4m - 5\sqrt{3} = 3m + 6\sqrt{3}$

3 $\sqrt{36} h = |-16| + 5h$

4 $3z \div 21 = \frac{1}{7}$

5 $\sqrt[3]{125} x \div |-9| = 5^2$

6 $\sqrt{3} x \div 9 = \sqrt{3} \div 3$

7 $\frac{\sqrt{5} h}{2} = \frac{1}{\sqrt{5}}$

8 $\frac{9y}{2\sqrt[3]{4}} = \frac{18}{4}$

9 $6z \div 13 = 5z \div 13$

10 $8) h - 1^2(= \frac{1}{2}h - 6$

11 $5\sqrt{3} - z = z - 7\sqrt{3}$

12 $\sqrt{64} y = 10) y - 1(+ 3^2$

حل المعادلات التالية في R باستعمال الخصائص :

13 $3)x - 10(= 2)x + 10($

14 $\sqrt[3]{-8} y \div |-8| = 4\sqrt{2}$

15 $\frac{1}{3}z - 7(+ \frac{7}{3} = \frac{1}{5}z - 10 ($

16 $\frac{t}{8 + \sqrt[3]{-27}} = \frac{6t}{5}$

17 $|y - 12| = 7$

18 $|2v - 5| = \sqrt{36}$

19 $|\frac{1}{3}n + 8| = \sqrt[3]{-125}$

20 $|7x - 14| = |-18|$

21 $|z - \sqrt{3}| = 4\sqrt{3}$

حل المعادلات التالية في R باستعمال الجذر التربيعي :

22 $x^2 = 64$

23 $9y^2 = 1$

24 $12t^2 = 4$

25 $n^2 - 5 = 20$

26 $7 - z^2 = -42$

27 $\frac{1}{4}k^2 = 9$

28 $y^2 = \frac{4}{9}$

29 $h^2 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

حل المعادلات التالية في R باستعمال خاصية الضرب الصفري :

30 $)y - 4()y + 4(= 0$

31 $)z - 7()z - 7(= 0$

32 $)x + \sqrt{5}()x - \sqrt{3}(= 0$

33 $)\sqrt{2} - h()\sqrt{2} + h(= 0$

34 $)4t + 8()3t - 7(= 0$

35 $z^2 - z = 0$

36 $\sqrt{8} x^2 + 2x = 0$

37 $3\sqrt{7} n^2 - 3\sqrt{7} n = 0$

38 $\frac{1}{5} y^2 - \frac{1}{5} y = 0$

حل المتباينات التالية باستعمال خصائص المتباينات على الأعداد الحقيقية :

39 $2)x - \sqrt{2}(\geq x - \sqrt{2}$

40 $9z + \sqrt[3]{-27} > 10z - \sqrt[3]{125}$

41 $5) \frac{1}{2}y - \frac{3}{10} (\leq 0$

42 $\frac{t}{-7} - 1 < \frac{-1}{14}$

43 $\frac{2m}{9} - \frac{1}{9} \leq \frac{1}{9}$

44 $3)x + 7(> 6 - \sqrt[3]{-64}$

45 $\frac{1}{6}z - \frac{12}{5} (+ \frac{5}{6}z \geq -\frac{3}{5}$

46 $\frac{y}{4} \leq 2(\frac{1}{\sqrt{16}} - \frac{1}{8}y($

47 $5)x + 1(< 2)1 - x($

48 $\frac{1}{3}h - \sqrt{2} \leq \frac{2}{3})\sqrt{2} - h($

49 $\frac{m}{6} + \frac{2}{5} > \frac{m}{3} - \frac{4}{5}$

50 $\frac{9}{\sqrt[3]{-27}} - 5y < \frac{1}{5} - y$

Geometry and Measurement


الهندسة والقياس

- الدرس 5-1 علاقة الزوايا والمستقيمات (نظريات)
- الدرس 5-2 تطابق المثلثات
- الدرس 5-3 خواص المثلثات (متساوي الساقين، متساوي الاضلاع ، قائم الزاوية)
- الدرس 5-4 متوازي الأضلاع والمعين وشبه المنحرف
- الدرس 5-5 الاسطوانة والكرة (الخصائص ، المساحة السطحية ، الحجم)
- الدرس 5-6 مساحة الاشكال المركبة المنتظمة وغير المنتظمة


يمثل نصب (انقاذ العراق) للفنان الراحل محمد غني حكمت الموجود في ساحة الفارس العربي بمنطقة المنصور. الختم السومري الاسطواني المائل الذي يستند الى سواعد عراقية بإرتفاع ستة امتار تمثل صمود العراقيين في مواجهة كل التحديات لما يمتلكه من حضارة ومجد وتاريخ منذ أقدم العصور ارتفاع هذا النصب مع القاعدة يبلغ 10m .

جد قيمة الزاوية المجهولة في كل من المثلثات المبينة في الأشكال الآتية:


1



2




3




احسب مساحة المنطقة المظللة في الأشكال المستوية الآتية:


4




5



6



7



أكتب صحيحاً أو غير صحيحٍ لكلٍ من العبارات الآتية :

- 8 المستقيمان المتوازيان لا يلتقيان أبداً.
- 9 المستقيمان المتعامدان لا يوجد بينهما نقطة التقاء.
- 10 المستقيمان المتوازيان البعد بينهما ليس ثابتاً.
- 11 المستقيمان المتعامدان يشكلان بينهما زاوية قائمة


أكمل الفراغات الآتية :

- 12 الزاويتان المتكاملتان يكون مجموع قياسهما
- 13 الزاويتان المتتامتان يكون مجموع قياسهما
- 14 تكون الزاويتان المتبادلتان بالقياس .
- 15 مجموع زوايا المثلث
- 16 يريد أحمد رصف ساحة مربعة الشكل طول ضلعها 9m ببلاط مربع مساحة البلاطة الواحدة $0.25m^2$.
أحسب عدد البلاطات اللازمة لإجراز عملية الرصف .

تَعَلَّم

الشكل المجاور فيه $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$. $\overleftrightarrow{L_3}$

يقطع كل من المستقيمين المتوازيين في النقطتين A,B,



* تسمى الزاويتان 1,2 زاويتان متناظرتان

وتكونان متساويتان بالقياس .

* تسمى الزاويتان 2,3 زاويتان متبادلتان

وتكونان متساويتان بالقياس .

* تسمى الزاويتان 2,4 زاويتان داخليتان وعلى جهة

واحدة من القاطع متكاملتان ويكون مجموع قياسهما 180° . $\overleftrightarrow{L_3}$

فكّزة الدريس

• التعرف الى علاقة

الزوايا المتبادلة والمتناظرة

والداخلية وبالعكس.

المفردات

• الزوايا المتناظرة


• الزوايا المتبادلة

• الزوايا الداخلية

تعلمت سابقاً أنه إذا قطع مستقيمان متوازيان بمستقيم ثالث فالزوايا الناجمة : متقابلة بالرأس، متبادلة،

متناظرة، متساوية بالقياس . في هذا الدرس سنتعلم متى يكون المستقيمان متوازيين .

* عكس مبرهنة الزوايا المتناظرة:




« إذا قطع مستقيم مستقيمين في المستوى نفسه وكانت الزاويتان

المتناظرتان متساويتان بالقياس فإن المستقيمين متوازيان »

أذا كان : $m \angle 1 = m \angle 2$ المتناظرتان فإن $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$

* عكس مبرهنة الزوايا المتبادلة:




« إذا قطع مستقيم مستقيمين في المستوى نفسه وكانت الزاويتان

المتبادلتان متساويتان بالقياس فإن المستقيمين متوازيان »

أذا كان : $m \angle 1 = m \angle 2$ المتبادلتان فإن $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$

* عكس مبرهنة الزوايا الداخلية:



« إذا قطع مستقيم مستقيمين في المستوى نفسه وكانت الزاويتان

الداخليتان متكاملتان وعلى جهة واحدة من القاطع فإن المستقيمين


متوازيين »

أذا كان : $m \angle 1 + m \angle 2 = 180^\circ$ داخليتان فإن $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$

مثال 1)

استعمل المعطيات في الشكل المجاور :

إذا $m\angle 1 = m\angle 2$ بين أن $\vec{L} \parallel \vec{M}$.



الحل :

معطى $m\angle 1 = m\angle 2$

زاويتان متقابلتان بالرأس $m\angle 2 = m\angle 3$


(إذا ساوت كميتان كمية واحدة فالكميتان متساويتان) $m\angle 1 = m\angle 3$

زاويتان متناظرتان $\angle 1, \angle 3$

أذن $\vec{L} \parallel \vec{M}$ عكس مبرهنة الزوايا المتناظرة

مثال 2)

استعمل المعطيات في الشكل المجاور وبين أن $\vec{L} \parallel \vec{M}$.



الحل :

زاويتان متقابلتان بالرأس $m\angle 1 = 30^\circ$

زاويتان متقابلتان بالرأس $m\angle 2 = 150^\circ$

الزاويتان 1, 2 داخليتان وعلى جهة واحدة من القاطع ومجموعهما 180°

أذن $\vec{L} \parallel \vec{M}$ عكس مبرهنة الزوايا الداخلية

مثال 3)

استعمل المعطيات في الشكل المجاور :

حيث $m\angle 1 = m\angle 3$. $\vec{K} \parallel \vec{V}$ بين أن $\vec{L} \parallel \vec{M}$.

الحل :


معطى $m\angle 1 = m\angle 3$

زاويتان متناظرتان $m\angle 1 = m\angle 2$

(إذا ساوت كميتان كمية واحدة فالكميتان متساويتان) $m\angle 2 = m\angle 3$


زاويتان متبادلتان $\angle 3, \angle 2$

أذن $\vec{L} \parallel \vec{M}$ عكس مبرهنة الزوايا المتبادلة




تأكّد من فهمك

استعمل المعطيات وعكس المبرهنات لتبين أن :




1 إذا كان $m\angle 1 = m\angle 2$

فإن : $\overleftrightarrow{L} \parallel \overleftrightarrow{M}$



2 إذا كان $\overleftrightarrow{L} \parallel \overleftrightarrow{H} \parallel \overleftrightarrow{M}$

فإن : $m\angle 1 = m\angle 2$




3 إذا كان $X=15a$, $a = 4$


فإن : $\overleftrightarrow{L} \parallel \overleftrightarrow{M}$

استعمل المعطيات وعكس المبرهنات لتبين أن $\overleftrightarrow{L} \parallel \overleftrightarrow{M}$


تدرب وحلّ التمرينات



4 $X=7a$, $a = 5$



5 $m\angle 1 = m\angle 2$



6 $m\angle x = 30^\circ$


تدرب وحل مسائل حياتية

7

موقف سيارات: أراد مهندس تخطيط موقف للسيارات بصورة

متوازية . أستعمل المعطيات وعكس المبرهنات لتبين ان

$$\overleftrightarrow{L} \parallel \overleftrightarrow{M} \text{ حيث } m\angle 1 = m\angle 2 \text{ وأن } \overleftrightarrow{H} \parallel \overleftrightarrow{M}$$




8

رسم: رسم محمد المثلث المتساوي الأضلاع كما في الشكل المجاور

$$\text{إذ } m\angle 1 = m\angle 2$$

ساعد محمد في إثبات أن $\overline{BC} \parallel \overrightarrow{AD}$.




فكر

9

تحدّ: في الرسم المقابل $\overleftrightarrow{H} \parallel \overleftrightarrow{L}$, $m\angle 1 = m\angle 2$, $\overleftrightarrow{H} \parallel \overleftrightarrow{L}$

برهن أن $\overleftrightarrow{L} \parallel \overleftrightarrow{M}$.




10

أصحح الخطأ: رسم مهند الشكل المجاور وقال بما أن

$$m\angle 1 + m\angle 2 = 180^\circ \text{ أذن } \overleftrightarrow{L} \parallel \overleftrightarrow{M} \text{ ؟}$$


اكتشف الخطأ وصححه.




أكتب

هل المعلومات المعطاة في الشكل المجاور تسمح لك أن تستنتج أن $\overleftrightarrow{L} \parallel \overleftrightarrow{M}$ ؟


وضح ذلك.



Congruence of Triangles



A



B

تَعَلَّم

يُبين الشكل المجاور شكلين متطابقين ونقصد بذلك ان كلاً من الشكلين المتطابقين هو نسخة طبق الاصل من الآخر. فقولنا ان الشكل A ينطبق على الشكل B يعني ان الشكل A نسخة اخرى من الشكل B. القطع المستقيمة تتطابق اذا كان لها القياس نفسه اي الطول نفسه وتتطابق الزوايا اذا كان لها القياس نفسه وتتطابق المضلعات اذا امكن وضع احدهما على الاخر بحيث تنطبق رؤوس كل مضلع على الاخر

نستخدم الرمز \cong للدلالة على التطابق .

فكرة الدرس

• التعرف الى مفهوم التطابق وحالات تطابق المثلثات.

المفردات

- التطابق.
- عناصر المثلث الستة.
- ضلعان وزاوية محددة بهما.
- زاويتان وضلع محدد بهما.
- ثلاثة أضلاع.

[5- 2- 1] مفهوم تطابق مثلثين

Concept of Congruence of Two Triangles


من المعلوم أنّ للمثلث ثلاثة اضلاع وثلاث زوايا (تسمى عناصر المثلث الستة) . يتطابق المثلثان اذا كان لكل عنصر من العناصر الستة من احد المثلثين عنصر يطابقه من المثلث الآخر . والعكس صحيح ايضاً اي : اذا تطابق مثلثان فان لكل عنصر من العناصر الستة من احد المثلثين عنصراً يطابقه من المثلث الآخر (يسمى نظيره) . واذا تطابق مثلثان فان مساحة سطح المثلث الاول تساوي مساحة سطح المثلث الثاني .

[5- 2- 2] حالات تطابق مثلثين

Cases of Congruence of Two Triangles

ليس من الضروري اثبات تطابق العناصر الستة من احد المثلثين مع نظائرها من المثلث الثاني بل يكفي معرفة 3 عناصر (بينها ضلع على الاقل) (من احد المثلثين مع نظائرها من المثلث الاخر . وفيما يلي الحالات التي يتطابق فيها المثلثين :

الحالة الاولى : تطابق الاضلاع الثلاثة (يتطابق المثلثان اذا تطابقت اضلاع المثلث الاول مع نظائرها من المثلث الثاني .



مثال 1)

في الشكل المجاور :


$$* \text{ الضلع } \overline{AB} \text{ ينطبق على الضلع } \overline{A'B'} \text{ (} \overline{AB} \cong \overline{A'B'} \text{)}$$

$$* \text{ الضلع } \overline{AC} \text{ ينطبق على الضلع } \overline{A'C'} \text{ (} \overline{AC} \cong \overline{A'C'} \text{)}$$

$$* \text{ الضلع } \overline{BC} \text{ ينطبق على الضلع } \overline{B'C'} \text{ (} \overline{BC} \cong \overline{B'C'} \text{)}$$

$$\text{ أي أن : } \triangle ABC \cong \triangle A'B'C' \text{ (ض ض ض)}$$

الحالة الثانية: (تطابق ضلعين والزوايا المحددة بينهما) يتطابق مثلثان اذا تطابق ضلعان وزاوية محددة بينهما مع نظائرها من المثلث الاخر.



مثال 2) في الشكل المجاور:

* الضلع $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ (ينطبق على الضلع $\overline{A'B'}$)

* الضلع $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$ (ينطبق على الضلع $\overline{B'C'}$)

* الزاوية $\angle ABC \cong \angle A'B'C'$ (تنطبق على الزاوية $\angle A'B'C'$)

أي أن: $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ (ض ز ض)

الحالة الثالثة: (تطابق زاويتين والضلع المحدد بينهما) يتطابق مثلثان اذا تطابقت زاويتان والضلع المحدد بينهما (الواصل بينهما) مع نظائرها من المثلث الاخر.

مثال 3)


في الشكل المجاور:

* الزاوية $\angle BAC \cong \angle B'A'C'$ (تنطبق على الزاوية $\angle B'A'C'$)

* الزاوية $\angle ACB \cong \angle A'C'B'$ (تنطبق على الزاوية $\angle A'C'B'$)

* الضلع $\overline{AC} \cong \overline{A'C'}$ (ينطبق على الضلع $\overline{A'C'}$)

أي أن: $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ (ض ز ض)




مثال 4)

في الشكل المجاور:

* جد قيمة X التي تجعل $\triangle GHJ \cong \triangle IHJ$.

* اذا كان قياس $\angle HIJ$ يساوي 87° فما قياس $\angle HGJ$ ؟

* اذا كان قياس $\angle IJH$ يساوي 30° فما قياس $\angle HJG$ ؟



* $3X-9 = 3$ (من خواص التطابق) تساوي الأضلاع المتناظرة

$3X = 3 + 9$ علاقة الجمع بالطرح

$3X = 12$ تبسيط

$X = 4$ الناتج

* $m \angle HGJ = m \angle HIJ$ (من خواص التطابق) تساوي الزوايا المتناظرة


افتن: $m \angle HGJ = 87^\circ$ بالتعويض

* $m \angle HJI = m \angle HJG$ (من خواص التطابق) تساوي الزوايا المتناظرة

افتن: $m \angle HJG = 30^\circ$ بالتعويض


الأسئلة : 1-3)
مشابه للأمتثلة 1-3)

1 لاحظ الشكل المجاور إذا كان $\Delta ABC \cong \Delta CDE$ أكمل الجدول:



العناصر المتطابقة	حالة التطابق
$m \angle 1 = m \angle 2$, $m \angle 3 = m \angle 4$ $AB = CD$	
$m \angle 1 = m \angle 2$, $AB = CD$ $AC = CE$	
$AB = CD$, $AC = CE$ $BC = DE$	


2 جذ قيمة X, Y, Z المؤشرة في الشكل المجاور علماً ان المثلثين متطابقان:



السؤال 4
مشابه للمثال 4

تدرب وحلّ التمرينات

3 لاحظ الشكل المجاور $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$, $\Delta ABC \cong \Delta CED$. أكمل الجدول



العناصر المتطابقة	حالة التطابق
	ضلعان وزاوية محددة بينهما
	زاويتان وضلعٌ محددٌ بينهما
	ثلاثة أضلاع

4 أنظر إلى المثلثين ΔABC , $\Delta A'B'C'$ في الشكل المجاور ثم اكتب بالرموز أسماء الزاويتين المتطابقتين والضلعين المتساويين ثم عبر عن التطابق بالصورة الرمزية وبين نوع التطابق .


تدريب وحل مسائل حياتية



بناءً: انظر الى الشكل المجاور للنافذتين .

5 كم مثلثا متطابقا تستطيع ان تحصي ؟

6 اي نوع من التطابق بين المثلثات الموجودة فيها ؟



تسليية: انظر الى المثلثين في الشكل المجاور


7 ما نوع التطابق بين المثلثين ؟

8 (حاول) عملياً (باستخدام نفس الاسلوب اظهر بقية حالات التطابق



9 **حديقة:** حديقة ازهار قسمت كما هو موضح بالشكل المجاور

اثبت ان : $\Delta ADC \cong \Delta BCD$




10 **هندسة:** من المثلثين المتطابقين المتجاورين جد قيمة X, Y.

فكر

11

تحذ: هل يتطابق المثلثان القائما الزاوية اللذان يتساوى طولاً وتر واحد الضلعين القائمين في



احدهما مع نظيريهما من المثلث الاخر؟ فسر اجابتك.

12


مسألة مفتوحة: وضح ما الفرق بين تطابق مثلثين وتشابه مثلثين ؟

13

حس عددي: اذا رسمنا قطر المستطيل تكون لدينا مثلثان ؟ هل المثلثان متطابقان ؟ لماذا ؟

14

أصح الخطأ: قالت تمارة أن المثلثين كما مبين في الشكل أدناه متطابقان.



بين خطأ تمارة وصححه.

أكتب

الحالات التي لا يتطابق بها المثلثين وأعط امثله توضيحيه لها مع الرسم .

خواصُّ المثلثات (متساوي الساقين، متساوي الاضلاع ، قائم الزاوية)
Properties of Triangles (Isosceles triangle, Equilateral triangle
and Right-angled triangle)

الدرس
] 5-3[



تَعَلَّم

- يمكن تصنيف المثلثات
تبعاً لأطوال أضلاعها الى :
- 1 - مثلث متساوي الساقين
 - 2 - مثلث متساوي الاضلاع
 - 3 - مثلث قائم الزاوية
- سنقوم بالتعرف على خواص كل منها بالتفصيل .


فكرة الدرس

- التعرف الى خواص المثلثات (متساوي الساقين، متساوي الاضلاع، قائم الزاوية)
- المفردات
- قاعدة المثلث
- زاوية الرأس
- ارتفاع المثلث

تعلمت سابقاً أنواع المثلثات حسب أطوال أضلاعها وبحسب قياس زواياها وفي هذا الدرس سنتعرف الى خواص مثلث متساوي الساقين ومتساوي الأضلاع ومثلث قائم الزاوية.

Properties of Isosceles Triangle

[5-3-1] خواصُّ المثلث المتساوي الساقين



المثلث المتساوي الساقين: هو مثلث فيه ضلعان متساويان ، يسمى الضلع الثالث المختلف بالطول عن الضلعين المتساويين بقاعدة المثلث كما تسمى النقطة المقابلة لقاعدة المثلث برأس المثلث .


خواصُّ المثلث المتساوي الساقين:

تتساوى قياس زاويتي القاعدة المقابلتين للضلعين المتساويين ، $m \angle B = m \angle C$ أيّ مثلث فيه زاويتان متساويتان يكون مثلث متساوي ساقين العمود النازل من رأس المثلث المتساوي الساقين على القاعدة ينصفها وينصف

زاوية الرأس \perp $AD \perp BC$
 $BD = DC$

مثال 1) في الشكل المجاور اذا كان قياس $\angle BAC = 36^\circ$ ، وكان المثلث ABC متساوي الساقين

جد قياس الزاوية ABC :



$m \angle ABC = m \angle ACB = X$

$m \angle A + m \angle B + m \angle C = 180^\circ$

$36^\circ + X + X = 180^\circ$

$36^\circ + 2X = 180^\circ$

$2X = 180^\circ - 36^\circ = 144^\circ$

$X = \frac{144}{2}$
 $m \angle ABC = 72^\circ$

مثلث متساوي الساقين $AB = AC$ ،

مجموع زوايا اي مثلث تساوي 180° ،

بالتعويض

بالتبسيط

علاقة الجمع بالطرح


قسمة طرفي المعادلة على 2

Properties of Equilateral Triangle

المثلث المتساوي الأضلاع: هو المثلث الذي تكون أضلاعه الثلاثة متساوية بالقياس، ويمكن تسميته أيضاً بالمثلث المنتظم.


خواص المثلث المتساوي الأضلاع:

- تكون جميع زواياه متساوية بالقياس وقياس كل منها يساوي 60° .
- أي مثلث تكون جميع زواياه متساوية بالقياس تتساوى قياسات جميع أضلاعه.



(مثال 2)

في الشكل المجاور مثلث متساوي الأضلاع محيطه 57cm . جد طول كل ضلع ثم جد قيمة X .



$$19 = \frac{57}{3} = \frac{\text{محيط المثلث متساوي الأضلاع}}{3} = \text{طول الضلع}$$

ولإيجاد قيمة X :

$$2x-1=19$$

أكتب معادلة السؤال

$$2x = 19 + 1$$

علاقة الجمع بالطرح

$$2x = 20$$

تبسيط


$$x = \frac{20}{2} = 10 \text{ cm}$$

قسمة طرفي المعادلة على 2

[3-3-5] خواص المثلث القائم الزاوية

Properties of Right-Angled Triangle

المثلث القائم الزاوية: هو المثلث الذي يكون فيه ضلعان متعامدان أي أن الزاوية بينهما قائمة وتساوي 90° . نسمي الضلع المقابل للزاوية القائمة بـ (الوتر) وهو أطول أضلاع المثلث ، كما نسمي الضلعين الآخرين بالضلعين القائمين .




خواص المثلث القائم الزاوية (مبرهنة فيثاغورس)

في أي مثلث قائم الزاوية يكون مجموع مربعي طول الضلعين القائمين مساوياً لمربع طول الوتر.

يمكننا التعبير عن هذه المبرهنة رياضياً كالآتي : $AC^2 = AB^2 + BC^2$

(مثال 3)



أستعمل الشكل المجاور، وجد طول BC

المثلث ABC متساوي الساقين $AD \perp BC$

المعطيات

$$AC^2 = AD^2 + DC^2$$

(مبرهنة فيثاغورس)

$$5^2 = 4^2 + X^2$$

بالتعويض

$$25 = 16 + X^2$$

بالتبسيط


$$X^2 = 25 - 16 \Rightarrow X^2 = 9 \Rightarrow X = 3 \text{ cm}$$

علاقة الجمع بالطرح ، الجذر التربيعي للطرفين


من المعطيات نجد أن طول الضلع BC يساوي 6cm (من خواص المثلث المتساوي الساقين)

تأكّد من فهمك

1 في المثلث المتساوي الساقين المجاور اذا علمت أن المحيط 19 cm . جد قيمة x . وطول كل ضلع وقياس الزاويتين الباقيتين .



2 المثلث ABC متساوي الاضلاع . \overline{AD} . \overline{BD} منصفان للزاويتين CAB و CBA جد قياس الزاوية ADB .




3 مثلث اطوال اضلاعه 6 cm , 10 cm , 8 cm . هل المثلث قائم الزاوية ؟
وضح ذلك مع الرسم .


(الأسئلة : 1 - 3)
(مشابه للأمثلة) 1-3

تدرب وحل التمرينات


4 في الشكل المجاور $m \angle CAB = m \angle CBA$ \overline{DE} توازي \overline{AB} . بين لماذا يكون المثلث CDE مثلثا متساوي الساقين ؟




5 في الشكل المجاور $\triangle XYZ$ قائم الزاوية في Z . رسم المستقيم AB ماراً بالرأس Z وموازيّاً للقاعدة \overline{XY} . اثبت أن المثلث XYZ متساوي الساقين .




تدرب وحل مسائل حياتية



6 **بناءً:** في الشكل التوضيحي المجاور، جد المسافة بالأمتار بين الطائرة والنقطة A .




7 جد قيمة X في الشكل المجاور اذا علمت أن طول السلم 13m .



8 في القارب الشراعي الموضح في الشكل المجاور استخراج ارتفاع الجزء الاخضر من الشراع ثم احسب مساحته .

فكّر



9 **تحذّر:** باستخدام الفرجال والمسطرة حاول ان ترسم مثلثا متساويا الاضلاع طول ضلعه 4cm . (انظر للصورة واستنتج الطريقة) .

10 **مسألة مفتوحة:** ما قياس كل زاوية في مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين ؟ وضح اجابتك بالرسم .


11 **حسّ عدديّ:** هل يوجد مثلث قائم الزاوية متساوي الاضلاع في ان واحد ؟ وضح بامثلة عديدة.

12 **أصح الخطأ:** يدعي أحمد أن المثلث الذي أطوال أضلعه 4cm , 3cm , 2cm يمثل أضلاع مثلث قائم الزاوية . أكتشف خطأ أحمد وصححه.

أكتب

ثلاثة مجموعات من الأعداد الصحيحة الموجبة التي تنطبق عليها الصيغة الرياضية لمبرهنة فيثاغورس.

تَعَلَّم



الشكل الهندسي المجاور ABCD يمثل متوازي

الأضلاع إذا :

$$1) \overline{AB} \parallel \overline{CD} , \overline{AD} \parallel \overline{BC}$$

$$2) AB = CD , AD = BC$$

ويسمى المستقيم الواصل بين كل رأسين متقابلين

بقطر متوازي الاضلاع $\overline{BD} , \overline{AC}$

فكّرة الدرس

- استعمال خصائص متوازي الاضلاع والمستطيل والمعيّن وشبه المنحرف في حل المسائل الهندسية
- المفردات
- متوازي الاضلاع
- المعين
- شبه المنحرف

Parallelogram

[5-4-1] متوازي الاضلاع

تعرفت سابقا الى متوازي الاضلاع بأنه شكل رباعي كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان . والان سوف نتعرف الى مبرهنات وخصائص متوازي الاضلاع وكيفية استعمالها في حل المسائل الهندسية .

نظريات خصائص متوازي الاضلاع:

* كل ضلعين متقابلين في متوازي الاضلاع يتطابقان $AD = BC , AB = DC$

* كل زاويتين متقابلتين في متوازي الاضلاع متساويتان بالقياس

$$m \angle A = m \angle C , m \angle B = m \angle D$$

* كل زاويتين متتاليتين في متوازي الاضلاع تتكاملان


$$m \angle A + m \angle D = 180^\circ , m \angle D + m \angle C = 180^\circ$$

$$m \angle C + m \angle B = 180^\circ , m \angle B + m \angle A = 180^\circ$$

* قطرا متوازي الاضلاع متناصفان $AE = EC , BE = ED$

* المثلثان DAB , DCB متطابقان . المثلثان ABC , ADC متطابقان

* المثلثان EBA , ECD متطابقان . المثلثان EBC , EAD متطابقان



مثال 1) أستعمل خصائص متوازي الاضلاع لايجاد قياسات زاوية C وزاوية D بالدرجات . وطول كل

من الضلع AB والضلع DC بالسنتمتر من الشكل المجاور .

$$m \angle C + m \angle D = 180^\circ \text{ زاويتان متكاملتان}$$

$$2x + 5^\circ + 4x - 35^\circ = 180^\circ \text{ بالتعويض بقيمة الزاوية}$$

$$6x - 30^\circ = 180^\circ \Rightarrow 6x = 210^\circ \Rightarrow x = 35^\circ$$


$$m \angle C = 75^\circ , m \angle D = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$$

$$8y - 16 = 5y + 2 \text{ ضلعان متقابلان متطابقان}$$

$$8y - 5y = 2 + 16 \Rightarrow y = 6 \text{ بحل المعادلة}$$

$$AB = 5 \times 6 + 2 = 32 \text{ cm}$$

$$DC = 8 \times 6 - 16 = 32 \text{ cm}$$



المَعْيَنُ : هو متوازي أضلاع فيه ضلعان متجاوران متساويان.

نظريات خصائص المَعْيَنُ:


* قطرا المَعْيَن متعامدين

* كل قطر ينصف الزاويتين عند طرفيه


مساحة المَعْيَن = طول الضلع × الارتفاع اي : $A = H \times L$

(أو) نصف حاصل ضرب طول قطريه .

المحيط = $4 \times$ طول الضلع اي : $P = 4 \times L$



(مثال 2) استعمل خصائص المَعْيَن لتجد طول الضلع BC ومحيط المَعْيَن .



i) $(AD = AB)$

$$5x - 17 = 3x + 7 \Rightarrow 5x - 3x = 17 + 7 \Rightarrow x = 12$$

$$BC = AD \Rightarrow 5 \times 12 - 17 = 43 \text{ cm}$$

ii) $(P = 4 \times L)$

$$P = 4 \times 43 = 172 \text{ cm}$$

Trapezoid

[5-4-3] شبه المنحرف

تعرفت سابقا الى شبه المنحرف وهو شكلٌ رباعيٌّ مختلف الأطوال فيه ضلعان متوازيان يسميان قاعدتي شبه المنحرف وآخرين غير متوازيين يسميان ساقي شبه المنحرف . إذا كان الضلعان غير المتوازيين متساويين سمي شبه منحرف متساوي الساقين، وإذا كانت إحدى زواياه قائمةً سمي شبه منحرف قائم الزاوية .

a القاعدة العليا



b القاعدة السفلى

شبه منحرف قائم الزاوية

a القاعدة العليا



b القاعدة السفلى

شبه منحرف متساوي الساقين

a القاعدة العليا



b القاعدة السفلى

شبه منحرف مختلف الساقين

محيط شبه المنحرف $P = a + b + c + d$

مساحة شبه المنحرف $A = \frac{1}{2} (a + b) \times h$


i) جد مساحة شبه المنحرف الذي طولاه ضلعين متوازيين فيه 8 cm , 12 cm وارتفاعه 4 cm

$$A = \frac{1}{2} (a + b) \times h = \frac{1}{2} (8 + 12) \times 4 = 40 \text{ cm}^2$$

ii) جد محيط شبه منحرف متساوي الساقين طول كل منهما 8 cm وطول قاعدته العليا 5 cm وطول قاعدته السفلى 10 cm .


$$P = a + b + c + d = 5 + 10 + 8 + 8 = 31 \text{ cm}$$

تأكّد من فهمك



1 استعمل خصائص متوازي الاضلاع للشكل المجاور لتجد كل من :
 \overline{CD} , $m\angle A$, $m\angle D$

2 أوجد محيط متوازي الأضلاع إذا علمت أن طول احد أضلاعه 8cm وطول ضلعه المجاور ثلاثة أمثاله.



3 الشكل المجاور ABCD متوازي اضلاع فيه

أثبت أن $m\angle BCE + m\angle ADE = 90^\circ$. الشكل يمثل المعين .

4 معيّن مساحته 300cm^2 وارتفاعه 15cm فما طول ضلعه ؟

5 معيّن محيطه 36cm فما طول ضلعه ؟

6 شبه منحرف طول القاعدتين المتوازيتين العليا والسفلى على التوالي

9cm, 7cm وارتفاعه 3cm فما مساحته ؟

(الأسئلة : 1-5)

مشابه للمثال 2


(الأسئلة : 6-7)

مشابه للمثال 3

7 شبه منحرف متساوي الساقين مساحته 90cm^2 وارتفاعه 5cm جد طول كل

من قاعدتيه إذا علمت ان طول قاعدته العليا نصف طول قاعدته السفلى .

تدرب وحلّ التمرينات



8 الشكل المجاور فيه $AB = BC$ و \overline{AC} منصف الزاويتين A , C


برهن أن الشكل ABCD يمثل متوازي أضلاع .

9 الشكل المجاور ABCD مربع . AFB مثلث قائم الزاوية في F

ومتساوي الساقين . برهن أن :

i) AFBE يمثل مربعاً . ii) \overline{FE} ينصف \overline{DC} .

iii) AFED يمثل متوازي أضلاع .



10 ABCD يمثل معيّنأ . النقاط E, F, G, H منتصفات أضلاعه .


برهن أن الشكل EFGH يمثل مستطيلاً .

11 معيّن طول قطريه المتعامدين 10cm , 8cm فما مساحته ؟


12 شبه منحرف طول القاعدتين المتوازيين العليا والسفلى 16cm , 20cm ومساحته 180cm^2

فما ارتفاعه ؟

تدرب وحل مسائل حياتية



- 13 **ظرف بريدي:** في الشكل المجاور ظرف بريدي ، اذا علمت ان عرض الظرف نصف طوله فما مساحة وجهه؟



- 14 **أثاث منزلي:** سطح اللوح الخشبي المستخدم في المنضدة بشكل شبه منحرف متساوي الساقين احسب محيطه .



- 15 **حديقة:** قطعة أرض زراعية مستطيلة الشكل ، شجرت لجعلها حديقة عامة. اريد أحاطتها بسياج. فاذا كانت ابعادها 40m ، 80m فما طول السياج اللازم استعماله لاحاطتها ؟

فكر

- 16 **تحذ:** شبه منحرف يبلغ طول قاعدته الصغرى 3cm مقسم على ثلاث اشكال مثلثين ومستطيل يبلغ ارتفاع شبه المنحرف 4cm وطول الضلع القائم للمثلث الاول 2cm وطول الضلع القائم للمثلث الثاني 1cm فاحسب مساحة شبه المنحرف . بطريقتين.

- 17 **مسألة مفتوحة:** هل يمكن اعتبار كل مستطيل متوازي اضلاع ولا يمكن اعتبار كل متوازي اضلاع مستطيلاً؟

- 18 **حسب عددي:** ما الفرق بين المعين والمربع ؟ أرسم وأشر إلى الاجزاء المختلفة .


أكتب

خواص شبه المنحرف المختلف الساقين وشبه المنحرف متساوي الساقين .

الاسطوانة والكرة) الخصائص ، المساحة السطحية ، الحجم)
Cylinder and Sphere)Properties, Surface Area and Volume(

تعلّم

لدينا مستطيل ابعاده 3cm ، 5 cm ثبت على سلك معدني عمودي ودوّّر كما مبين في الشكل المجاور باستخدام محرك نلاحظ تولد الشكل الذي نسميه بالاسطوانة الدائرية القائمة لاحظ ان نصف قطر قاعدة الاسطوانة المتولدة وارتفاعها هما قيمة ابعاد المستطيل .



خذ علبة مرطبات اسطوانية وتخلص من القاعدتين ثم قصها عمودياً .
وأفرد القطعة المعدنية ستلاحظ انها تمثل شكل مستطيل .

فكرة الدرس

- التعرف الى خصائص كل من الاسطوانة والكرة
- وكيفية ايجاد المساحة السطحية والحجم لكل منهما


المفردات

- نصف القطر، الارتفاع
- المساحة الجانبية
- المساحة الكلية
- الحجم

Cylinder

[5-5-1] الاسطوانة:

هي مجسم له قاعدتان دائريتان متوازيتان ومتطابقتان ومحاط بسطح جانبي أسطواني. ويسمى المستقيم المارّ بمركز القاعدتين محور الأسطوانة ويسمى المستقيم المماس للقاعدتين والموازي لمحور الأسطوانة مولد الأسطوانة. مولدات الأسطوانة الواحدة متساوية فيما بينها بالطول. أما العمود المحدد بين قاعدتي الأسطوانة فانه يسمى ارتفاع الأسطوانة ويرمز له بالرمز h . إذا كان مولد الأسطوانة عمودياً على قاعدتها سميت الأسطوانة (اسطوانة قائمة) ويكون ارتفاعها مساوياً لمولدها، وإذا كان مولد الأسطوانة مائلاً على قاعدتها سميت (أسطوانة مائلة).



حجم الأسطوانة الدائرية القائمة: $V = \pi r^2 h$


المساحة الجانبية: $LA = 2\pi r h$

المساحة الكلية تساوي مجموع المساحة الجانبية مع مساحة القاعدتين اي:

$$TA = 2\pi r h + 2\pi r^2$$

مثال 1) أسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطر قاعدتها 7 cm وارتفاعها 12 cm أحسب مساحتها

الجانبية ثم احسب ، مساحتها الكلية و حجمها .




i) المساحة الجانبية $LA = 2\pi r h = 2 \times 7 \times \frac{22}{7} \times 12 = 528 \text{ cm}^2$

ii) المساحة الكلية $TA = 2\pi r h + 2\pi r^2 = 528 + 2 \times \frac{22}{7} \times 7^2$

$$= 528 + 308 = 836 \text{ cm}^2$$

iii) الحجم $V = \pi r^2 h = \frac{22}{7} \times 7^2 \times 12 = 1848 \text{ cm}^3$

الكرة : مجسمٌ يمثل مجموعة كل النقاط في الفراغ (الفضاء) ثلاثي الأبعاد من خصائصه إن كل نقطة من نقاط سطحه تبعد بأبعاد متساوية عن نقطة معينة ثابتة في داخله تسمى مركز الكرة. وكل مستقيم يمر بمركز الكرة وينتهي طرفاه بسطحها يسمى قطر الكرة. أما نصف قطر الكرة فهو الخطّ الواصل بين مركز الكرة وأي نقطة من نقاط سطحها. حجم الكرة: $V = \frac{4\pi}{3} r^3$



المساحة السطحية : $SA = 4\pi r^2$

(مثال 2)

جد المساحة السطحية والحجم للكرة التي نصف قطرها 7 cm .



i) المساحة السطحية $SA = 4 \pi r^2 = 4 \times \frac{22}{7} \times 7^2 = 616 \text{ cm}^2$

ii) الحجم $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

$V = \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 7^3 = \frac{4312}{3} \approx 1437 \text{ cm}^3$

(مثال 3)

حصالة النقود: صنع نموذج مصغر لحصالة نقود على شكل اسطوانة نصف قطرها 10 cm وارتفاعها 30 cm تعلوها نصف كرة احسب الحجم والمساحة السطحية لها .


حجم حصالة النقود = حجم الاسطوانة + حجم نصف كرة

$$V = \pi r^2 h + \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) = \pi (10)^2 (30) + \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \pi 10^3 \right)$$

$$V = 3000 \times 3.14 + \frac{2000}{3} \times 3.14 \approx 9420 + 2093.3$$

$$V = 11513.3 \text{ cm}^3$$

المساحة الكلية = المساحة الجانبية للأسطوانة + مساحة قاعدة واحدة + نصف المساحة السطحية للكرة



$$TA = 2\pi r h + \pi r^2 + \frac{1}{2} (4\pi r^2)$$

$$TA = 2(3.14)(10)(30) + 3.14(10)^2 + 2(3.14)(10)^2$$

$$TA = 1884 + 314 + 628 = 2826 \text{ cm}^2$$

تأكّد من فهمك

- 1 أنبوب اسطوانيّ دائريّ قائم مجوف طوله 21m ونصف قطره الداخلي 9m فما حجمه؟
- 2 جد المساحة السطحية والحجم للكرة التي نصف قطرها 10m.
- 3 صنّع خزان للوقود على شكل اسطوانة نصف قطر قاعدتها 3m وارتفاعها 9m تعلوها نصف كرة احسب الحجم والمساحة السطحية للخزان .
- 4 مستودع وقود كروي الشكل مساحته السطحية $576\pi \text{ m}^2$. جد حجمه .
- 5 إناء على شكل نصف كرة مساحته السطحية $128\pi \text{ cm}^2$. جد حجمه
- 6 دورق اسطوانيّ الشكل حجمه $128\pi \text{ cm}^3$ وارتفاعه 8cm جد مساحته الجانبية .
- 7 إذا كانت نسبة حجم كرة نصف قطرها r_1 الى حجم كرة ثانية نصف قطرها r_2 تساوي $\frac{8}{125}$ جد نسبة المساحة السطحية للكرة الاولى الى المساحة السطحية للكرة الثانية .

(الأسئلة : 1 - 7)
مشابه للأمثلة 1-3)

تدرب وحلّ التمرينات

- 8 كرة من الرصاص نصف قطرها 6cm صهرت وصنع منها كرات صغيرة متماثلة لالعب الاطفال نصف قطر كل منها 1cm احسب عدد الكرات الصغيرة المتولدة من ذلك .
- 9 كرة خشبية حجمها $2304\pi \text{ cm}^3$ وضعت في الماء فكان الجزء الطافي نصفها ، جد نصف قطر دائرة تقاطع سطح الماء مع سطح الكرة.
- 10 إذا علمت أنّ المساحة السطحية لكرة تساوي 1256cm^2 فما طول نصف قطر الكرة؟
- 11 كرتان النسبة بين حجميهما كنسبة 8:27 جد النسبة بين مساحتي سطحيهما.
- 12 جد نصف قطر الكرة التي مساحتها السطحية تساوي $100\pi \text{ cm}^2$ ومن ثم جد حجمها.
- 13 قطعة ورق على شكل مستطيل طوله 33cm وعرضه 14cm طويت قاعدته بحيث يكون سطح الورقة على هيئة سطح أسطوانى دائري قائم جد حجم الأسطوانة الناشئة لاقرب عدد صحيح.

تدرب وحل مسائل حياتية



- 14 **سائل:** جد سعة الكوب المجاور اذا علمت أن قطر القاعدة 7cm وارتفاعه 10cm .



- 15 **صناعة:** احسب مقدار ما تتسع له العلب الاسطوانية الأربعة المتماثلة الحجم اذا علمت ان نصف قطر قاعدتها 3.5cm، وارتفاعها 10cm. ثم جد المساحة اللازمة من اللوح المعدني المستخدم لصناعتها كلها.



- 16 **هندسة:** من المباني الشهيرة في العالم بناية تعرف باسم قبة مونتريال في كندا وهي كرة مستديرة من الزجاج الشفاف قطرها 76 m احسب مساحتها السطحية وحجمها .

فكر

- 17 **تحذ:** كرة بلاستيكية نصف قطرها 14.7cm طليت بطلاء بسماك 0.3cm احسب حجم الكرة بعد الطلاء.

- 18 **مسألة مفتوحة:** ما ارتفاع اسطوانة دائرية قائمة تكفي مساحتها الجانبية لصنع كرة لها نصف قطر الاسطوانة نفسه ؟

- 19 **حسب عددي:** كأس بشكل نصف كرة نصف قطرها r ووعاء اسطواني الشكل نصف قطره r وارتفاعه r أي منهما يتسع لأكثر كمية من الماء ؟

- 20 **أصح الخطأ:** كتبت ساره قانون حجم الكرة بالشكل $\frac{3}{4} \pi r^3$. (اكتشف خطأ ساره وصححه .

اكتب

مثالاً لأسطوانتين قائمتين متساويتين بالحجم ومختلفتين بالمساحة الكلية .

مساحة الاشكال المركبة المنتظمة وغير المنتظمة

Area of Regular and Irregular compound shapes

تَعْلَم

نريدُ حساب مساحة الممر المحيط بالمسبح الموضح بالصورة المجاورة لذا نتبع الخطوات الآتية:



نحدد الشكلين المستويين البسيطين اللذين يتكون منهما هذا الشكل المركب وهما مستطيلين:

- نجد مساحة المستطيل الخارجي
- نجد مساحة المستطيل الداخلي
- نجد مساحة الممر عن طريق طرح

مساحة المستطيل الداخلي من مساحة المستطيل الخارجي

فكرة الدريس

• إيجاد مساحة الأشكال

المستوية المركبة

المنتظمة وغير المنتظمة.

المفردات

• شكلٌ مستوي بسيط

• شكلٌ مستوي مركب


[5-6-1] مساحة الأشكال المستوية المركبة المنتظمة

Area of Regular compound Plane shapes

المستوي المركب المنتظم: يتكون الشكل المستوي المركب المنتظم من شكلين مستويين بسيطين أو أكثر. - لإيجاد مساحته نقسم الشكل المستوي المركب المنتظم إلى أشكالٍ مستوية بسيطةٍ .

مثال (1)

حاول إيجاد مساحة الممر في الشكل المركب في فقرة تعلم.



الشكلان المستويان البسيطان اللذان يتكون منهما الشكل المركب هما مستطيلان.

جد مساحة المستطيل الخارجي : $A_1 = L \cdot W = 4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$


جد مساحة المستطيل الداخلي : $A_2 = L \cdot W = 3 \times 1 = 3 \text{ m}^2$

مساحة الممر تساوي حاصل طرح مساحة المستطيل الداخلي من

مساحة المستطيل الخارجي أي : $A = A_1 - A_2 = 8 - 3 = 5 \text{ m}^2$

مثال (2)

لحساب مساحة الشكل المركب المنتظم المجاور:




الشكل المركب المنتظم يحتوي على الشكلين المستويين البسيطين اللذين

هما شبه المنحرف والمستطيل:

مساحة شبه المنحرف : $A_1 = \frac{1}{2} (a+b) \times h = \frac{1}{2} (3+7) \times 2 = 10 \text{ cm}^2$

مساحة المستطيل : $A_2 = L \cdot W = 6 \times 5 = 30 \text{ cm}^2$


مساحة الشكل المركب : $A = A_1 + A_2 = 10 + 30 = 40 \text{ cm}^2$



Area of Irregular compound Plane shapes

المستوي المركب غير المنتظم : يتكون الشكل المستوي المركب غير المنتظم من شكلين مستويين بسيطين غير منتظمين أو أكثر.
 لإيجاد مساحته نقسم الشكل المستوي المركب غير المنتظم الى اشكال مستوية منتظمة بسيطة قريبة من شكله نحسب قيمة مساحات الاشكال المستوية البسيطة ونجمع نتائجها ونحسب بوصفها قيمة تقريبية للشكل المستوي المركب غير المنتظم.

(مثال 3) في الشكل المجاور نموذج لعملة احدي الدول وهي مصممة على شكل مستوي غير منتظم ولحساب قيمة تقريبية لمساحة سطح العملة رسمنا مثلث متساوي الساقين تمسُّ اضلاعه منحني العملة وثبتنا قياسات الاضلاع وارتفاع المثلث كما موضح بالشكل .



$$A = \frac{1}{2} \times b \times h = \frac{1}{2} \times 10 \times 12 = 60 \text{ cm}^2$$

نحسب مساحة المثلث :

ونظراً لكون مساحة سطح العملة اقل من مساحة سطح المثلث نقرب الناتج ونقول ان مساحة سطح العملة يساوي تقريباً أقل من 60 cm^2

(مثال 4) لحساب مساحة الشكل المظلل المجاور :

نقسم الشكل الى الشكلين المستويين البسيطين اللذين يتكون منهما الشكل المركب هما مستطيل ونصف دائرة (يمكن عددهما دائرة واحدة) .



$$A_1 = L \cdot W = 12 \times 4 = 48 \text{ m}^2$$

مساحة المستطيل :

$$A_2 = \pi \times r^2 = 3.14 \times 2^2 = 12.56 \text{ m}^2$$

مساحة نصف الدائرة = مساحة دائرة :


مساحة الشكل المظلل تساوي حاصل طرح مساحة الدائرة من مساحة المستطيل 12m



$$A = A_1 - A_2 = 48 - 12.56 = 35.44 \text{ m}^2$$

(مثال 5) جد مساحة سطح الشكل المستوي المركب المبين في ادناه .

يتكون الشكل المركب من مربعين متماثلين ودائرتين متماثلتين (اربعة انصاف دائرة متماثلة)



$$A_1 = L^2 = 1^2 = 1 \text{ m}^2$$

مساحة المربع :

$$A_2 = \pi \times r^2 = 3.14 \times (0.5)^2 = 0.785 \text{ m}^2$$


مساحة الدائرة :

مساحة الشكل المظلل تساوي


$$A = 2A_1 + 2A_2 = 2 \times 1 + 2 \times 0.785 = 3.57 \text{ m}^2$$

تأكّد من فهمك


جد مساحة السطح المظلل لكل من الأشكال المستوية المركبة الآتية :




3



2




1



5

(الأسئلة : 1 - 5)
مشابه للأمثلة (1-5)




4

تدرب وحلّ التمرينات


6 جد مساحة سطح الظرف البريدي المفتوح من جهة واحدة

والمبين في الشكل المجاور.




7 جد مساحة السطح المظلل

8 جد تقريبا مناسباً لمساحة سطح المفتاح في الشكل المجاور.



تدريب وحل مسائل حياتية


9 ادناه صورة لمسبح مع مخطط لشكل سطحه المستوي المركب . احسب مساحة سطح المسبح.




10 في الشكل المجاور خريطة إحدى الدول وهي بلا شك تمثل شكلاً مستويًا مركبًا غير منتظم. ولغرض تقدير المساحة على الخريطة رسم شكلان مستويان بسيطان هما شبه المنحرف والمثلث للاحاطة بحدود الخريطة. مستخدمًا الأبعاد المثبتة على الشكل جد تقريبًا مناسبًا للمساحة على الخريطة.

فكر


11 **تحذّر:** بالشكل المجاور بركة محاطة بممر من البلاط عرضه 2m. احسب مساحة الممر.



12 **مسألة مفتوحة:** الشكل يوضح طريقتان مختلفتان لإيجاد مساحة مضلع منتظم ذي ثمانية أضلاع. اشرح مضمون الطريقتين ثم ابحث عن طريقةٍ ثالثةٍ.



13 **حسّ عدديّ:** هل يمكن حساب مساحة دائرة بشكل تقريبي عن طريق رسم مستطيلات متجاورة داخلها ماذا يحدث عندما تجعل عدد المستطيلات المرسومة كبيرًا جدًا؟




صيغة رياضية لحساب مساحة شكل مستوي مركب مؤلف من k من المعينات مرسومة متجاورة مع بعضها والتي طول كل من قطريها m, n من الوحدات .

اكتب

Chapter Test

1 ABC مثلث متساوي الاضلاع . رسمنا المستقيم CE على امتداد الضلع BC. جد : $m \angle ACE$



2 في الشكل المجاور $AB=BC$, $DE \parallel BC$. اثبت ان المثلث ADE متساوي الساقين .

3 اعط مثالا مع الرسم تبين فيه عدم امكانية تطابق مثلثين تتساوى فيهما قياسات الزوايا المتناظرة .

اكمل الفراغات الاتية لتكون العبارة صائبة :

4 تكون الزاويتان متطابقتان اذا كان

5 عناصر المثلث الستة هي و

6 تتطابق المضلعات اذا امكن وضع احدهما على الاخر بحيث

7 حالات تطابق مثلثين هي و و

8 شبه منحرف متساوي الساقين مساحته 180cm^2 وارتفاعه 10cm جد طول كل من قاعدتيه اذا علمت

ان طول قاعدته العليا اربعة امثال طول قاعدته السفلى .


9 جد محيط ومساحة معين طول ضلعه 4cm وارتفاعه 6cm .

10 معين طول قطريه المتعامدين 2.5cm , 4cm فما مساحته ؟

11 صنع مصباح منضدي على شكل اسطوانة نصف قطر قاعدتها 8cm وارتفاعها 12cm تعلوها نصف

كرة احسب الحجم والمساحة السطحية له.

12 جد مساحة الشكل المركب الاتي :



Coordinate Geometry الهندسة الإحداثية

الدرس 6-1 تمثيل جدول دالة محددة في المستوى الاحداثي

الدرس 6-2 مقدمة في الدوال

الدرس 6-3 الدوال الخطية

الدرس 6-4 الانعكاس والدوران في المستوى الاحداثي

الدرس 6-5 الانسحاب في المستوى الاحداثي

الدرسة المستنصرية: طرازٌ معماريٌّ رائعٌ وقطعةٌ معماريةٌ هندسيةٌ احداثيةٌ فجدران الطبقة العليا من المدرسة مزخرفةٌ من الخارج بزخارف ذات اشكالٍ هندسيةٍ احداثيةٍ متماثلةٍ وغير متماثلةٍ وهي أقدم جامعات العالم من حيث العلم.

اكتب عبارة جبرية تمثل:

- 1 أقل من y بخمسة عشر.
- 2 أكثر من N بثلاثة عشر.
- 3 $T-3$ مقسوم على $T+3$
- 4 7^2 مضروب في $L-9$.
- 5 ضعف $9-w$ مضروب في 5 .
- 6 نصف $w+9$ مضروب في y .
- 7 ربع $T+5$ مقسوم على T .
- 8 الجذر التكعيبي ل $L-3T$ مضروب في $2+w$.
- 9 إذا كانت قاعدة الدالة $2w-w^2$ والمدخلات $\{-1, 0, 1\}$ اكتب المخرجات للدالة .
- 10 اكتب قاعدة الدالة للمدخلات والمخرجات الآتية:

المخرجات	قاعدة الدالة	المدخلات
1		1
4		2
9		3
1		-1
4		-2

المخرجات	قاعدة الدالة	المدخلات
0		-2
2		0
4		2


- 11 قاعدة الدالة $|y|+2y$ أنشئ جدولاً بيّن فيه المخرجات إذ المدخلات $\{-1, 0, 1\}$.
 - 12 أنشئ جدولاً وبيّن فيه المدخلات حيث المخرجات $\{3, 2, 1\}$ وقاعدة الدالة $X-2$
- مثل الأزواج المرتبة في المستوي الإحداثي وارسم قطعاً مستقيمةً لتصل بين النقاط في كل ربع. اذكر اسم الشكل الذي حصلت عليه:

- 13 A)0,2(, B)0,-2(, C)3,-2(, D)3,2(
- 14 A)-1,3(, B)-1,-3(, C)-3,0(
- 15 A)-1,1(, B)0,2(, C)3,2(, D)3,1(
- 16 وضح كيف يختلف موقع النقطة $(-3,3)$ عن موقع النقطة $(3,-3)$.

تمثيل جدول دالة محددة في المستوي الاحداثي

Representing Function`s Table in Coordinate Plane

تَعَلَّم



أراد عليّ ان يقيس درجة حرارة الماء في اثناء
بالدرجة المئوية ففي الساعة الاولى وجد ان
درجة حرارة الماء 3°C وفي الساعة الثانية
كانت درجة حرارة الماء 3°C فجذ درجة حرارة
الماء بدرجة مئوية بعد سبع ساعات.

فكّرة الدرس

- تمثيل جدول دالة محددة في المستوي الاحداثي.
- المفردات المدخلة.
- المخرجة.
- جدول دالة.
- المستوي الاحداثي.
- الارباع الاربعة.

[6-1-1] تمثيل جدول في المستوي الاحداثي

Representation a Table In Coordinate Plane


- * العلاقة التي مدخلاتها متغيرة ومخرجاتها ثابتة تمثل دالة مستقيم يوازي محور السينات.
- * العلاقة التي مدخلاتها ثابتة ومخرجاتها متغيرة تمثل مستقيماً يوازي محور الصادات.
- * العلاقة التي مدخلاتها ومخرجاتها متغيرة تمثل مستقيماً لا يوازي أي المحورين.

مثال 1) جد درجة حرارة الماء بعد سبع ساعات.

خطوة 1) : نفرض ان عدد الساعات X نفرض ان درجة حرارة الماء في كل ساعة مساوية لـ Y فنحصل على الجدول الآتي:

X	1	2	3	4	5	6	7
Y	3	3	3	3	3	3	3

خطوة 2) : نستعمل الجدول لايجاد الأزواج المرتبة $(1,3)$, $(2,3)$, $(3,3)$, $(4,3)$, $(5,3)$, $(6,3)$, $(7,3)$



خطوة 3) : نعين النقط في المستوي الاحداثي، ثم نصل بين النقط فنحصل على مستقيم موازي لمحور السينات .


(قيم X متغيرة ، قيم y ثابتة)

مثال 2)

مثل الجدول التالي في المستوي الاحداثي.

X	2	2	2	2
Y	2	4	6	8

من الجدول نلاحظ ان قيم X ثابتة ومنه نكون أزواجاً مرتبة (2,2) ، (2,4) ، (2,6) ، (2,8) نمثل النقاط ثم نصل بين النقاط نلاحظ أن المستقيم موازي لمحور الصادات،
(قيم X ثابتة ، قيم Y متغيرة).



مثال 3)

الجدول التالي يبين الكمية التي ينتجها حقل

الرميلة على مدى اربعة ايام . أمثل كتابة الجدول على شكل


مجموعة من الأزواج المرتبة { (1,1) ، (2,2) ، (3,3) ، (4,4) }

ثم نُحدد كل نقطة في المستوي الاحداثي نصل بين النقاط

نلاحظ أن المستقيم لا يوازي أي من المحورين

(قيم X متغيرة ، قيم Y متغيرة) .

عدد الأيام	X	1	2	3	4
كمية النفط	Y	1	2	3	4



[2-1-6] كتابة جدول من نقاط معينة في المستوي الاحداثي

Written Table of Bounded Points in Coordinate Plane


مثال 4) اكتب جدول الدالة من نقاط معينة في المستوي الاحداثي

من الشكل المجاور نحدد الأزواج المرتبة لكل نقطة

(A) (-2,5) ، (B) (-1,3) ، (C) (1,-1) ، (D) (2,-3) ، (E) (4,-7)

نكون جدول الدالة:

النقاط	A	B	C	D	E
X	-2	-1	1	2	4
Y	5	3	-1	-3	-7



تأكّد من فهمك

مثل الجداول التالية في المستوى الاحداثي، ثم صل بين النقاط في المستوى

الاسئلة 1-4

مشابه للأمثلة 1-3

الاحداثي، ماذا تلاحظ، ما الشكل الناتج.

X	4	4	4	4
Y	1	2	3	4

2

X	2	1	1	1
Y	1	2	3	4


1

X	-1	-2	-3	-4
Y	2	4	6	8

4

X	1	2	3	4
Y	-2	-2	-2	-2

3



5 اكمل الجدول من النقاط المعينة في المستوى الاحداثي:

السؤال 5

مشابه للمثال 4

النقاط	A	B	C	D
X				
Y				

تدرب وحلّ التمرينات

مثل الجداول التالي في المستوى الاحداثي، ثم صل بين النقاط، ما علاقة المستقيم بالمحور السيني


X	-1	0	1	2
Y	3	3	3	3

7


X	-5	-4	3	2
Y	2	1	0	-1

6

اكتب جدول دالة من نقاط معينة في المستوى الاحداثي، وبين نوع الشكل الناتج.



9



8

تدرب وحل مسائل حياتية

10

علوم الأرض: سجل باحث علمي في القطب الجنوبي أربع قراءات لدرجة الحرارة وكانت قراءة

المحرار كل أربع ساعات



الوقت	9 صباحاً	1 ظهراً	5 عصرًا	9 مساءً
درجة الحرارة	-3	-7	-11	-15

أكتب الدالة التي يمثلها الجدول اعلاه واكتب جدول الدالة .

10

تصميم الكتروني: صممت علا صفحة الكترونية رسمت فيها مستطيلات متماثلة في جدول الدالة

التالية معطيات عن طول وعرض كل مستطيل رسمته علا، (X تمثل الطول، Y تمثل العرض)



X	2	4	6	8
Y	3	6	9	12

i) مثل جدول الدالة في اعلاه في المستوي الاحداثي.

ii) كيف تستعمل هذا الجدول لا يجاد طول مستطيل بعد معرفة ان

عرض المستطيل هو 15 وحدة؟

فكر

12 **جدول:** اكتب جدول دالة يمثل المسافة التي يقطعها سائق دراجة هوائية خلال 4 ساعات علماً انه يقطع

في الساعة الواحدة 15km.

13 اكتب مجموعة بيانات تمثل مستقيماً عمودياً.

14 **تحذ:** كيف يمكن من خلال جدول دالة محددة ان احصل على مستقيم موازي لمحور السينات؟

15 **حس عددي:** يطبع علا في الساعة الواحدة 50 كلمة على الطابعة فاذا كان عدد الكلمات في الصفحة


التي يريد طبعتها 400 كلمة فالى كم ساعة يحتاج؟

اكتب

مسألة ابتكر فيها جدول دالة محددة بنقاط معينة تمثل عدد الأيام التي يقضيها عامل لحفر بئر خلال خمسة ايام.

Introduction of Functions

تَعَلَّم



في مرسوم المدرسة رسم أيمن ووائل وثامر
أشكالاً هندسية. رسم أيمن مربع و مثلثاً
ورسم وائل مثلثاً ورسم ثامر دائرة.
جد العلاقة بين كل طالب والشكل الهندسي
الذي رسمه.

فِكْرَةُ الدريس

- اكمال جدول الدالة وتمثيله في المستوي الإحداثي.
- المفردات الدالة
- جدول الدالة
- قاعدة الدالة
- العنصر
- الصورة


Relation and Function

[6- 2- 1] العلاقة و الدالة

*الدالة: هي علاقة تحدد قيمة مخرجة واحدة فقط لكل قيمة مدخلة.

*قاعدة الدالة: هي الصيغة التي تستعمل لتعويض قيمة مدخلة للحصول على قيمة المخرجة.

مثال (1)




أرسم مخطط العلاقة بين كل طالب والشكل الهندسي الذي رسمه .

نلاحظ أن أيمن رسم شكلين هندسيين (مربع ، مثلث). أي له مخرجان لمدخلة

واحدة لذلك فالعلاقة لا تمثل دالة.

مثال (2)




حدد فيما إذا كانت العلاقة تمثل دالة أم لا؟ وفسّر ذلك.

{1,2(,)3,4(,)5,6(,)7,8(,)9,10(}

امثل العلاقة بالمخطط المجاور:

نلاحظ أن كل مدخلة لها مخرجة واحدة فقط لذلك فأن العلاقة تمثل دالة

مثال (3)



لاحظ المخطط المجاور وبين أتمثل العلاقة دالة أم لا ؟ أفسر ذلك.

نلاحظ بأن العلاقة ليست دالة إلا إذا كانت لكل قيمة مدخلة هناك مخرجة واحدة فقط

فالعدد 9 لم يرتبط بأي قيمة من قيم المخرجات .

مثال (4)

حدد فيما إذا كانت كل علاقة فيما يلي دالة أم لا؟ وفسّر ذلك .

i) { 1,9(,)2,18(,)3,15(,)4,18(} . نلاحظ أن العلاقة دالة لأن هناك مخرجة واحدة فقط لكل مدخلة

ii) { 2,8(,)1,6(,)0,6(,)1,5(} . نلاحظ أنها علاقة وليست دالة لأن هناك مخرجين 5.6 للمدخلة 1 -

جدول الدالة: هو الجدول الذي ينظم قيمة المدخلة والمخرجة.

مثال (5)

العنصر (المدخلة)	قاعدة الدالة	الصورة (المخرجة)
X	X-3	Y
-1	-1-3	-4
0	0-3	-3
1	1-3	-2
2	2-3	-1

أكمل جدول الدالة $Y = X - 3$ إذ إن $X = -1, 0, 1, 2$
 نكمل جدول الدالة بالتعويض عن قيم X في قاعدة الدالة لنجد
 قيم Y المناظرة وكما يلاحظ في الجدول المجاور.

[6-2-3] تمثيل الدالة بعدد من النقاط في المستوى الإحداثي


Representing the Function by Number of Point in Coordinate

مثال (6)

مثل في المستوى الإحداثي الدالة $Y = 3X - 1$ ، إذ إن $X = -1, -2, 0, 1$

الخطوة (1): نعمل الجدول ادناه ، الخطوة (2): نثبت النقاط في المستوى الإحداثي


الخطوة (3): نصل بين النقاط في المستوى الإحداثي سنحصل على مستقيم كما مبين في الشكل ادناه.



العنصر (المدخلة)	قاعدة الدالة	الصورة (المخرجة)	الزوج المرتب
X	$3X - 1$	Y	(X, Y)
-1	$3(-1) - 1$	-4	$(-1, -4)$
-2	$3(-2) - 1$	-7	$(-2, -7)$
0	$3(0) - 1$	-1	$(0, -1)$
1	$3(1) - 1$	2	$(1, 2)$

مثال (7)

أكمل الجدول وامثله في المستوى الإحداثي.






العنصر (المدخلة)	قاعدة الدالة	الصورة (المخرجة)	الزوج المرتب
X	$X + 2$	Y	(X, Y)
1	$1 + 2$	3	$(1, 3)$
2	$2 + 2$	4	$(2, 4)$
3	$3 + 2$	5	$(3, 5)$
4	$4 + 2$	6	$(4, 6)$

تأكد من فهمك

حدد فيما إذا كانت العلاقة دالة أم لا؟ ذكراً السبب.

الاسئلة 1-3 مشابه للأئلة 1-3



إذا كانت مجموعة المدخلات هي $\{3, 5, 6, 7\}$ ومجموعة المخرجات هي $\{\sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{5}, \sqrt{3}\}$ حدد فيما إذا كانت العلاقات التالية دالة أم لا؟ مع ذكر السبب.

4 $\{3, \sqrt{3}(\cdot), 5, \sqrt{5}(\cdot), 6, \sqrt{6}(\cdot), 7, \sqrt{7}(\cdot)\}$

5 $\{3, \sqrt{3}(\cdot), 5, \sqrt{7}(\cdot), 3, \sqrt{6}(\cdot), 6, \sqrt{6}(\cdot), 7, \sqrt{6}(\cdot)\}$

الاسئلة 4-5

مشابه للمثال 4

العنصر (المدخلة)	قاعدة الدالة	الصورة (المخرجة)	الزوج المرتب
X		Y	(X, Y)
1		600	(1, 600)
2			
3			
4			




6 يأكل الخفاش 600 بعوضة بالساعة، كم عدد البعوض التي أكلها الخفاش في 2.3.4 ساعة؟ أنشئ جدول دالة يبين العلاقة بين عدد الساعات وعدد البعوض التي يأكلها الخفاش، ثم مثل الجدول في المستوى الاحداثي.

السؤال 6

مشابه للمثالين 6.7

حدد فيما إذا كانت العلاقة دالة أم لا؟ ذكراً السبب.

تدرب وحل التمرينات



إذا كانت مجموعة المدخلات هي $\{3, 5, 6, 7\}$ ومجموعة المخرجات هي $\{\sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{5}, \sqrt{3}\}$ حدد فيما إذا كانت العلاقات التالية دالة أم لا؟ مع ذكر السبب.

10 $\{3, \sqrt{3}(\cdot), 5, \sqrt{5}(\cdot), 6, \sqrt{5}(\cdot)\}$

11 $\{3, \sqrt{3}(\cdot), 5, \sqrt{7}(\cdot), 5, \sqrt{6}(\cdot), 7, \sqrt{5}(\cdot)\}$

العمر	X	10	20	30	40
الكماليتهستهلكة	Y	15	25	35	45

12 أكتب الدالة من الجدول الآتي:

تدرب وحل مسائل حياتية




13 **رياضة:** محمود سباح ماهر يقطع 9.5 كم بالساعة. كون جدول دالة تمثل العدد الكلي للكيلومترات التي استطاع قطعها بـ {2,4,6} ساعة.



14 **بكتريا:** إذا كان عدد البكتريا يزداد بمعدل الضعف كل 20 دقيقة كم سيزداد عدد البكتريا خلال ساعتين؟ كون جدول دالة.



15 **وقود:** إذا كان استهلاك سيارة اسعاف للبنزين في مستشفى مدينة الطب من البنزين بمعدل 5 لتر لكل 25km كون قاعدة دالة بين استهلاك الوقود للسيارة وعدد الكيلومترات التي تقطعها حيث استهلاكها للوقود باللتر {6,7,8,9,10} كون جدول دالة ومثلها.



16 **أحياء:** كل يد في جسم الانسان تحتوي على 27 عظمة. وعدد عظام المشط أقل من عدد السلاميات بالعدد 9 وعدد عظام الرسغ أكثر من عظام المشط بالعدد 3. علماً ان عدد السلاميات 14. مثل المعلومات اعلاه بجدول الدالة.

فكر

17 **تحدي:** جد مجموعة عناصر الدالة $y = 2x - 1$ التي صور عناصرها المجموعة {41,49,57}.

18 **أصح الخطأ:** سهى ومها وجدوا قاعدة دالة أحد عناصرها أقل من الصورة بمقدار 7؟ أيهما أصح؟

فبتبر اجابتك

مها $Y=X+7$ سهى $Y=X-7$

19 **حسّ عددي:** دالة قاعدتها $42x-8$ حدد صورة العنصر 2 في الدالة .

أكتب

مسألة حياتية تمثل دالة ثم انشئ جدول دالة ومثل الجدول في المستوي الاحداثي.

تَعَلَّم



إذا كان لدى سعيد منحل لإنتاج العسل
• ولاحظ أن النحلة تطير بسرعة 24 كيلو
• متر في الساعة. مالعلاقة التي تربط بين
• الزمن (عدد الساعات) والمسافة التي
• تقطعها بالكيلومترات؟

فكرة الدرس

- كتابة معلومة تمثل
- دالة خطية من جدول
- الدالة.
- المفردات
- الدالة الخطية
- معادلة المستقيم
- المخطط البياني
- الأرباع الأربعة

[6-3-1] تمثيل الدالة الخطية (معادلة المستقيم) في المستوى الإحداثي

Representing Linear Function)Equation of Straight Line(in the Coordinate Plane

*الدالة الخطية: دالة تكون كل النقاط التي تنتج منها على مستقيم واحد غير عمودي يسمى هذا المستقيم بيان الدالة الخطية.

*معادلة المستقيم: هي معادلة تعبر عن الدالة الخطية بالصورة $y = mx+t$ حيث t و m أعداد ثابتة.

(مثال 1) ما المسافة التي تقطعها النحلة بالكيلومتر على الزمن بالساعات؟

العنصر (المدخلة)	قاعدة الدالة	الصورة (المخرجة)	الزوج المرتب
X	$Y=24X$	Y	(X,Y)
1	24)1(24	(1,24)
2	24)2(48	(2,48)
3	24)3(72	(3,72)


الخطوة الأولى: إنشاء الدالة:

نفرض زمن (عدد الساعات) طيران النحلة

بالعنصر: X, والمسافة المقطوعة Y

تمثل بالدالة: $Y = 24X$

الخطوة الثانية: أنشئ جدول دالة:



الخطوة الثالثة: مثل الدالة في المستوى الإحداثي:

لكي نرسم دالة خطية بيانية يكفي أن نعين موقع

نقطتين بيانياً من الدالة.

صل بين النقاط نلاحظ انه عندما تطير النحلة ساعتين

تكون المسافة المقطوعة 48km وعندما تطير 3 ساعات


تكون المسافة المقطوعة 72.

المعادلة الناتجة تمثل خطاً مستقيماً.

مثال 2) أمثل الدالة الخطية $y = 3x - 2$ في المستوى الإحداثي.

الخطوة الأولى: أنشئ جدول دالة خطية.

الخطوة الثانية: أمثل الدالة في المستوى الإحداثي.



العنصر (المدخلة)	قاعدة الدالة	الصورة (المخرجة)	الزوج المرتب
X	$y = 3x - 2$	Y	(X, Y)
-1	$y = 3(-1) - 2$	-5	(-1, -5)
0	$y = 3(0) - 2$	-2	(0, -2)
1	$y = 3(1) - 2$	1	(1, 1)

[6-3-2] كتابة الدالة الخطية) معادلة المستقيم (من المخطط البياني


Writing the Linear Function)Equation of Straight Line(from the Graphs



مثال 3) في العام 2011 نجح مختبر علوم المريخ وكالة ناسا الفضائية في الهبوط بمختبر علمي متجول بحجم سيارة على سطح المريخ وبسرعة 0.75m في الثانية الواحدة. الرسم البياني يوضح دالة تبين المسافة التي هبط بها المتجول على الزمن المستغرق. أنشئ جدول دالة خطية ثم اكتب المعادلة الخطية التي تمثلها.

من خلال الرسم البياني نستطيع إنشاء جدول دالة حيث نفرض أن الزمن بـ X والمسافة بـ Y يتكون جدول

الدالة الخطية.



العنصر (المدخلة)	الصورة (المخرجة)
X	Y
1	0.75
2	1.50
3	2.25
4	3.00

من خلال الجدول المجاور نستنتج أن الدالة هي:

$$y = 0.75x$$



تأكّد من فهمك

مثل الدوال الخطية التالية في المستوى الاحداثي: **الاسئلة 1-5**
مشابه للمثالين 1-2

- 1 $Y=X$ 2 $Y=X-9$ 3 $Y=X+2$ 4 $Y=\frac{3}{2}X$ 5 $Y=12-X$

الأسئلة 6-7
مشابه للمثال 3

أستعمل المخطط البياني في أدناه لإنشاء جدول الدالة وكتابة الدالة الخطية:



مثل جدول الدوال الخطية التالية بالمستوي الاحداثي:

8

X	-2	-1	0	1	2
Y	-1	0	1	2	3

9



X	2	1	3	4
Y	4	3	5	6

مثل الدوال الخطية التالية في المستوى الاحداثي:

تدرب وحل التمرينات

- 10 $Y=7X$ 11 $Y=3X-4$ 12 $Y=X+4$ 13 $Y=9X-0.5$ 14 $Y=\frac{X}{2}$

أستعمل المخطط البياني في أدناه لإنشاء جدول الدالة وكتابة الدالة الخطية:



مثل جدول الدوال الخطية التالية بالمستوي الاحداثي:


17

X	-2	-1	0	1	2
Y	2	1	0	-1	-2

18

X	2	1	3	4
Y	5	3	7	9

تدرب وحل مسائل حياتية



19 **إحصاء:** أراد صاحب شركة لصناعة الصابون أن يجري إحصائية للأرباح التي حصلت عليها الشركة خلال 5 سنين إذ وصلت الأرباح الى 50%. اكتب جدول للدالة الخطية من المخطط البياني ثم أكتب المعادلة الخطية العامة للأرباح بالنسبة الى عدد السنوات.




20 **رياضة:** سجلت بشرى عدد من النقاط في نهاية لعبة كرة السلة بحيث كان عدد النقاط التي سجلتها بشرى في اللعبة السابقة أقل بـ 5 نقاط عن اللعبة الحالية. أنشئ جدول دالة خطية ثم مثل الدالة الخطية في المستوي الاحداثي ثم أكتب المعادلة الخطية العامة للدالة.



21 **نقود:** أراد هشام شراء سيارة بـ 12 مليون ديناراً. فإذا كان معه 4 ملايين دينار. ولديه خطة لتوفير 2 مليون دينار سنوياً. اكتب دالة المبلغ الذي يوفره سنوياً. أرسم الدالة الخطية لتحديد عدد السنوات اللازمة ليوفر هشام المبلغ الكافي لشراء السيارة بعد تحديد جدول دالة خطية. مثل المعلومات اعلاة بجدول الدالة.

فكر



22 **تحذ:** عين نقاط في المستوي الاحداثي تحقق الدالة الخطية الموضحة بالمخطط البياني المجاور. ثم اكتب قاعدة الدالة.

23 **حس عددي:** عدد طبيعي ضرب بـ 3 ثم طرح منه 5 بعد الضرب فكان الناتج الكلي مساوياً للعدد 70.

ما المعادلة الخطية العامة للناتج الكلي بالنسبة للعدد الطبيعي؟

أكتب

مسألة حياتية تطابق الدالة الخطية العامة (معادلة مستقيم). $y = 5x - 3$



تَعَلَّم

يظهر في الصورة شكل طائر انعكس صورته في الماء، فإذا حددت سحر ثلاث نقاط في الصورة الأصلية للطائر A, B, C فنجد النقاط التي يظهر ترتيبها في الماء A', B', C'.

فكزة الدرس

- تمثيل الانعكاس والدوران في المستوى الاحداثي.
- المفردات
- التحويل الهندسي
- الانعكاس
- خط الانعكاس
- الدوران
- المستوى الاحداثي

[6-4-1] الانعكاس في المستوى الاحداثي

Reflection in the Coordinate Plane

التحويل الهندسي: هو احد فروع الهندسة الذي يدرس تعاريف الاشكال الهندسية الذي يحول كل نقطة في المستوى الاحداثي الى نقطة أخرى في المستوى نفسه.


الانعكاس: هو تحويل هندسي من شكل ما الى صورة مرآته (المعكوسة) (يحافظ الانعكاس على بنية الشكل).

خط الانعكاس: هو خط عمودي أو أفقي.

مثال 1) i) (جد انعكاس النقاط A, B, C التي حددتها سحر.

الخطوة الاولى: نحدد الأزواج المرتبة التي تمثل النقاط A, B, C فتكون:

(A)2,2(, (B)3,3(, (C)4,2(



الخطوة الثانية: نحدد خط الانعكاس وليكن X-axis ثم نحدد عدد الوحدات بين كل رأس وخط الانعكاس

الخطوة الثالثة: نعين نقطة لكل رأس في الجهة الأخرى من خط الانعكاس بالبعد نفسه فيصبح انعكاس أي نقطة عندما يكون خط الانعكاس

محور السينات هو: $R_x]x,y([=)x,-y($

ii) (جد انعكاس النقاط . (A)2,2(, (B)3,3(, (C)4,2(على محور Y-axis.

النقاط بعد الانعكاس هي (A')-2,2(, (B')-3,3(, (C')-4,2(

وبصورة عامة انعكاس أي نقطة عندما يكون خط الانعكاس محور الصادات هو:

$R_y]x,y([=)-x,y($


Rotating in the Coordinate Plane



لدى مراد ساعة مربعة الشكل معلقة على جدار غرفته اراد ان يجري دوراناً للساعة بـ 90° حول نقطة الاصل باتجاه عقارب الساعة.


الدوران: هو تحويل هندسي يحول النقطة $(0,0)$ الى نفسها ويحول اي نقطة أخرى مثل A الى النقطة A' حسب قياس زاوية الدوران وأتجاهها .

(مثال 2) ماصورة دوران النقطة $(1,2)$ تحت تأثير الدوران؟




أ- دوران بزاوية قياسها 90° حول نقطة الاصل باتجاه عقارب الساعة:

نطبق القاعدة الآتية: $R_{90^\circ} [x,y] = [y,-x]$ (مثلاً $R_{90^\circ} [1,2] = [2,-1]$)




ب - دوران بزاوية قياسها 90° حول نقطة الاصل باتجاه عكس عقارب الساعة:

نطبق القاعدة الآتية: $R_{90^\circ} [x,y] = [-y,x]$ (مثلاً $R_{90^\circ} [1,2] = [-2,1]$)




ج - دوران بزاوية قياسها 180° حول نقطة الاصل باتجاه عقارب الساعة:

نطبق القاعدة الآتية: $R_{180^\circ} [x,y] = [-x,-y]$ (مثلاً $R_{180^\circ} [1,2] = [-1,-2]$)




د- دوران بزاوية قياسها 180° حول نقطة الاصل باتجاه عكس عقارب الساعة:

نطبق القاعدة الآتية: $R_{180^\circ} [x,y] = [-x,-y]$ (مثلاً $R_{180^\circ} [1,2] = [-1,-2]$)



هـ - دوران بزاوية قياسها 270° حول نقطة الاصل باتجاه عقارب الساعة:

نطبق القاعدة الآتية: $R_{270^\circ} [x,y] = [-y,x]$ (مثلاً $R_{270^\circ} [1,2] = [-2,1]$)



و- دوران بزاوية قياسها 270° حول نقطة الاصل باتجاه عكس عقارب الساعة:

نطبق القاعدة الآتية: $R_{270^\circ} [x,y] = [y,-x]$ (مثلاً $R_{270^\circ} [1,2] = [2,-1]$)

تأكّد من فهمك

أنسخ الأشكال في المستوى الاحداثي ثم أرسم صورته في الانعكاس حول خط الانعكاس إذا كانت النقاط :

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | A)2,2(, B)4,4(, C)4,2(| خط الانعكاس هو x-axis |
| 2 | A)-5,2(, B)-2,3(, C)-4,6(| خط الانعكاس هو y-axis |
| 3 | A)1,1(, B)2,3(, C)5,3(, D)3,1(| خط الانعكاس هو x-axis |

الاسئلة 1-3
مشابه للمثال 1

إذا كانت النقطة (1, -2) فجد صورتها :

- | | |
|---|---|
| 4 | تحت تأثير دوران بزاوية 90° حول نقطة الاصل باتجاه عكس عقرب الساعة. |
| 5 | تحت تأثير دوران بزاوية 180° حول نقطة الاصل باتجاه عقرب الساعة. |
| 6 | تحت تأثير دوران بزاوية 270° حول نقطة الاصل باتجاه عقرب الساعة. |
| 7 | إذا كانت (A) 1, -2(, B) 3, -2(, C) 1, -4(رؤوس مثلث، اوجد دوران حول نقطة الاصل وبزاوية 90° باتجاه عقرب الساعة. |
| 8 | النقاط (2, 2) (-2, 4) (-4, 4) (-4, 4) تمثل مربعاً. جد صورته تحت تأثير دوران بزاوية 90° باتجاه عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة. ثم جد مساحة المربع ومساحة صورته. ماذا تلاحظ؟ |

الأسئلة 4 - 8
مشابه للمثال 2

تدرب وحلّ التمرينات

أنسخ الأشكال في المستوى الاحداثي ثم أرسم صورته في الانعكاس


حول خط الانعكاس إذا كانت النقاط :

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 9 | A)1,1(, B)6,1(, C)1,5(| خط الانعكاس هو x-axis |
| 10 | A)-3,3(, B)-1,3(, C)-2,1(| خط الانعكاس هو y-axis |
| 11 | A)-3,2(, B)-2,4(, C)-1,4(, D)-1,2(| خط الانعكاس هو y-axis |


لديك النقطة (1, -2) فجد صورتها :

- | | |
|----|---|
| 12 | تحت تأثير دوران بزاوية 270° حول نقطة الاصل باتجاه عكس عقرب الساعة. |
| 13 | تحت تأثير دوران بزاوية 90° حول نقطة الاصل باتجاه عقرب الساعة. |
| 14 | تحت تأثير دوران بزاوية 180° حول نقطة الاصل باتجاه عكس عقرب الساعة. |
| 15 | إذا كانت النقاط (1, -3) (-1, 4) (-1, 3) (-1, 4) تمثل مثلثاً. جد صورة المثلث تحت تأثير دوران بزاوية 180° باتجاه عكس عقارب الساعة. ثم باتجاه عقارب الساعة. |


تدريب وحل مسائل حياتية



16 **وقفه العلم:** في يوم الخميس وقف طلاب الصف الثاني متوسط لتحية العلم فقرر كريم الذي يقف عند النقطة (3, 3) - (ان يدور بزاوية مقدارها 270° حول نقطة الاصل باتجاه عقارب الساعة فما النقطة التي يقف عندها كريم بعد الدوران؟



17 يظهر الرسم المجاور موقعاً لثلجة في النقطة (2, -2) اراد جميل ان يحركها بزاوية 180° بعكس عقارب الساعة، جد النقطة التي ستمثل موقع الثلجة الجديد.



18 حدد المحافظة التي تمثل انعكاس محافظة المثنى بزاوية 90° درجة عكس عقارب الساعة، مع عقارب الساعة.

فكّر

- 19 **تحذّر:** افرض ان النقطة (4, 3) - (هي صورة للنقطة (4, 3) في انعكاس، حدد على أي محور تم الانعكاس؟
- 20 **حسب عدديّ:** أي زاوية دوران يكون فيها صورة نقطة نفسها باتجاه أو عكس اتجاه عقارب الساعة؟
- 21 **أصحح الخطأ:** يقول مهند أن انعكاس النقطة (2, 3) - (حول محور السينات هو النقطة (3, -2) . صحح خطأ مهند.

أكتب

خطوات إيجاد احداثيات صورة النقطة (3, 3) - (في الانعكاس حول محور الصادات.



تَعَلَّم

أزاح مهدي مكتبه من جانب الغرفة الى الجانب الآخر. هذه الحركة مثال على مفهوم الانسحاب.


فكزة الدريس

- الانسحاب في المستوى الاحداثي.
- المفردات
- الانسحاب.
- المستوى الأحداثي

الانسحاب: هو انتقال الشكل من موقع الى اخر. دون تدويره. ولا ينتج عن ذلك تغير في قياسات شكله.

Translation to Right or Left
Translation to Up or Down

[6-5-1] - الانسحاب الى اليمين او الى اليسار
- الانسحاب الى الاعلى او الى الاسفل



مثال 1) جد احداثيات النقطة A)3,4 بالانسحاب:

i) وحدتان الى اليمين. ii) 5 وحدات الى اليسار.

تحرك النقطة A)3,4 وحدتين نحو اليمين تحصل على

$$A') 5 , 4 (= A) 3 + 2 , 4 ($$


تحرك النقطة A)3,4 خمسة وحدات نحو اليسار تحصل

$$A'') 3 - 5 , 4 (= A) - 2 , 4 ($$

وبصورة عامة: انسحاب (x,y) بموازات محور السينات

$$T_x]x,y([=)x + a ,y($$

إذا كان الانسحاب نحو اليمين فإن $a < 0$ ، وإذا كان الانسحاب نحو اليسار فإن $a > 0$



مثال 2) جد احداثيات النقطة A)3,4 بالانسحاب:

i) وحدتان الى الأعلى. ii) 5 وحدات الى الأسفل.

تحرك النقطة A)3,4 وحدتين نحو الأعلى تحصل على

$$A') 3 , 6 (= A) 3 , 4 + 2 ($$

تحرك النقطة A)3,4 خمسة وحدات نحو الأسفل تحصل


$$A'') 3 , -1 (= A) 3 , 4 - 5 ($$

وبصورة عامة: انسحاب (x,y) بموازات محور الصادات

$$T_y]x,y([=)x , y + b($$

إذا كان الانسحاب نحو الأعلى فإن $b < 0$ ، وإذا كان الانسحاب نحو الأسفل فإن $b > 0$

Oblique Translation




مثال 3) جد إحداثيات النقطة $A(-2, 4)$ بالانسحاب

3 وحدات إلى اليمين، 5 وحدات نحو الأسفل.
تحرك النقطة $A(-2, 4)$ ثلاثة وحدات نحو اليمين
وخمسة وحدات نحو الأسفل فنحصل على
 $A'(-2 + 3, 4 - 5) = (1, -1)$
وبصورة عامة: انسحاب (x, y) بالانسحاب مائل

$$T_{xy} [x, y] = (x + a, y + b)$$

مثال 4) المثلث ABC مثلث رؤوسه $A(3, 6)$ ، $B(4, 7)$ ، $C(7, 4)$




جد انسحابه 3 وحدات نحو اليسار
ووحدة واحدة نحو الأسفل.

$$T_{xy} [3, 6] = (3 - 1, 6 - 1) = (2, 5) \quad A'$$

$$T_{xy} [4, 7] = (4 - 1, 7 - 1) = (3, 6) \quad B'$$

$$T_{xy} [7, 4] = (7 - 1, 4 - 1) = (6, 3) \quad C'$$

مثال 5) المثلث ABC مثلث رؤوسه $A(-1, 3)$ ، $B(-3, 3)$ ، $C(-3, 1)$



جد انسحابه وحدة واحدة نحو اليسار
وثلاثة وحدات نحو الأعلى:

$$T_{xy} [-1, 3] = (-1 - 1, 3 + 3) = (-2, 6) \quad A'$$

$$T_{xy} [-3, 3] = (-3 - 1, 3 + 3) = (-4, 6) \quad B'$$

$$T_{xy} [-3, 1] = (-3 - 1, 1 + 3) = (-4, 4) \quad C'$$

تأكّد من فهمك

مثل النقاط التالية وصورها في المستوي الأحداثي:

الاسئلة 1-3
مشابه للأمثلة 1-3

1 بأنسحاب النقطة (A)3,5 , أربع وحدات نحو اليسار.


2 بأنسحاب النقطة (B)-2,4 , وحدتان نحو الأعلى.

الأسئلة 4-5

مشابه للمثالين 4,5

3 بأنسحاب النقطة (C)-2,4 , وحدة واحدة نحو اليمين , ووحدتين نحو الأسفل

4 جد أنسحاب المثلث A B C إذ (A)2,3(, B)-1,4(, C)0,2(بمقدار ثلاثة وحدات نحو الأسفل



ثم مثله وصورته في المستوي الأحداثي.

5 أنسخ المثلث ABC ثم حدد الأزواج المرتبة في المستوي

الأحداثي ثم جد أنسحابه 3 وحدات نحو اليمين , وحدتان نحو الأسفل.

تدرب وحلّ التمرينات


مثل النقاط التالية وصورها في المستوي الأحداثي:

6 بأنسحاب النقطة (A)-1,-2 , ثلاثة وحدات نحو اليمين.

7 بأنسحاب النقطة (B)-2,4 , وحدتين نحو الأسفل.

8 بأنسحاب النقطة (C)-1,-2 , وحدة واحدة نحو اليسار , ووحدتان نحو الأعلى .

9 جد أنسحاب المربع ABCD إذ (A)2,3(, B)-1,3(, C)-1,0(, D)2,0(بمقدار وحدتين نحو





اليمين . ثم مثله وصورته في المستوي الأحداثي.

10 أنسخ المستطيل ABCD ثم حدد الأزواج المرتبة

ثم جد صورة أنسحاب اللوحة مائلاً بوحدتين الى اليمين وثلاث وحدات الى الأسفل.

تدريب وحل مسائل حياتية



11 **علم الاحياء:** تطبيق في علم الأحياء في الشكل أدناه تخطيط لقلب إنسان. أين التكرار في المخطط ، وأين تمت عملية انسحاب المخطط؟ وعدد الانسحابات.

12 **موجات الضوء:** في الشكل موجات للضوء هل هناك عملية انسحاب للموجة ABC وكم وحدة الى جهة اليمين؟

13 **موجات:** هناك موجات تحدث في البحر إذا كانت النقطة (2,5) على رأس الموجة. أجزى انسحاب للموجة فتكونت الصورة (2,8). فكم وحدة أجرى الانسحاب المائل، وما هي جهات الانسحاب؟

14 **رسم:** رسمت رغد سلسلة جبلية من اربعة جبال فرسمت الجبل الاول وارادت ان ترسم الجبل الثاني بشكل صورة انسحاب للجبل الاول بوحدتين الى اليمين ووحدة الى الاعلى، فما صورة انسحاب الجبل إذا علمت أن نقاط الجبل الاول (0,0) (C), (3,0) (B), (3,3) (A) .

فكّر

15 **تحذّر:** ما احداثيات النقطة (X,Y) بالانسحاب m وحدة الى اليمين، و n وحدة الى الاعلى.

16 **استنتاج:** أجزى انسحاباً فكانت النقطة (4,6) على شكل ما. ثم انسحاب آخر للصورة الناتجة فكانت النقطة (6,-4) دون استعمال الرسم؟ ما هي الصورة النهائية بعد إجراء انسحابين؟ فسر اجابتك.




17 **هندسة:** عند إجراء انسحاب للمعين ABCD الذي رؤوسه (1,-3) (D), (2,-4) (C), (3,-3) (B), (2,-1) (A) كان احداثي الرأس A بعد الانسحاب (3,-4) صف A⁻, B⁻, C⁻, D⁻ بعد الانسحاب .

أكتب

مسألة حياتية تستعمل فيها انسحاباً لشكل معين . ثم حل المسألة.

Chapter Test

بين أتمثل العلاقات التالية دالة أم لا ؟ أذكرالسبب



مثل جدول الدالة بالمستوي الاحداثي؟ ثم صل بين النقاط

5

X	-1	0	1	2
Y	4	5	6	7

4


X	1	2	3	4
Y	20	40	60	80

6 من خلال المدخلات والمخرجات جد قاعدة الدالة .

X	-2	-1	0	1
Y	-3	-2	-1	0


مثل الدالة الخطية فيما يأتي:

7 عند دوران النقطة (2, -3) بزواية 90° باتجاه عكس عقارب الساعة ، ما النقطة التي ستحصل عليها؟



8 انسخ ثم جد صورة انسحاب الشكل بوحدة الى الاسفل و 4

وحدات الى اليسار.



9 انسخ ثم جد صورة دوران الشكل بزواية مقدارها

270° باتجاه عقارب الساعة

- 7-1 **الدرس** مقياس النزعة المركزية والمدى.
- 7-2 **الدرس** تمثيل البيانات ببيان الشارين
- 7-3 **الدرس** التجربة العشوائية
- 7-4 **الدرس** الحدث
- 7-5 **الدرس** الأحمالات
- 7-6 **الدرس** الاحتمال التجريبي والاحتمال النظري
- 7-7 **الدرس** خطة حل المسألة : تمثيل المسألة)



يعكف الأحصائيون على دراسة البيانات الأحصائية من خلال تمثيلها بطرائق مختلفة وتفسيرها ليتمكنوا من معرفة أفضل الأختيارات واستخدامها .

أختر الكلمة المناسبة من المفردات المجاورة لكي تكون جملة صحيحة :

- 1 هو الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة في المجموعة المعطاة .
المنوال
- 2 هي القيمة التي تتكرر اكثر من غيرها في المجموعة المعطاة
الوسيط
- 3 هي القيمة التي تتوسط مجموعة البيانات المعطاة بعد ترتيبها تصاعدياً او تنازلياً .
المدى
- 4 هي القيمة التي تساوي مجموع القيم المعطاة مقسوماً على عددها .
الوسط الحسابي

رتب مايلي تصاعدياً (من الأصغر الى الأكبر):

5 9 . 6 . 8 . 8 . 9 . 6 . 7 . 9

6 97 . 90 . 90 . 99 . 100 . 97 . 97 . 99

أختر الأجابة الصحيحة من بين القوسين لكل ما يأتي :

- 7 بغداد عاصمة جمهورية العراق (ممكن ، مؤكداً)
- 8 احتمال سحب كرة حمراء من كيس فيه كرات بيض فقط هي (50% ، 0%)
- 9 بطاقات مرقمة من 1 الى 9 نسبة البطاقات التي تحمل ارقام زوجية هي (اقل من 50% ، 0%)
- 10 اذا كان العدد 3 يمثل الساق والعدد 4 يمثل الورقة فان العدد هو (34 ، 43)

65	70	68	76	65
72	69	74	71	69
76	65	71	72	68


11 مثل البيانات في الجدول المجاور بطريقة الساق والورقة

جد الوسيط والمنوال والمدى لكل ما يأتي:

12 4 ، 5 ، 0 ، 2 ، 3 ، 8 ، 1 ، 6 ، 2

13 87 ، 30 ، 55 ، 15 ، 12 ، 71 ، 77

14 من التمثيل المجاور بالنقاط:



تَعَلَّم

فِكْرَةُ الدَرِّيسِ

- إيجاد مقياس النزعة المركزية والمدى
- استخدام التمثيل بالساق والورقة

المفردات

- المتوسط
- الوسيط
- المنوال
- المدى

يبين الجدول المجاور درجات بعض طلاب الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات أوجد :

1- المدى
2- الوسيط
3- المنوال
4- المتوسط الحسابي

درجات الطلاب				
95	90	85	90	98
88	81	90	79	79
72	90	99	94	75

تعلمت سابقاً تمثيل البيانات بطريقة الساق والورقة لمجموعة واحدة ، في هذا الدرس سنتعلم تمثيل مجموعتين بطريقة الساق والورقة والمقارنة بينهما. ويمكنك إيجاد مقياس التشتت و النزعة المركزية من خلال التمثيل بالساق والورقة .

مثال 1) استعمل التمثيل بالساق والورقة للإجابة عن فقرة تعلم
خطوة 1) : استعمل التمثيل بالساق والورقة لعرض البيانات بعد ترتيبها تصاعدياً.

الأوراق) مرتبة الآحاد)	الساق) مرتبة العشرات)
2 5 9 9	7
1 5 8	8
0 0 0 0 4 5 8 9	9

خطوة 2) : استعمل التمثيل بالساق والورقة للإجابة عن :

$$1 \quad \text{القيمة الكبرى} = 99 \quad \text{القيمة الصغرى} = 72$$

$$\text{المدى} = \text{القيمة الكبرى} - \text{القيمة الصغرى}$$

$$\text{المدى} = 99 - 72$$

$$27 =$$

2) الوسيط = 90 (القيمة الواقعة في منتصف البيانات في جدول الساق و الورقة)

3) المنوال = 90 (هي الدرجة الأكثر تكراراً)

$$4 \quad \text{الوسط الحسابي يساوي} = \frac{99 + \dots + 75 + 72}{15} = 87$$

يمكن مقارنة مجموعتين من البيانات بالتمثيل المزدوج للساق والورقة.

مثال 2) بين الجدول المجاور تمثيل الساق والورقة لدرجات بعض الطلاب في مادتي الرياضيات والفيزياء

الورقة (الفيزياء)	الساق	الورقة (الرياضيات)
8 5 1	7	3
9 8 4 4 2	8	0 2 3 3 7 8
9 6 5 3 0	9	0 0 1 5 6 7

i) أي المجموعتين مداه أكبر؟

مدى مجموعة الرياضيات $97-73 = 24$

مدى مجموعة الفيزياء $99-71 = 28$

لذا مدى مجموعة الفيزياء أكبر من مدى مجموعة الرياضيات

ii) وسيط مجموعة الرياضيات هو 88 أما الوسيط لمجموعة الفيزياء فهو 88

iii) ما أعلى درجة في موضوع الرياضيات؟ 97

iv) ما أقل درجة في موضوع الفيزياء؟ 71

مثال 3) أجريت مقارنة على المسافة التي تقطعها 9 سيارات بالكيلومترات داخل المدينة وعلى الطريق العام فكان الجدول أدناه.

المسافة بالكيلومترات									
28	23	41	31	20	19	23	31	34	داخل المدينة
28	38	32	41	38	28	32	30	27	الطريق العام

i) أنشئ التمثيل المزدوج بالساق والورقة بالبيانات اعلاه. ii) جد الوسيط والمنوال والمدى لكل منهما.

الطريق العام	الطريق العام	داخل المدينة
الوسيط	32	28
المنوال	28,32,38	23, 31
المدى	$41-27=14$	$41-19=22$

الطريق العام	الساق	داخل المدينة
	1	9
7 8 8	2	8 3 3 0
0 2 2 8 8	3	4 1 1
1	4	1

iii) أي المجموعتين مداه أكبر؟

مجموعة السيارات داخل المدينة مداه = 22

مجموعة سيارات الطريق العام مداه = 14

لذا مجموعة السيارات داخل المدينة مداه أكبر.

تأكّد من فهمك

الجدول المجاور يبين درجات الحرارة لبعض الأيام

درجات الحرارة سيليزية				
24	30	36	32	38
2	31	35	13	15
38	32	38	38	13

الأُسئلة : (1-3)
مشابه للمثال 1

1 استعمل التمثيل بالساق والورقة لتمثيل البيانات

2 اوجد : المدى ، الوسيط ، المنوال للبيانات

3 اوجد : الوسط الحسابي للبيانات

يبين تمثيل الساق والورقة المجاور عدد النقاط التي حصل عليها مجموعتين من الفرق المدرسية في لعبة كرة

الساق	المجموعة 1)	المجموعة 2)
4	7 8 8	0
5	0 0 2 3 7	6 4 3 1
6	1 6	9 8 6
7		2 1
8	4	3

4 جد : (المدى ، الوسيط ، المنوال) لبيانات المجموعة الاولى

5 أي المجموعتين مداها أصغر؟

6 قارن بين الوسيطين للمجموعتين.

7 أنشئ التمثيل المزدوج بالساق والورقة ثم جد : المدى ،

الوسيط ، المنوال لبيانات النوعين.

8 أي المجموعتين مداها أكبر؟

الأُسئلة : 7, 8
مشابه للمثال 3

أطوال النباتات بالسنتيمترات							
49	64	72	63	45	52	43	النوع الأول
54	58	54	64	58	52	61	النوع الثاني

تدرب وحلّ التمرينات

استعمل تمثيل الساق والورقة المجاور وجد ما يأتي:

9 المدى ، الوسيط ، المنوال للبيانات

10 الوسط الحسابي للبيانات

الساق	الورقة
0	8 9
1	0 2 4 6 8
2	7
3	4

يمثل الجدول أدناه عدد زوار المتحف البغدادي في اسبوعين متتالين:

عدد زوار المتحف البغدادي							
58	61	70	63	36	50	44	الأسبوع الأول
50	59	70	66	30	52	40	الأسبوع الثاني

11 استعمل التمثيل المزدوج بالساق والورقة لتمثيل البيانات

12 اوجد : المدى ، الوسيط ، المنوال لبيانات الاسبوع الاول

13 اوجد : الوسط الحسابي للبيانات لكل اسبوع . ماذا تلاحظ ؟ فسر اجابتك.

تدرب وحل مسائل حياتية

سرعة السيارات Km/h				
69	65	71	76	65
59	74	68	74	72
70	65	69	71	68

سرعة: الجدول المجاور يبين سرعة بعض السيارات على الطرق

14 استعمل التمثيل بالساق والورقة لتمثيل البيانات

15 جد المدى ، الوسيط ، المنوال للبيانات

16 جد الوسيط الحسابي للبيانات

كمية الدهن في فطائر اللحم والدجاج %		
دجاج	الساق	لحم
1	0	8 9
9 5	1	0 2 4 6 7
7 6 5	2	7
4 3	3	
1	4	0

طعام: استعمل تمثيل الساق والورقة المجاور واجد ما يأتي:

17 ما اعلى كمية دهون في كل نوع ؟

18 اي نوعين يحتوي كمية اقل من الدهن بصورة عامة ؟

19 جد الوسيط لكلا الفطيرتين وقارن بينهما .

فكّر

الوزن بالكيلو غرام	
الساق	الورقة
3	4 5 6
4	
5	6
7	2 8

20 اعط مثلاً على مجموعة بيانات لها نفس الوسيط والمنوال .

21 **اكتشف الخطأ:** الجدول المجاور يمثل أوزان بعض المواد

بالكيلو غرام ، يحاول محمد ومهند تحليل البيانات الممثلة بالساق

والورقة يقول محمد ان نصف الازان بين 30.40 كيلو غرام

ويقول مهند انه لا يوجد اي وزن يزيد عن 70 كيلو غرام أيهما

على صواب ؟ وضح اجابتك

22 **درجات:** الجدول أدناه يمثل درجات أمتحان شعبتين في موضوع الرياضيات

23 استعمل البيانات في التمثيل المزدوج بالساق والورقة وأجب:

24 ما الوسيط في شعبة A ؟

25 ما المنوال في شعبة B ؟

أي الشعبتين مداها أصغر؟

درجات طلاب الشعبتين							
66	81	73	52	77	80	90	A الشعبة
80	60	99	60	84	66	90	B الشعبة

أكتب

مسألة يمكن حلها بتحليل التمثيل المزدوج بالساق والورقة . وضح كيف يمكنك استعماله لايجاد المدى ، الوسيط ، المنوال .

تَعَلَّم

سجل أحد لاعبي كرة السلة في كل مباراة النقاط التالية :



38 ، 35 ، 40 ، 37 ، 35

40 ، 37 ، 42 ، 46 ، 46

كيف أمثل البيانات ببيان الشاربيين

فكرة الدرس

تمثيل البيانات ببيان الشاربيين

مقارنة بين الشاربيين

المفردات

بيان الشاربيين

الربيع الاعلى

الربيع الأدنى

المدى الربيعي

Box and whisker Graph

بيان الشاربيين [7-2-1]


لكي تنشئ بيان الشاربيين، يجب تقسيم البيانات بعد ترتيبها الى اربعة اقسام، باستعمال الربيعات، الوسيط



مثال 1) انشئ بيان الشاربيين للبيانات الآتية :


35 ، 37 ، 40 ، 38 ، 46 ، 46 ، 42 ، 37 ، 40

الخطوة 1) رتب البيانات تصاعديا ، حدد القيمة الصغرى والكبرى ثم الوسيط وبعدها الربيع الادنى




الخطوة 2) أرسم مستقيم الأعداد وأضع فوقه

نقطة لكل قيمة وجدت في الخطوة 1).



الخطوة 3) أرسم مستطيلا بدءاً من الربيع الادنى وانتهاء عند الربيع الاعلى ، أرسم داخل المستطيل خط


مستقيم يدل على الوسيط ، ثم أرسم الشاربيين من القيمة الصغرى والقيمة الكبرى حتى المستطيل .




مثال 2) انشى بيان الشاربيين للبيانات الآتية :

37 . 46 . 35 . 40 . 42 . 46 . 38 . 49 . 37 . 35 . 33


رتب البيانات تصاعديا ، حدد القيمة الصغرى والكبرى ثم الوسيط وبعدها الربع الأدنى والربع الأعلى



أرسم مستقيم الأعداد وأضع فوقه نقطة لكل قيمة .



ارسم مستقيلا بدءاً من الربع الأدنى وانتهاء عند الربع الأعلى ، ارسم داخل المستطيل خط مستقيم يدل على الوسيط ، ثم ارسم الشاربيين من القيمة الصغرى والقيمة الكبرى حتى المستطيل .



المدى الربيعي = الربع الأعلى - الربع الأدنى


المدى الربيعي = 11 (46 - 35) يساوي طول المستطيل

Comperison by Using Box-whisker

[7-2-2] المقارنة بأستعمال الشاربيين

يمكنك أستعمال بيان الشاربيين للمقارنة بين مجموعتين من البيانات وذلك بوضع أحدهما بمحاذاة الآخر.

مثال 3) يبين بيان الشاربيين أدناه كيف تتوزع بيانات شركتي A , B لأنتاج نوع خاص من أدوات المطبخ.



من خلال الشكل المجاور أجب عما يأتي :

- أي الشركتين وسيطها أكبر ؟ وسيط الشركة B أكبر من وسيط الشركة A

- أي الشركتين لديها مدى ربيعي أكبر؟ المدى الربيعي للشركة B هو الأكبر .

حيث طول المستطيل في بيان الشاربيين يمثل المدى الربيعي .

- أي الشركتين ستنتج أدوات أكثر ؟

المدى والمدى الربيعي في بيان شركة A هما اصغر من المدى والمدى

الربيعي في بيان شركة B ، هذا يعني ان التغيير في بيانات الشركة A اقل من التغيير في بيانات الشركة B

لذا انتاج شركة A يمكن ان يكون الاكثر .



تأكّد من فهمك

أنشئ بيان الشاربيّن للبيانات الآتية:

1 20 ، 28 ، 19 ، 21 ، 17 ، 29 ، 26 ، 23 ، 17


2 85 ، 79 ، 75 ، 72 ، 72 ، 73 ، 76 ، 81

3 16 ، 26 ، 17 ، 23 ، 21 ، 14 ، 17 ، 25 ، 10


الأسئلة : 1-3)

مشابه للمثالين 1.2

لدى محمد ومهند طائرتان ورقيتان ، يمثل بيان الشاربيّن المسافات التي ارتفعت بها كل من الطائرتين.



6 اي طائرة يبدو انها ستطير مسافة اقل ؟



الأسئلة : 4-8)

مشابه للمثال 3

8 قارن بين الوسيطين وبين المديين .

8 قارن بين المدى الربيعي لعدد زوار المجمع A مع عدد زوار المجمع B.

تدرب وحل التمرينات


انشئ بيان الشاربيّن للبيانات الآتية :

8 39 ، 18 ، 15 ، 20 ، 8 ، 15 ، 23 ، 7 ، 10 ، 13 ، 12

9 22 ، 18 ، 17 ، 18 ، 25 ، 24 ، 24 ، 18 ، 29 ، 23


7	6	5	4	الساق
2	3	4	2 7	الورقة

يمثل بياناً الشاربيّن عدد زوار حديقة الزوراء والمتحف البغدادي في بعض الايام .



13 اي المكانين يبدو انه يستقبل عدد اكبر من الزوار ؟

14 يمثل بياناً الشاربيّن المجموعتين A , B .



تدرب وحل مسائل حياتية



17 **ملابس** : يمثل الجدول التكراري قياس 12 بدلة رجالية.

القياس	48	50	52	54	65
التكرار	3	4	2	2	1

مثل الجدول اعلاه ببيان الشاربيين .



18 **زراعة** : مثلت أطوال 8 نباتات بالسنتيمترات بطريقة الساق والورقة المبينة في الجدول أدناه . مثل البيانات بالشاربيين.

الساق	3	4	5
الورقة	2	1	1




19 **رياضة** : يمثل بيان الشاربيين عدد المباريات التي لعبها لاعبين في كرة القدم خلال السنوات الأربعة عشر الأولى من احترافهما.

أي لاعب يبدو أن عدد مبارياته أكثر؟

20 أي لاعب وسيطه أكبر؟

21 أي لاعب مداه الربيعي أكبر؟



فكر

22 **أكتشف الخطأ**: استعمل محمود البيانات الآتية :

8 . 2 . 9 . 14 . 5 . 13 . 7 . 5 . 8

ووجد ان الربيع الادنى (11) بين خطأ محمود وصححه .

23 **تحذّر**: اذا كان المدى الربيعي لمجموعة بيانات يساوي 9 . وكان الربيع الاعلى يساوي 27. فما قيمة

الربيع الادنى ؟

24 **مسألة مفتوحة**: أكتب مجموعة بيانات عند تمثيلها بالشاربيين يكون المستطيل طويلاً والشاربيين


قصيرين . قارن عدد القيم في المستطيل مع عددها في الشاربيين.

أكتب

حالات التشابه والأختلاف بين تمثيل البيانات في الساق والورقة والتمثيل في الشاربيين.

تَعَلَّم

رمى محمد حجر النرد مرة واحدة ، وطلب الى أخته تمارة تسجيل الأرقام التي ظهرت .



- ماذا نسمي مجموعة النواتج الممكنة ؟
- ماذا نسمي مجموعة الأرقام الأولية ؟

فكرة الدرس

- التعرف إلى التجربة العشوائية.
- كتابة نتائج التجربة العشوائية بمخطط الشجرة.
- كتابة عدد النتائج بأستعمال قانون العد الأساسي.

المفردات

- الفعل العشوائي • الحدث
- التجربة العشوائية • النتيجة
- قانون العد الأساسي

Random Experiment

[7-3-1] التجربة العشوائية

التجربة العشوائية : كل نشاط تأتي نتائجه مصادفة.

الفعل العشوائي : هو فعل يؤدي الى نتيجة غير معروفة مسبقاً.

مجموعة النتائج : هي المجموعة المؤلفة من جميع النتائج الممكنة لفعل عشوائي وتسمى فضاء العينة ويرمز لها Ω

الحدث : هو نتيجة ممكنة أو مجموعة من النتائج الممكنة.

(مثال 1) حجر النرد مرقم من 1 الى 6 كل رقم يمكن أن يظهر مرة واحدة ، أي أن النتائج الممكنة هي :
6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1

مجموعة النواتج الممكنة تدعى فضاء العينة وسوف نرمز لها Ω .

إذن : $\Omega = \{ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 \}$ تجربة عشوائية بسيطة

الأرقام الأولية هي : 2 ، 3 ، 5 وهي مجموعة جزئية من فضاء العينة نكتبها بشكل مجموعة.

حدث بسيط $E = \{ 2 , 3 , 5 \} \subset \{ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 \}$

(مثال 2) رمي قطعتي نقود معدنية مرة واحدة :

i) اكتب مجموعة النتائج الممكنة .

ii) اكتب النتائج التي تحقق الحدث : ظهور وجهين متشابهين على القطعتين .

i) اذا سميت الوجه الأول للقطعة المعدنية (H) الصورة (وسميت الوجه الثاني T) الكتابة .


فسوف تحصل على 4 نتائج ممكنة ، أنشئ مخطط الشجرة ليساعدك على عرض كل النتائج الممكنة كما مبين

من مخطط الشجرة مجموعة النتائج هي :

$\Omega = \{ T.T (.) T.H (.) H.T (.) H.H (.) \}$

ii) يتحقق الحدث اذا كانت النتيجة (T.T (.) H.H (.)) وهي مجموعة جزئية من



فضاء العينة.




$E = \{ T.T (.) H.H (.) \} \subset \Omega$

(مثال 3)

أطلق طارق مؤشر القرص A ومؤشر القرص B كما مبين بالشكل هنا:
i) أكتب مجموعة النتائج الممكنة .
ii) أكتب النتائج التي تحقق الحدث : مؤشر القرص B على العدد 3 .
i) أنشى مخطط شجرة ليساعدك على عرض كل النتائج الممكنة .



القرص A القرص B



مجموعة النتائج الممكنة :
 $\Omega = \{ (R , 1) , (R , 2) , (R , 3) , (B , 1) , (B , 2) , (B , 3) \}$

E = { (R , 3) , (B , 3) } ii)

Fundamental Counting Principle

[7-3-2] قانون العد الأساسي

ينص قانون العد الأساسي : على أن عدد النتائج الممكنة لتجربة عشوائية تقوم على فعلين عشوائيين هو ناتج ضرب عدد نتائج الفعل الأول (m) في عدد نتائج الفعل الثاني (n) أي أن عدد نتائج الفعلين هو $m \times n$

(مثال 4)

رمي قطعتي نقود معدنية مرة واحدة :

i) أستعمل قانون العد الأساسي لأجد نتائج التجربة.

مع قطعة النقود الأولى تظهر نتيجتان ولتكن $m = 2$

مع قطعة النقود الثانية تظهر نتيجتان ولتكن $n = 2$

أستعمل قانون العد الأساسي : عدد نتائج التجربة $m \times n =$

$$2 \times 2 = 4 \text{ لذا عدد النتائج كلها}$$

ii) (في مثال 3)

مع القرص A عدد النتائج الممكنة 2 (أحمر، أزرق) ولتكن $m = 2$

مع القرص B عدد النتائج الممكنة 3 (1, 2, 3) ولتكن $n = 3$

أستعمل قانون العد الأساسي : عدد نتائج التجربة $m \times n =$

$$2 \times 3 = 6 \text{ لذا عدد النتائج كلها}$$

iii) رميت حجر النرد وأطلقت قرص فيه 4 أقسام متساوية مرقمة (1, 2, 3, 4)

ما عدد النتائج الممكنة؟

مع حجر النرد (6) (1, 2, 3, 4, 5, 6) نتائج ولتكن $m = 6$

مع القرص (4) (1, 2, 3, 4) نتائج ولتكن $n = 4$

أستعمل قانون العد الأساسي : عدد نتائج التجربة $m \times n =$

$$6 \times 4 = 24 \text{ لذا عدد النتائج كلها}$$

تأكّد من فهمك



1 تريد سعاد الجلوس على كرسي من بين 8 كراسي مرقمة من 1 الى 8.

i) أكتب مجموعة النتائج الممكنة.

ii) أكتب النتائج التي تحقق الحدث « جلوسها على كرسي يحمل رقماً زوجياً »

جد عدد النتائج كلها مستعملاً قانون العد الأساسي لكل مما يأتي.

2 رمي قطعة نقود وأطلاق مؤشر القرص المقابل. أكتب مجموعة النتائج الممكنة

3 أكتب النتائج التي تحقق الحدث « ظهور كتابة على قطعة النقود ووقوف المؤشر

على الرقم 1 »

4 لدى مهند 2 ستر) سوداء وبنية) ولديه أيضاً قميص أبيض وقميص نيلي

وقميص رمادي . بكم طريقة يمكن لمهند أن يرتدي قميصاً وسترة معاً.

الأسئلة : 1-4)

مشابهة للأمثلة: 1-4

تدرب وحلّ التمرينات

5 تنتظر ساره وأمل الباص من بين 6 باصات تحمل الأرقام من 1 الى 6

i) أكتب مجموعة النتائج الممكنة.

ii) أكتب النتائج التي تحقق الحدث « ركوب سارة باصاً يحمل

رقم فردي أصغر من 6 »

iii) أكتب النتائج التي تحقق الحدث « ركوب أمل باصاً يحمل رقم زوجي »

6 رمي حجر النرد وأطلاق مؤشر القرص المقابل

i) أكتب مجموعة النتائج الممكنة.



ii) أكتب النتائج التي تحقق الحدث « ظهور عدد أولي على الحجر

ووقوف المؤشر على اللون الأحمر»

iii) أكتب النتائج التي تحقق الحدث « ظهور عدد أكبر من خمسة

على الحجر ووقوف المؤشر على اللون الأصفر»

iv) أستعمل قانون العد الأساسي لإيجاد العدد الكلي للنتائج.



تدرب وحل مسائل حياتية




7 **أنترنيت** : يريد رياض أن يختار كلمة السر الخاصة لدخول الأنترنيت ، تتكون الكلمة من حرفين من مجموعة الحروف A ، B ، C متبوعة بأحد الأرقام الثلاثة 1 ، 2 ، 3 . كم كلمة سر يمكنه أن يشكلها مستعملاً قانون العد الأساسي؟ أكتب جميع النتائج الممكنة.

8 **طعام** : يمكن أن يختار زبون عند الفطور بين الجبن والبيض المقلي، كما يمكنه أن يشرب حليب أو عصير برتقال أو عصير تفاح.
i) أكتب كل الخيارات الممكنة للزبون.
ii) أكتب النتائج الممكنة التي تحقق الحدث " تناول الجبن وعصير الفاكهة "
iii) جد عدد النتائج كلها مستعملاً قانون العد الأساسي.



فكّر


9 **نحْدُ**: رميت حجر النرد وقطعة معدنية ثم تدوير مؤشر قرص فيه قسمين.
i) أكتب النتائج الممكنة.
ii) جد عدد النتائج كلها مستعملاً قانون العد الأساسي.



10 **صحة**: الجدول المجاور يحتوي على ثلاث مجموعات

المجموعة C	المجموعة B	المجموعة A
خضر	لحم	جبن
فواكه	دجاج	بيض
	سمك	لبن

i) أكتب النتائج الممكنة للمجموعة A مع المجموعة B
ii) أكتب النتائج الممكنة للمجموعة A مع المجموعة C
iii) جد عدد النتائج الممكنة للمجموعات A مع B مع C.



11 **ألعاب**: تسابق محمد ومهند في لعبة القرص المجاور ، دور القرص مرتين . إذا كان مجموع الرقمين عدد فردي فإن مهند هو الفائز . أكتب مجموعة النتائج الممكنة ليكون محمد هو الفائز.

أكتب

كيف تجد عدد النتائج الممكنة عندما ترمي حجر النرد وقطعتي نقود معدنية دفعة واحدة؟

تَعَلَّم

فِكْرَة الدرس

• يتعرف إلى الحدث ، والأحداث المستقلة وغير المستقلة.

• التمييز بين الأحداث المستقلة وغير المستقلة.

• يتعرف الحدث المركب.

المفردات

• الحدث

• الحدثان المستقلان

• الحدثان المترابطان

• الحدث المركب

صندوقان يحتوي الأول على كرات حمراء وصفراء.



يحتوي الصندوق الثاني على كرات خضراء وزرقاء.

سحبت كرة من كل صندوق.

• ماذا نسمي طريقة السحب؟

• ماذا نسمي النتائج؟

• وما العلاقة بين النتيجةين؟



يمكننا أن نسمي العملية في فقرة تعلم تجرية Experiment.

أما **الحدث Event**: فهو مجموعة نتائج أو نتيجة واحدة أحياناً. والأحداث قد تكون مستقلة أو مترابطة أو مركبة.

[7-4-1] الأحداث المستقلة والأحداث غير المستقلة (المترابطة)

Independent and Dependent Events

الحدثان المستقلين: إذا كان وقوع أو عدم وقوع أحدهما لا يؤثر على وقوع أو عدم وقوع الحدث الآخر.

الحدثان غير المستقلين (المترابطين): إذا كان وقوع أو عدم وقوع أحدهما يؤثر في وقوع أو عدم وقوع الحدث الآخر.

مثال 1)

الأجابة عن الأسئلة في فقرة تعلم :

نسمي طريقة السحب بالتجربة .

ونسمي النتائج من هذه التجربة بالأحداث

أما العلاقة بين هذه الأحداث فتوضح كما يأتي:

أفرض أن E_1 حدث سحب كرة من الصندوق الأول (الكرة المسحوبة حمراء أو صفراء)


أفرض أن E_2 حدث سحب كرة من الصندوق الثاني (الكرة المسحوبة خضراء أو زرقاء)

لاحظ أن سحب أي كرة من الصندوق الأول لا يؤثر على عدد الكرات في الصندوق الثاني.

أي أن وقوع الحدث E_1 لا يؤثر على وقوع الحدث E_2

لذا E_1 ، E_2 حدثان مستقلان .





مثال 2) صندوق يحتوي على 3 كراتٍ حمراء و 5 كراتٍ صفراء

حدّد ماذا كان الحدثان مستقلين أم مترابطين في كل مما يلي:

i) سحب كرة حمراء ثم سحب كرة صفراء دون إعادة الكرات الى الصندوق .

أفرض E_1 سحب كرة حمراء ، E_2 سحب كرة صفراء من الصندوق.

لعدم إعادة الكرة الحمراء بعد السحب بقى في الصندوق كرتان حمراء ، 4 كرات صفراء .

أي وقوع الحدث E_1 يؤثر على وقوع الحدث E_2 . فهما حدثان غير مستقلين (مترابطين)

ii) سحب كرة حمراء ثم سحب كرة صفراء بعد إعادة الكرة الأولى الى الصندوق .

أفرض E_1 سحب كرة حمراء ، E_2 سحب كرة صفراء بعد إعادة الكرة الحمراء يبقى عدد الكرات نفسه في

الصندوق. أي وقوع الحدث E_1 لا يؤثر في وقوع الحدث E_2 . فهما حدثان مستقلان.

مثال 3) حدّد إن كان الحدثان مستقلين أو غير مستقلين في حالة ظهور الصورة بعد رمي قطعة نقود



وظهور الكتابة بعد رميها مرة أخرى.

أفرض E_1 ظهور الصورة في الرمية الأولى.

أفرض E_2 ظهور الكتابة في الرمية الثانية.

E_1 لا يؤثر في E_2 .

لذا E_1 ، E_2 حدثان مستقلان .

Compound Events

[7-4-2] الأحداث المركبة

الحدث المركب : يتكون من حدثين بسيطين أو أكثر وقد تكون مستقلة أو غير مستقلة.

مثال 4) رمي حجر النرد وتدوير قرص مقسم على أجزاء ملونة متساوية المساحة. هل الحدث مركب

ومانوع الحدثان البسيطان؟


أن عملية رمي حجر النرد وتدوير القرص تعد حدثاً مركباً من حدثين بسيطين .

الحدث الأول ظهور أحد الأرقام من 1 الى 6 .

والحدث الثاني ظهور لون معين. ان ظهور رقم لا يؤثر على

ظهور اللون .

لذلك فهما حدثان مستقلان.



مثال 5) أعلن محل للملابس عن إمكانية الحصول على قطعة إضافية عند شراء الزبون أيّ قطعة.

مانوع الحدثين؟

تمثيل عملية شراء قطعة الملابس وتسلم قطعة ثانية مجاناً حدث مركب .


فتسلم القطعة الثانية مجاناً مرتبطاً بشراء الزبون القطعة الأولى.

لذلك فهما حدثان غيرمستقلين.



تأكّد من فهمك حدد إن كان الحدثان مستقلين أو غير مستقلين في الأحداث المركبة فيما يأتي:

1 اسحب بطاقة من البطاقات المجاورة دون أرجاعها ، ثم أسحب بطاقة أخ 2 . 3 4 5 6




A B C D

2 إذا أختيرت إحدى بطاقات الأحرف ودوّر مؤشر القرص الدوار.

(الأسئلة : 1 - 6)

(مشابه للأمثلة) 1 - 5

3 رمي حجر النرد ، وسحب كرة من صندوق فيه كرات مختلفة الألوان.



4 صندوق فيه 4 كرات حمراء ، و3 صفراء ، سحب مهند كرة عشوائياً

وسحب محمد أيضاً كرة عشوائياً.

5 سحب الكرة الأولى من صندوق دون أعادتها ثم سحب كرة ثانية من الصندوق نفسه.

6 سحب الكرة الأولى من صندوق مع أعادتها ثم سحب كرة ثانية من الصندوق نفسه.

تدرب وحلّ التمرينات



حدد أن كان الحدثان مستقلين أو غير مستقلين في الأحداث المركبة التالية:

7 وقوف المؤشر على اللون الأحمر وظهور الرقمين 5 ، 2 على حجر النرد .

8 رمي حجري نرد معاً وظهور الرقم 6 على الحجر الأول وظهر الرقم 3 على الحجر الثاني .

9 رمي قطعة نقود وظهور الصورة ، ورمي حجر نرد وظهور الرقم 5.

10 رمي حجر النرد والحصول على عدد زوجي ، والحصول على 1 أو 4 .





11 علبة فيها حلوى بنكهات مختلفة ، 3 بطعم الليمون ، 4 بطعم الفراولنا

2 بطعم الموز ، 5 بطعم البرتقال سحبت جمانة قطعتين من العلبة دون أعادتها

الى العلبة.

12 رمي تيمم قطعتي نقود في الوقت نفسه فإذا ظهرت الصورة نفسها على القطعتين .

13 أطلق محمد مؤشر القرص A وأطلق مهند مؤشر القرص B في الوقت نفسه ، أن يأتي مؤشر A



على العدد 4 ومؤشر B على اللون الأخضر.

14 سحب بطاقة حمراء من مجموعة البطاقات A B C D وظهور كتابة بعد رمي قطعة نقود.


تدرب وحلّ مسائل حياتية



15 **فواكه** : سلة تحتوي على 3 برتقالات و5 موزات و4 تفاحات .
أختار أحمد حبة فاكهه عشوائياً وأختارت أخته حبة فاكهه عشوائياً
دون إعادة الحبة الأولى .مالعلاقة بين الحدثين ؟




16 **ملابس** : درج فيه 5 قمصان بيض ، 4 زرق ، قميصان رصاصيان
سحب شخص قميصاً من الدرج ، ثم سحب قميصاً آخر دون إعادة
القميص الأول الى الدرج .أيكون الحدثان مستقلين أم لا؟ فسر إجابتك.



17 **لعبة** : رمى أحمد حجر النرد وقطعة النقود مرة واحدة ، ظهر رقم
أكبر من 3 على حجر النرد وصورة على قطعة النقود .هل الحدثان
مستقلان ؟ وضح ذلك.

فكّر

18 **مسألة مفتوحة** : يوجد في صندوق 6 كرات بثلاثة ألوان مختلفة . أكتب مسألة تتعلق بسحب كرتين
عشوائياً دون أرجاعهما الى الصندوق .




19 **أكتشف الخطأ** : أطلق محمود مؤشر القرص المجاور ثلاث مرات
وقال: أن يأتي المؤشر عند 5 في المرات الثلاث لا يؤثر في النتيجة
وقال: صالح أن يأتي المؤشر على 5 في المرات الثلاث يؤثر في النتيجة
أيهما أجابته صحيحة ؟ فسر إجابتك



20 **طقس** : توقعت دائرة الأنواء الجوية أن هناك فرصة لهطول الأمطار
يوم الثلاثاء % 80، ان فرصة هطول المطر يوم الأربعاء هي % 30.
مالعلاقة بين الحدثين ؟

أكتب

ما الفرق بين الحدثين المستقلين وغير المستقلين؟



تَعَلَّم

أخذ مهند القرص الدوار المجاور ، اذا
دور مؤشر القرص الدوار ، فما احتمال أن
يؤشر المؤشر على كل حرف؟

فكرة الدرس

- حساب احتمال
- حساب احتمال الحدث المتمم
- المفردات
- احتمال الحدث
- الحدث المتمم

Probability

[7- 5 - 1] الاحتمالية

إحتمال الحدث E : هو قياس فرص حدوثه بالتحقيق ويكتب احتمال الحدث E بصورة $P(E)$ ويمكن التعبير عنه بكسر عشري يقع بين 0 ، 1 أو كسر أو نسبة مئوية.

فإذا كان $P(E) = 0$ فالحدث مستحيل وإذا كان $P(E) = 1$ فالحدث مؤكد.

يمكن أن نجد احتمال حدوث الحدث E بأستعمال العلاقة الآتية : $P(E) = \frac{m}{n}$

إذ m عدد النتائج التي يحققها الحدث E .

n عدد النتائج الممكنة كلها في التجربة الواحدة .

مثال 1) في فقرة تعلم ،

الطريقة الأولى : بما أن الحرف A يمثل نصف القرص ، فإن التقدير المعقول لأن يأتي المؤشر على

الحرف A هو : $P(A) = \frac{1}{2}$

بما ان الحرفان C ، B يمثل كل منهما ربع القرص

فان التقدير لأن يأتي المؤشر على الحرف B أو C هو:

$$P(C) = \frac{1}{4} , P(B) = \frac{1}{4}$$


الطريقة الثانية: من الشكل يلاحظ أنه متكون من 4 أرباع أي أن $n=4$

الجزء A من القرص يمثل ربعين أي أن $m=2$ ، $P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0.5 = 50\%$

الجزء B او C من القرص يمثل ربعاً واحداً أي أن $m=1$ ، $P(B) = P(C) = \frac{1}{4} = 0.25 = 25\%$

مثال 2) صندوق فيه 10 بطاقات خضراء ، و3 بطاقات بيضاء. سحبت جمانة بطاقة خضراء من دون

إعادتها الى الصندوق ، ثم سحبت أختها سالي بطاقة بيضاء . ماأحتمال السحب لكل منهما ؟



يحتوي الصندوق على 10 بطاقات خضراء + 3 بطاقات بيضاء أي 13 بطاقة

أحتمال سحب جمانة بطاقة خضراء هو : $\frac{10}{13} = \frac{\text{عدد البطاقات الخضراء}}{\text{العدد الكلي للبطاقات}}$ (خضراء) P

لأن البطاقة المسحوبة لم ترجع الى الصندوق ، هذا يعني أن في الصندوق الآن 12 بطاقة.

إحتمال سحب سالي بطاقة بيضاء هو : $\frac{1}{4} = \frac{3}{12} = \frac{\text{عدد البطاقات البيضاء}}{\text{العدد الكلي للبطاقات}}$ (بيضاء) P

Complement Event

[2 - 5 - 7] الحدث المتمم

الحدث المتمم: يقال للحدثين E_1, E_2 متتامان، إذا كانت كل نتائج الحدث E_1 لاتحقق نتائج الحدث E_2 .

فإذا كان أحتمال حدوثهما هو: $P(E_1), P(E_2)$ فإن $P(E_1) + P(E_2) = 1$

مثال 3) حدثان متتامان ، إذا كان $P(E_2) = \frac{2}{5}$ فجد $P(E_1)$ ثم أكتبه بوصفه نسبة مئوية وكسراً عشرياً.

$$P(E_1) + P(E_2) = 1$$

$$P(E_1) + \frac{2}{5} = 1$$

$$P(E_1) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

$$= \frac{3}{5} \times \frac{20}{20} = \frac{60}{100} = 60\%$$

$$= \frac{3}{5} \times \frac{2}{2} = \frac{6}{10} = 0.6$$

بما أن E_2, E_1 حدثان متتامان فإن :


$$P(E_2) = \frac{2}{5}$$

العلاقة بين الجمع والطرح

لكتابته بنسبة مئوية فجعل مقام الكسر يساوي 100

لكتابته بكسر عشري فجعل مقام الكسر يساوي 10

مثال 4) سلة فيها 3 كرات زرق ، 7 كرات حمراء . سحبت كرة عشوائية ، احتمال أن تكون الكرة زرقاء



هو $\frac{3}{10}$ ما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة غير زرقاء ؟

أفرض أن : $P(E_1) = \frac{3}{10}$ احتمال الكرة الزرقاء

أفرض أن : $P(E_2)$ احتمال الكرة المسحوبة ليست الزرقاء

$$P(E_1) + P(E_2) = 1$$

$$\frac{3}{10} + P(E_2) = 1$$

$$P(E_2) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10} = 0.7 = 70\%$$

$$\frac{7}{10} \text{ أو } 0.7 \text{ أو } 70\%$$

الحدثان متتامان أي أن:

$$P(E_1) = \frac{3}{10}$$

العلاقة بين الجمع والطرح

لذا احتمال أن تكون الكرة المسحوبة غير زرقاء هو

تأكّد من فهمك

لدينا البطاقات المجاورة 1 2 3 4 5 6 7 8 جد أحتمال ما يأتي:

الأسئلة : (1 - 6)
مشابه للأمثلة (1.2)



1 البطاقة تحمل رقم زوجي.

2 البطاقة تحمل رقم غير أولي.

3 البطاقة تحمل رقم يقبل القسمة على 5.

في تجربة رمي حجرالنرد مرة واحدة أكتب أحتمال :

4 ظهور عدد يقبل القسمة على 3 .

5 ظهور العدد 7 .


6 ظهور الأعداد المحصورة بين 2 ، 6 .

7 إذا كان أحتمال ظهور عدد فردي في رمي حجرالنرد مرة واحدة هو $\frac{1}{2}$ فما أحتمال ظهور عدد زوجي؟

8 إذا كانت الأحداث E_1, E_2, E_3 متتامات ، وكان $P(E_1) = \frac{2}{3}$ ، $P(E_3) = \frac{1}{4}$ ، فما قيمة $P(E_2)$ ؟

9 استعمل القرص المجاور وجد أحتمال كل نتيجة ممكنة ثم تحقّق :

الأسئلة : (7 - 9)
مشابه للأمثلة (3.4)



النتيجة	أصفر	أخضر	أزرق
الأحتمال			

تدرّب وحلّ التمرينات

سلة تحتوي على 10 كرات حمراء ما أحتمال سحب :

10 كرة حمراء واحدة؟

11 كرة غير حمراء؟

12 ثلاث كرات حمراء؟

13 كرات تحمل الأعداد من 1 الى 20 ، إذا كان E_1 ليس من مضاعفات العدد 4 جد أحتمال E_2 الذي يمثل

مضاعفات العدد 4 بطريقتين.

بين الجدول أحتمال ظهور رقم بعد رمي حجرالنرد ، جد ناتج أحتمال كل حدث:

14 ظهور عدد لا يقبل القسمة على 3.

15 ظهور عدد أصغر من 4.

16 ظهور العدد 6.

17 ظهور الأعداد بين 3 ، 6 .

الحدث	1	2	3	4	5	6
الأحتمال	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

تدرب وحل مسائل حياتية



18 **لعبة** : تريد تمارة الجلوس على كرسي من بين 8 كراسي مرقمة من 1 الى 8 . ما احتمال جلوس تمارة على كرسي يحمل رقم زوجي؟



19 **مواصلات** : ينتظر مهند الباص بين 5 باصات تحمل الأرقام من 1 الى 5 ما احتمال ركوب مهند باصاً يحمل رقم أصغر من 4 ؟

20 **حجر نرد**: رمي حجر النرد مرة واحدة . ما احتمال ظهور عدد غير 6 ؟

كيس فيه 8 خرزات صفراء، 3 خرزات بيض، 5 خرزات زرق، أدا سحبت بشكل عشوائي خرزة من الكيس :



21 ما احتمال أن تكون الخرزة المسحوبة زرقاء اللون ؟

22 ما احتمال أن تكون الخرزة المسحوبة صفراء اللون ؟

23 ما احتمال أن تكون الخرزة المسحوبة غير بيضاء اللون ؟ بطريقتين.

24 **رياضة** : توقع مدرب أن يفوز فريقه في مباراة كرة القدم بنسبة 85% أكتب ككسر في أبسط صورة احتمال خسارة فريقه .



25 **طقس**: تتوقع شهد أن يوم غداً صحو هو 25% . جد بشكل كسر احتمال

النتيجة	صحو	غائم
الاحتمال		

كل نتيجة فيما يأتي:


فكر

26 **تفكير ناقد**: أخبرت بأمكانية وقوع 4 أحداث فقط . احتمال الحدث الأول $\frac{1}{4}$ واحتمال الحدث الثاني $\frac{1}{2}$. فإذا كان احتمال الحدث الثالث والرابع متساويين . فما احتمال الحدث الرابع ؟

27 **فواكه** : يوجد في سلة 4 برتقالاتٍ . سحبت برتقالتين أحدهما بعد الأخرى دون إعادة البرتقالة الأولى والثانية . فما احتمال كل حدث؟

28 **أكتشف الخطأ** : دوّر القرص أدناه مرتين ، احتمال أن يقف المؤشر على عدد فردي في المرة الأولى

$\frac{3}{5}$ وفي المرة الثانية $\frac{2}{5}$ أيهما أصح ؟



29 **تحذّر**: اكتب كل الأحداث الممكنة في فضاء عينة تتألف من 3 نتائج A.B.C .

أكتب

مثالاً على حدث احتمال صفراً وآخر احتمال واحد.



تَعَلَّم

يتدرب لاعب كرة القدم على تحسين أدائه في تسجيل أهداف في ضربات الجزاء . فقد سجل 20 هدفاً من 25 ضربة جزاء. نلاحظ من هذين العددين أنه سجل أهداف أكثر مما أخطأها. كيف يمكنك أن تقدر احتمال أصابة الهدف في الضربة المقبلة ؟

فكرة الدرس

- حساب الاحتمال النظري
- حساب الاحتمال التجريبي
- المفردات
- الاحتمال النظري
- الاحتمال التجريبي
- فضاء العينة

حُدِّد الاحتمال في فقرة تعلم عن طريق اجراء التجربة، وتسمى الاحتمالات التجريبية . أما الاحتمالات النظرية فأنها تزودنا بنتائج التجربة دون الحاجة الى إجرائها فيكون :

الاحتمال التجريبي: فيه تقدر أرجحية الحدث بتكرار تجربة مرات عدة، ثم عد المرات التي يتحقق فيها الحدث

$$\text{الاحتمال التجريبي} \approx \frac{\text{عدد المرات التي يتحقق فيها الحدث}}{\text{العدد الكلي للتجارب}}$$

الاحتمال النظري: يستعمل لتقدير احتمالات الحدث . بأستعمال قوانين العد دون اللجوء الى تكرار التجربة .

وعندما تكون كل النتائج الممكنة متساوية في احتمال حدوثها

$$\text{الاحتمال النظري} = \frac{\text{عدد النتائج التي تحقق فيها الحدث}}{\text{عدد النتائج الممكنة كلها}} \text{ (عدد عناصر فضاء العينة)}$$

مثال 1) في فقرة تعلم ، احتمال اصابة الهدف في الضربة المقبلة $\frac{20}{25}$ أي $\frac{4}{5}$.

مثال 2) بعد إطلاق مؤشر القرص 20 مرة ، سُجِلت النتائج في الجدول أدناه


النتيجة	C	B	A
عدد الأصابات	5	5	10

i) هل هذا الاحتمال نظري أم تجريبي ؟

ii) جد احتمال أن يأتي المؤشر على الحرف A .

i) هذا الاحتمال تجريبي ، لأنه يعتمد على تكرار التجربة (20 مرة) .

$$\text{ii) الاحتمال التجريبي} \approx \frac{\text{عدد المرات التي أصيب الحرف A}}{\text{العدد الكلي لتجربة}}$$



$$P(A) \approx \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$$

لذا الاحتمال التجريبي بأن يأتي المؤشر على الحرف A هو: $\frac{1}{2}$ أو 0.5 أو 50%

مثال 3)

سحب محمد كرة من صندوق يحتوي على 50 كرة : 20 كرة حمراء ، 17 كرة بيضاء ،

13 كرة صفراء .

i) هل هو احتمال نظري أم احتمال تجريبي ؟

ii) جد احتمال كون الكرة المسحوبة صفراء .

الاحتمال نظري ، لأن كل النتائج متساوية في احتمال حدوثها . ثم لا توجد حاجة لتكرار التجربة .

عدد عناصر فضاء العينة (50) عدد الكرات في الصندوق)

الاحتمال النظري = $\frac{\text{عدد النتائج التي تحقق فيها الحدث}}{\text{عدد النتائج الممكنة كلها}} = \frac{\text{عدد الكرات الصفراء}}{\text{عدد الكرات الكلي}}$

أحتمال سحب كرة صفراء هو: $P(A) = \frac{\text{عدد الكرات الصفراء}}{\text{عدد الكرات الكلي}}$

$$P(A) = \frac{13}{50}$$

عوض عدد الكرات الصفراء 13. العدد الكلي للكرات 50

لذا أحتمال سحب كرة صفراء هو $\frac{13}{50}$ أو 0.26 أو 26%

مثال 4)

أستعمل الجدول المجاور الذي يبين نتائج رمي قطعتي نقود 8 مرات ، وأجب عما يأتي:

النتائج	التكرار
H . H	3
H . T	2
T . H	1
T . T	2

i) ما الاحتمال النظري للحصول على صورتين؟

ii) ما الاحتمال التجريبي للحصول على صورتين؟

فضاء العينة لرمي قطعتي نقود مرة واحدة 1 هو:

{H . H (.) H . T (.) T . H (.) T . T (.)}

عدد عناصر فضاء العينة يساوي 4

i) (عدد مرات ظهور H . H) هي مرة واحدة عند رمي قطعتي نقود.

$$P(H . H) = \frac{\text{عدد ظهور } H . H}{\text{عدد عناصر فضاء العينة}} = \frac{1}{4}$$

اذن الاحتمال النظري = $\frac{1}{4}$ أو 0.25 أو 25%

ii) (عدد مرات ظهور H . H) هو ثلاث مرات عند رمي قطعتي نقود ثماني مرات. (تكرار التجربة)

$$P(H . H) \approx \frac{\text{عدد ظهور } H . H}{\text{العدد الكلي للتجربة}} = \frac{3}{8}$$

لذا الاحتمال التجريبي $\approx \frac{3}{8} = 0.375 = 37.5\%$

تأكّد من فهمك

1 سحبت كرة عشوائياً من صندوق ثم أعيدت إليه ، يبين الجدول التالي النتائج بعد 50 سحبة ، قدر

النتيجة	أخضر	أحمر	أصفر	أزرق
السحوبات	5	13	12	20

احتمال سحب كرة حمراء .مانوع الأَحتِمال ؟

(الأسئلة : 1-7)
(مشابه للأمثلة) 1-4)

رميت حجر النرد مرة واحدة جد:



2 أحتِمال أن يكون العدد الذي يظهر أكبر من 2.

3 أحتِمال الحصول على عدد زوجي .

4 أحتِمال الحصول على عدد أولي .

5 أحتِمال الحصول على عدد يقبل القسمة على 6 .

6 مانوع الأَحتِمالات السابقة نظرية أم تجريبية؟

7 في لعبة كرة السلة ، أصاب لاعب السلة 15 مرة من 25 رمية ، ما الاحتمال لأن يصيب اللاعب السلة

في الرمية التالية ؟ ومانوع الاحتمال ؟ أكتب الاحتمال بالكسر العشري والاعتيادي والنسبة المئوية.

تدرب وحلّ التمرينات

رميت حجر النرد مرة واحدة جد:



8 أحتِمال أن يكون العدد فردي .

9 أحتِمال الحصول على عدد غيرأولي .

10 أحتِمال الحصول على عدد يقبل القسمة على 4 .

11 مانوع الأَحتِمالات السابقة نظرية أم تجريبية؟

12 سحب مهند قرص من علبة تحتوي على 3 أقراص حمراء ، 4 أقراص صفراء ، 4 أقراص سوداء .

ما أحتِمال أن يكون القرص المسحوب أصفر؟

13 أراد شخص احصاء أنواع السيارات عند احد التقاطعات ، من بين 20 سيارة شاهدها أحصى 5

شاحنات، 3 سيارات رياضية ، 12 سيارة صالون . ماأَحتِمال أن تكون السيارة التالية شاحنة ؟

في صف لحنة الرياضة ، 6 طلاب لكرة السلة ، 8 طلاب لكرة القدم . يختار المدرس بشكل عشوائي أحد

الطلاب ، جد احتمال:



14 أن يختار طالب ليلعب في فريق كرة السلة.

15 أن يختار طالب ليلعب في فريق كرة القدم.

تدرب وحل مسائل حياتية



16 **زراعة:** لدى طارق كيس فيه 120 بذرة زهور حمراء وصفراء، فإذا كان

30 % بذور زهور صفراء، ونشر طارق البذور في حديقته . بعد أسبوعين

لاحظ ظهور أول النباتات ما احتمال أن تكون النبتة زهرة حمراء؟



17 **رياضية:** في تدريب على كرة السلة . أصاب محمد السلة 13 مرة

من 30 رمية . ما احتمال أن يصيب محمد السلة في الرمية التالية ؟ مانوع الاحتمال

18 **وقت:** أجريت دراسة على 250 شخص للوقوف على طريقة معرفتهم الوقت

عدد الأشخاص	الأسلوب
75	ساعة يد
30	ساعة حائط
145	ساعة هاتف

أستعمل الجدول المجاور وجد احتمال أن يستعمل الشخص هاتفه المحمول ف

19 **طقس:** يمثل الجدول أدناه درجات الحرارة خلال أسبوع في أحد فصول السنة.

اليوم	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
درجة الحرارة	15	29	25	21	16	18	20

20 ما احتمال أن تكون درجة الحرارة أقل من 20°C في اليوم التالي ؟ بين نوع الاحتمال.

مطعم: دخل 10 أشخاص أحد مطاعم الكباب، 6 منهم طلبوا كباباً ما الاحتمال التجريبي في أن لا يطلب

الشخص التالي كباباً ؟

فكر

21 **مسألة مفتوحة:** أجريت دراسة إحصائية على 30 شخصاً عن لونهم المفضل من الألوان :

(الأزرق ، الأحمر ، الأخضر ، الأبيض) . أعمل جدولاً لكل النتائج الممكنة إذا كان $\frac{2}{5}$ هو الاحتمال

التجريبي لأن يكون اللون المفضل هو اللون الأزرق .

22 **تحديد:** وجدت دراسة إحصائية أن 75 طالباً من أصل 200 لديهم حذاء أسود وأن 280 طالباً من أصل

400 لديهم جواريب بيضاء . فما احتمال أن يكون لدى الطالب حذاء أسود وجواريب بيضاء معاً؟

23 **أكتشف الخطأ:** كيس فيه خمس كرات صفراء، 7 كرات بيضاء، كم كرة صفراء تضاف إلى الكيس ليكون

احتمال سحب كرة بيضاء هو $\frac{1}{2}$. فقالت جمانة نضيف 6 كرات صفراء، وقالت أختها سالي نضيف كرتين

صفراوين . أيتهما جوابها صحيح؟

أكتب

مسألة عن تجربة شاهدها أو عشتها تتضمن سؤالاً عن الاحتمال التجريبي.



تَعَلَّم

طول ملعب 100 متر، فإذا ركض محمد 25 متراً الى الأمام و5 أمتار الى الخلف فكم مرة عليه أن يكرر العملي حتى يصل الى نهاية الملعب؟

فكرة الدرس

أحل مسألة بأستعمال (تمثيل المسألة)

أفهم

ما معطيات المسألة؟ ملعب طوله 100 متر، يركض محمد الى الأمام 25 مترويرجع الى الخلف 5 أمتار. ما المطلوب من المسألة؟ كم مرة أخرى عليه أن يكرر العملية حتى يصل الى نهاية الملعب.

خطط

كيف تحل المسألة؟

أمثل المسألة على مستقيم الأعداد .

حل

أرسم مستقيم الأعداد وأقسمه على أقسام مناسبة الطول.



25 متراً الى الأمام ، 5 أمتار الى الخلف

$$25 - 5 = 20 \text{ m}$$

$$100 \div 20 = 5$$

أي في كل مرة يقطع

العدد الكلي لمرات التكرار

تحقق

تأكد من صحة حلك: نضرب طول المسافة التي يقطعها في كل مرة في 5 :

$$20 \times 5 = 100 \text{ m}$$

مسائل



1 أشتري أحمد كتاب بمبلغ 25 ألف و500 دينار . فإذا دفع أحمد 30 ألف دينار . فكم يمكن أن يسترد الباقي إذا كان لدى البائع قطع نقدية من الفئتين 1000 دينار و500 دينار؟



2 يركض لاعب في كل مرة 8m ويتراجع 2m فإذا كانت المسافة الواجب قطعها 60m . فكم مرة يكرر الركض ليقطع المسافة كاملة؟



3 أرادت جمانة أن ترتب خمسة كتب لديها على الرف . بحيث يكون كتاب الرياضيات أولها وكتاب اللغة العربية في آخرها . فبكم طريقة يمكن ترتيب الكتب الخمسة على الرف؟

4 يقف مهند ومحمد وأحمد ومحمود في خط مستقيم . فبكم طريقة يمكن ترتيبهم إذا وقف مهند في بداية الخط المستقيم؟



5 في اختبار الرياضيات اعتمد طريقة القاء قطعة معدنية لحل (5) أسئلة من نوع الخطأ والصواب . هل هذه الطريقة جيدة للحصول على درجة جيدة في الاختبار؟

تمريبات الفصول

- 1 الفصل الأول : الاعداد النسبية
The Rational Numbers
- 2 الفصل الثاني : الاعداد الحقيقية
The Real Numbers
- 3 الفصل الثالث : الحدوديات
polynomials
- 4 الفصل الرابع : المعادلات والمتباينات
Inequalities and Equations
- 5 الفصل الخامس : الهندسة والقياس
Geometry and Measurement
- 6 الفصل السادس : الهندسة الإحداثية
Coordinate Geometry
- 7 الفصل السابع : الأحصاء والأحتمالات
Statistics and Probabilities

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

الدرس [1-1] ترتيب العمليات على الأعداد النسبية

استعمل جمع وطرح الأعداد النسبية لتكتب كل مقدار بأبسط صورة:

1 $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{5} - \frac{6}{15} = \dots$ a($\frac{15}{47}$ b($-\frac{15}{47}$ c($\frac{47}{15}$ d($-\frac{47}{15}$

2 $6.13 - 5.02 + 1.5 = \dots$ a(2.16 b(2.61 c(-2.16 d(2.61

استعمل ضرب وقسمة الأعداد النسبية لتكتب كل مقدار بأبسط صورة:

3 $1\frac{1}{4} \times (-2\frac{1}{2}) \div 3\frac{4}{2} = \dots$ a($\frac{5}{8}$ b($-\frac{5}{8}$ c($\frac{8}{5}$ d($-\frac{8}{5}$

4 $4.3 \times 1.2 \div (-0.4) = \dots$ a(12.9 b(-12.95 c(19.20 d(-12.90

استعمل ترتيب العمليات على الأعداد النسبية لتكتب كل مقدار بأبسط صورة:

5 $\frac{-2}{6} \times \frac{12}{-3} - \frac{1}{3} \times \frac{15}{2} = \dots$ a($-\frac{7}{6}$ b($\frac{6}{7}$ c($\frac{7}{6}$ d($-\frac{6}{7}$

6 $\frac{1}{9} \div \frac{5}{36} \times \frac{1}{-2} + \frac{7}{2} = \dots$ a($-\frac{31}{10}$ b($\frac{31}{10}$ c($\frac{10}{31}$ d($-\frac{10}{31}$

الدرس [1-2] القوى (الأسس) السالبة والصورة العلمية للعدد

1 4^{-2} a($\frac{-1}{8}$ b($\frac{-1}{16}$ c($\frac{1}{8}$ d($\frac{1}{16}$

2 $7^{(-2 -)} - 1(4 + 1^{-7} - \frac{1}{7} = \dots$ a($\frac{-6}{49}$ b($\frac{-114}{49}$ c($\frac{6}{49}$ d($\frac{114}{49}$

اكتب الأعداد التالية بالصورة الرقمية:

3 $3.4 \times 10^5 = \dots$ a(300040 b(300400 c(304000 d(340000

4 $2.51 \times 10^{-3} = \dots$ a(0.00251 b(0.00215 c(0.00125 d(0.00512

اكتب الأعداد التالية بالصورة العلمية:

5 $52100 = \dots$ a(5.21×10^3 b(5.21×10^4 c(5.21×10^5 d(5.21×10^6

6 $0.0035 = \dots$ a(3.5×10^{-6} b(3.5×10^{-5} c(3.5×10^{-4} d(3.5×10^{-3}

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

الدرس [1-3] خصائص القوى (الأسس)

اضرب واقسم واكتب ناتج الضرب وناتج القسمة كقوة واحدة:

1 $7^4 \times 7^{-4} \times 7^0 = \dots$ a(7^{-1}) b(7^0) c(-7^0) d(-7^{-1})

2 $4^{-2} \times 16^{-2} \times (-32)^2 = \dots$ a(-2^{-4}) b(2^{-4}) c(2^{-7}) d(-2^{-2})

3 $\frac{-27^{(2)}}{-9^{(3)}} = \dots$ a(3^{-12}) b(-3^{-12}) c(-1) d(1)

4 $\frac{-32^{(0)}}{-2^{(3)}} = \dots$ a(-2) b(0) c($-2^{(-3)}$) d(2^2)

بسط وأكتب القسمة بوصفه قوة واحدة:

5 $\frac{-5^3 \times 4^3}{4^2 \times 5^6} = \dots$ a($\frac{5^{-3}}{2^2}$) b($\frac{5^3}{2^{-2}}$) c($\frac{2^2}{5^3}$) d($-\frac{2^2}{5^3}$)

6 $\frac{7^{-6} \times 7^0 \times 9^{-2}}{-7^{(2)} \times 3^2 \times -1^{(0)}} = \dots$ a($\frac{7^{-8}}{-3^6}$) b($\frac{7^{-8}}{3^6}$) c($\frac{3^{-6}}{7^8}$) d($-\frac{3^2}{7^8}$)

الدرس [1-4] الكسور الدورية والصورة العلمية للعدد (باستعمال الحاسبة)

استعمل الحاسبة لتكتب الناتج على صورة كسر عشري:

1 $\frac{3}{8} + \frac{5}{9} = \dots$ a($0.390\overline{5}$) b($0.930\overline{5}$) c($0.590\overline{3}$) d($0.903\overline{5}$)

2 $\frac{8}{9} \times \frac{36}{48} \div \frac{-6}{21} = \dots$ a($2.\overline{3}$) b($-2.\overline{3}$) c($3.\overline{2}$) d($-3.\overline{2}$)

استعمل الحاسبة لتكتب ناتج الضرب والقسمة بالصورة العلمية:

3 $4.2 \times 10^5 \div 3.6 \times 10^{-4} = \dots$

a(1.251×10^2) b(1.152×10^2) c(1.512×10^2) d(1.125×10^2)

4 $\frac{6.25 \times 10^{-7}}{2.5 \times 10^6} = \dots$

a(2.5×10^{13}) b(2.5×10^{-1}) c(2.5×10^{-13}) d(2.5×10)

اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يأتي:

الدرس [1-5] تبسيط الجمل العددية الكسرية

بسّط الجمل العددية الكسرية التالية واكتب الناتج بأبسط صورة:

1 $\frac{\sqrt[3]{-1}}{7} \times \frac{|-35|}{10} + \frac{2}{7} \times \frac{-21}{\sqrt[3]{8}} = \dots\dots$ a) $-\frac{7}{2}$ b) $-\frac{5}{2}$ c) $\frac{2}{7}$ d) $-\frac{2}{5}$

2 $\frac{4}{\sqrt{81}} \div \frac{|-20|}{10} - \frac{\sqrt[3]{-27}}{12} \div \frac{-3}{8} = \dots\dots$ a) $-\frac{4}{9}$ b) $\frac{4}{9}$ c) $\frac{9}{4}$ d) $-\frac{9}{4}$

3 $\frac{1}{2^3} \times 2^{-5} \div (-1)^{-4} \cdot 2^{-2} = \dots\dots$ a) 2^{-5} b) 2^{-6} c) 2^{-10} d) 2^{10}

بسّط الجمل العددية الكسرية التالية واكتب الناتج بالصورة العلمية:

4 $3.2 \times 10^4 + 0.22 \times 10^5 = \dots\dots$
a) 0.54×10^4 b) 0.45×10^4 c) 0.45×10^5 d) 5.4×10^4

5 $8.3 \times 10^{-6} - 0.57 \times 10^{-3} = \dots\dots$
a) 5.671×10^{-4} b) 5.617×10^{-4} c) 5.617×10^{-3} d) 5.671×10^{-3}

الدرس [2-1] مفهوم الأعداد الحقيقية وتمثيلها على مستقيم الأعداد

صنف العدد من حيث كونه عدداً نسبياً أو غير نسبياً أو غير حقيقي:

1 $\sqrt{13}$ a) عدد نسبي b) عدد طبيعي c) عدد غير نسبي d) عدد صحيح

2 $\sqrt{\frac{4}{36}}$ a) عدد صحي b) عدد غير حقيقي c) عدد غير نسبي d) عدد نسبي

اكتب الجذر التربيعي التالي بأبسط صورة:

3 $\sqrt{\frac{2}{18}}$ a) $\frac{\sqrt{2}}{6}$ b) $\frac{2}{18}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{2}{\sqrt{2}}$

قدر الجذور التربيعية التالية بالتقريب لأقرب عُشر.

4 $\sqrt{5} \approx \dots\dots$ a) -2.2 b) 2.236 c) -2.3 d) 2.23

5 $\sqrt{7.6} \approx \dots\dots$ a) 2.7 b) 2.75 c) 2.275 d) 2.8

رتب الأعداد الحقيقية التالية من الأكبر الى الأصغر:

6 $-\sqrt{17}, -4\frac{1}{5}, -4.02$ a) $(-4.02, -\sqrt{17}, -4\frac{1}{5})$ b) $(-4.02, -4\frac{1}{5}, -\sqrt{17})$
c) $(-\sqrt{17}, -4\frac{1}{5}, -4.02)$ d) $(-4\frac{1}{5}, -\sqrt{17}, -4.02)$

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

الدرس [2-2] خصائص الأعداد الحقيقية

اكتب مثلاً لكل خاصية من الخصائص الآتية:

1 $a+)-a(= 0, \forall a, -a \in \mathbb{R}$ a) $(\frac{5}{\sqrt{7}} + \frac{\sqrt{7}}{5} = 0$ b) $(\frac{5}{\sqrt{7}} +) - \frac{5}{\sqrt{7}}(= 0$

c) $(\frac{5}{\sqrt{7}} + \frac{5}{\sqrt{7}} = 0$ d) $(\frac{5}{\sqrt{7}} +) - \frac{\sqrt{7}}{5}(= 0$

2 $a \times \frac{1}{a} = 1, \forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0$ a) $\frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 1$ b) $(\frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{-1}{\sqrt{3}} = 1$

c) $(\frac{1}{\sqrt{3}} \times \sqrt{3} = 1$ d) $(\frac{1}{\sqrt{3}} \times) - \sqrt{3}(= 1$

جد النظير الجمعي للأعداد الحقيقية الآتية:

3 $7\sqrt{5} - 8$ a) $(7\sqrt{5} + 8$ b) $(-7\sqrt{5} - 8$ c) $(\frac{1}{7\sqrt{5}} - 8$ d) $(-7\sqrt{5} + 8$

4 $-\sqrt{1} - \sqrt{2}$ a) $(1 + \sqrt{2}$ b) $(\sqrt{1} - \sqrt{2}$ c) $(\sqrt{2} - \sqrt{1}$ d) $(-1 - \sqrt{2}$

جد النظير الضربي للأعداد الحقيقية الآتية :

5 $-\sqrt{\frac{1}{12}}$ a) $(2\sqrt{3}$ b) $(\frac{-1}{2\sqrt{3}}$ c) $(-2\sqrt{3}$ d) $(\frac{1}{2\sqrt{3}}$

6 $-6\frac{2}{5} - 3\frac{3}{5}$ a) $(\frac{5}{14}$ b) $(\frac{-5}{14}$ c) $(\frac{1}{10}$ d) $(\frac{-1}{10}$

الدرس [2-3] تبسيط الجمل العددية التي تحتوي على جذور تربيعية

بسط الجمل العددية التالية باستعمال خصائص الأعداد الحقيقية :

1 $7\sqrt{20} - 3\sqrt{45}$ a) $(23\sqrt{5}$ b) $(5\sqrt{5}$ c) $(-23\sqrt{5}$ d) $(-5\sqrt{5}$

2 $\sqrt[3]{-27} \cdot \sqrt{7} + 1^3(+7\sqrt{7}$ a) $(4\sqrt{7} - 9$ b) $(10\sqrt{7} - 3$ c) $(10\sqrt{7} - 9$ d) $(4\sqrt{7} - 3$

بسط الجمل العددية التالية باستعمال خاصية تنسيب المقام :

3 $\frac{\sqrt{98} - \sqrt{18}}{3\sqrt{24}}$ a) $(\frac{3}{2\sqrt{3}}$ b) $(\frac{2}{3\sqrt{3}}$ c) $(\frac{2}{3\sqrt{2}}$ d) $(\frac{3}{2\sqrt{2}}$

4 $\frac{10\sqrt{6}}{\sqrt{48}} \div \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{49}}$ a) $(\frac{2}{7}$ b) $(-\frac{7}{2}$ c) $(\frac{7}{2}$ d) $(-\frac{2}{7}$

اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يأتي:

الدرس [2-4] تطبيقات على نظرية فيثاغورس

جد الجذرين التربيعين الموجب والسالب للأعداد الآتية :

- 1 49 a($\pm\sqrt{7}$ b(± 7 c($\sqrt{7}$ d(-7
- 2 225 a($\sqrt{15}$ b($\pm\sqrt{15}$ c(± 15 d(15
- 3 6.25 a(± 2.5 b(± 5.2 c(± 2.25 d(± 22.5

جد طول الضلع القائم إذا علمت أن طول الوتر والضلع القائم لكل مثلث ما يأتي:

- 4 3 cm, 5 cm, ? a($\sqrt{4}$ b(4 c($-\sqrt{4}$ d(-4
- 5 4 cm, $\sqrt{65}$ cm, ? a($\sqrt{7}$ b(-7 c($-\sqrt{7}$ d(7

الدرس [2-5] المستوى الإحداثي

عند تمثيل جدول قيم الدالة التالي في المستوى الإحداثي فإن الشكل الهندسي الذي يمثله

هو:

1

X	4	-4	-4	4
Y	4	-4	4	-4

2

X	2	-4	-3	2
Y	3	3	0	0

- a(مستطيل b(مثلث c(مربع d(شبه منحرف
- a(متوازي اضلاع b(مستطيل c(مربع d(شبه منحرف

مثل كل زوج من الزوجين المرتبين التاليين في المستوى الإحداثي ثم جد المسافة بينهما

مقربة لأقرب عُشر إذا كانت لا تمثل عدداً صحيحاً :

- 3 $\{-4, 0, 5\}$ a(6.3 b(6 c(4.6 d(6.4
- 4 $\{3, 3, -3, -3\}$ a(8.4 b(5.8 c(8.5 d(8
- 5 $\{0, 0, 6, -5\}$ a(7 b(6 c(7.8 d(6.7

اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يأتي:

الدرس [3-1] جمع المقادير الجبرية وطرؤها

حل المقادير الجبرية التالية باستعمال الجمع :

1 $(\sqrt{5}y^2x^2 + 6(+)3\sqrt{5}x^2y^2 + 9y + 4)$ a($4\sqrt{5}y^2x^2 + 10$

b($2\sqrt{5}y^3x^2 + 9y + 10$ c($4\sqrt{5}y^3x^2 + 10y$ d($4\sqrt{5}y^2x^2 + 9y + 10$

2 $(-2|z^2w + 4k + \sqrt{7}(+)10|z^2w - 10k + 2\sqrt{7}($ a($8z^2w + 6k + 3\sqrt{7}$

b($-12z^2w - 6k + 3\sqrt{7}$ c($12z^2w - 6k + 3\sqrt{7}$ d($-12z^2w - 14k + 3\sqrt{7}$

حل المقادير الجبرية التالية باستعمال الطرح:

3 $(\sqrt{13}g^3h^4 + z^2 + 20(-)5\sqrt{13}g^3h^4 - 4z^2 + 12)$ a($4\sqrt{13}g^3h^4 + 5z^2 + 22$

b($4\sqrt{13}g^3h^4 + 3z^2 + 8$ c($-4\sqrt{13}g^3h^4 - 5z^2 + 20$ d($-4\sqrt{13}g^3h^4 + 5z^2 + 8$

4 $(-24|yz + 2x^2 + 12(-)6yz - 15x^2 - 4)$ a($30yz + 13x^2 + 16$

b($-18yz - 13x^2 + 8$ c($18yz + 17x^2 + 16$ d($18yz - 13x^2 + 16$

الدرس [3-2] ضرب حد جبري في مقدار جبري

جد ناتج الضرب لكل ما يأتي:

1 $(-25x^2y^2z)(4xy)$ a($-100x^3y^3$ b($100x^3y^3z$ c($100x^2y^2z$ d($-100x^3y^3z$

2 $(\frac{7}{2}z^2w^2)(\frac{3}{9}zw^3)$ a($\frac{21}{18}z^2w^6$ b($\frac{7}{6}z^3w^5$ c($\frac{7}{6}z^3w^6$ d($\frac{7}{6}z^2w^5$

3 $(\sqrt{5}h^2k^2)(\sqrt{5}h^2k^3)$ a($5h^4k^5$ b($5k^5$ c($5k$ d($5k^6$

4 $(-3|g^3h)(4|g^4h^2)$ a($-12gh$ b($-12g^7h^2$ c($12g^7h^3$ d($12g^7h$

5 $(\frac{1}{2}m^2n^2)(4mn + 8)$ a($4m^3n^3 + 16mn$ b($2m^3n^3 + 4$

c($4mn + 4m^2n^2$ d($4m^3n^3 + 4m^2n^2$

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

الدرس [3-3] ضرب المقادير الجبرية

جد ناتج الضرب لكل مما يأتي:

- 1) $x-5$ ($x+5$ (a($x^2+ 25$ b($x^2- 25$ c($x^2 -10x +25$ d($x^2 +5x -25$
- 2) $z-\sqrt{5}$ () $z+\sqrt{5}$ (a($z^2 -5$ b($z^2 +5$ c($z^2+\sqrt{25}z +5$ d($z^2- \sqrt{25}z -5$
- 3) $-4|gh -3$ () $4 gh+3$ (a($16g^2h^2 +gh +9$ b($16g^2h^2 -gh +9$
c($16g^2h^2 +9$ d($16g^2h^2 -9$
- 4) $\frac{1}{2}x -3$ ($\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x + 9$ (a($8x^3 + 27$ b($\frac{1}{8}x^3 + 27$
c($8x^3 - 27$ d($\frac{1}{8}x^3 - 27$
- 5) $2y-1$ () $4y^2+ 2y +1$ (a($8y^3 -1$ b($y^3 -8$
c($8y^3 +1$ d($y^3 +8$

الدرس [3-4] قسمة مقدار جبري على حد جبري

جد ناتج القسمة لكل مما يأتي:

- 1 $\frac{36 z^2 w^2}{9zw}$ a($4z^3 w^3$ b($\frac{1}{4}zw$ c($4zw$ d($\frac{1}{4}z^3 w^3$
- 2 $\frac{81 g^3 h^3}{3g^{-6} h^{-6}}$ a($27g^3 h^3$ b($27g^9 h^9$ c($27g^{-3} h^{-3}$ d($27g^{-9} h^{-9}$
- 3 $\frac{\sqrt{49}x^{-2}y^2}{7x^{-3}y^{-2}}$ a(xy^4 b($7x^{-6}y^4$ c($x^{-6}y^4$ d(xy
- 4 $\frac{5x^2y^2 - 15x^4y^2 + 20x^5y^3}{5x^3y^3}$ a($x^5y^5 -3x^7y^6 +4x^2$ b($\frac{1}{xy} - 3xy^{-1} + 4x^2$
c($x^5y^5 -3xy^5 +4x^2y^6$ d($xy - 3xy +4x^2y$
- 5 $\frac{16m^6n^6 - 32m^7n^6 - 4m^4n^4}{4m^3n^3}$ a($4m^9n^9 - 8m^{10}n^9 - m^7n^7$ b($4m^2n^2 - 8m^4n^3 - mn$
c($4m^3n^3 - 8m^4n^3 - m^7n^7$ d($4m^3n^3 - 8m^4n^3 - mn$

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

الدرس [3-5] تحليل المقادير الجبرية

حلل المقدار الجبري الآتي:

- 1 $81xy + 72x$ a($9x$) $9y+8($ b(9) $9xy-8($ c($9x$) $9xy-9($ d($9x$) $9xy+9($
- 2 $7z^3 - z^2$ a($7z^2$) $z + \frac{1}{7}($ b($7z^2$) $z + 1($
c($7z^2$) $z - \frac{1}{7}($ d(z^2) $z - 1($
- 3 $49g^2h^2+ 21gh$ a($7gh$) $7gh+3($ b($7gh$) $7gh-3($
c(7) $7gh+3($ d(7) $7g^2h^2+3gh+1($
- 4 $11m^3n^2- 44m^2n^2- 121mn$
a(mn) $11m^2n^2- 4mn-1($ b($11mn$) $m^2n^2-4mn-11($
c($11mn$) $m^2n-4mn-11($ d(11) $11m^2n^2-4mn-1($
- 5 $150r^3v^2+ 25rv+75r^2v^2$ a($25rv$) $6r^2v+1 +3rv($ b($25rv$) $6rv+3rv-1($
c($75rv$) $2rv+1($ d($75rv$) $2r^2v+13+rv($

الدرس [4-1] حل معادلات من الدرجة الاولى بتغيير واحد بخطوتين في R

حل المعادلات التالية باستعمال الجمع و الطرح :

- 1 $5x+ 20 = 4x -10$ a($x = 10$ b($x = 30$ c($x = -10$ d($x = -30$
- 2 $|-12| z = \sqrt[3]{-8} +13z$ a($z = 2$ b($z = 4$ c($z = -2$ d($z = -4$
- 3 $\sqrt[3]{27} x+1= |-11|+2x$ a($x = 12$ b($x = -10$ c($x =10$ d($x = -12$

حل المعادلات التالية باستعمال الضرب والقسمة :

- 4 $\sqrt[3]{27} x \div |-5| = 8$ a($x = -\frac{40}{3}$ b($x = \frac{3}{40}$ c($x = \frac{40}{3}$ d($x = -\frac{3}{40}$
- 5 $|-6| h = 81 \div)-3($ a($h = \frac{2}{9}$ b($h = -\frac{9}{2}$ c($h = -\frac{2}{9}$ d($h = \frac{9}{2}$

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

الدرس [4-2] حلّ معادلات من الدرجة الأولى بمتغير واحد بخطوات متعددة في \mathbb{R}

حل المعادلات التالية باستعمال خصائص الأعداد الحقيقية:

1 $|-8| + x = 12 - 2x$ a($x = -\frac{3}{4}$) b($x = -\frac{4}{3}$) c($x = \frac{4}{3}$) d($x = \frac{3}{4}$)

2 $\sqrt[3]{-125} x \div |-5| = 2\sqrt{7} \div 7$ a($x = -\frac{2}{\sqrt{7}}$) b($x = \frac{2}{7}$) c($x = \frac{2}{\sqrt{7}}$) d($x = -\frac{2}{7}$)

3 $\frac{6y}{2 + \sqrt[3]{-27}} = \frac{y}{3}$ a($y = -\frac{1}{17}$) b($y = 0$) c($y = \frac{1}{17}$) d($y = 17$)

حلّ المعادلات الآتية :

4 $|z - 12| = 7$ a($s = \{-19, -5\}$) b($s = \{-19, 5\}$) c($s = \{19, -5\}$) d($s = \{19, 5\}$)

5 $|3y - 20| = \sqrt{36}$ a($s = \{\frac{26}{3}, \frac{3}{14}\}$) b($s = \{\frac{3}{26}, \frac{14}{3}\}$) c($s = \{\frac{26}{-3}, \frac{14}{-3}\}$) d($s = \{\frac{26}{3}, \frac{14}{3}\}$)

6 إن معادلة القيمة المطلقة التي تمثلها البياني على مستقيم الأعداد هي:



a($|x + 4| = 5$) b($|x - 4| = 5$) c($|x + 3| = 5$) d($|x - 3| = 5$)

الدرس [4-3] حل معادلات من الدرجة الثانية بمتغير واحد في \mathbb{R}

حل المعادلات التالية باستعمال الجذر التربيعي :

1 $9y^2 = 1$ a($s = \{\frac{1}{3}, \frac{1}{-3}\}$) b($s = \{\frac{1}{9}, \frac{1}{-9}\}$) c($s = \{\frac{1}{-3}, \frac{1}{-9}\}$) d($s = \{\frac{1}{3}, \frac{1}{9}\}$)

2 $\frac{1}{3}t^2 = 12$ a($s = \{6, 0\}$) b($s = \{-6, 0\}$) c($s = \{2, -2\}$) d($s = \{6, -6\}$)

3 $n^2 - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$
 a($s = \{\sqrt{\frac{8}{5}}, -\sqrt{\frac{8}{5}}\}$) b($s = \{\sqrt{\frac{1}{8}}, -\sqrt{\frac{1}{8}}\}$) c($s = \{\sqrt{\frac{5}{8}}, -\sqrt{\frac{5}{8}}\}$) d($s = \{\sqrt{\frac{5}{8}}, -\sqrt{\frac{8}{5}}\}$)

حل المعادلات التالية باستعمال خاصية الضرب الصفري:

4 $x^2 - x = 0$ a($s = \{0, -1\}$) b($s = \{1, 1\}$) c($s = \{1, -1\}$) d($s = \{0, 1\}$)

5 $\frac{1}{5}r - \frac{1}{\sqrt{5}}r^2 = 0$ a($s = \{0, \frac{1}{5}\}$) b($s = \{0, \frac{-1}{\sqrt{5}}\}$) c($s = \{0, \frac{-1}{5}\}$) d($s = \{0, \frac{1}{\sqrt{5}}\}$)

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

الدرس [4-4] حل المتباينات الجبرية ذات الخطوتين في R

حل المتباينات التالية في R باستعمال خصائص الجمع والطرح :

1 $3y - \sqrt[3]{8} \geq 4y + \sqrt[3]{-27}$ a) $y \leq -1$ b) $y \geq -1$ c) $y \geq 1$ d) $y \leq 1$

2 $4) \frac{1}{4}z + \frac{5}{14} (> 0$ a) $(z > -\frac{10}{7}$ b) $(z > \frac{10}{7}$ c) $(z < \frac{10}{7}$ d) $(z > -\frac{10}{7}$

حل المتباينات التالية في R باستعمال خواص الضرب والقسمة :

3 $\frac{4h}{6} \geq \frac{-8}{21}$ a) $(s = \{h: h \in R, h \leq \frac{4}{7}\}$ b) $(s = \{h: h \in R, h \leq -\frac{4}{7}\}$

c) $(s = \{h: h \in R, h \geq -\frac{4}{7}\}$ d) $(s = \{h: h \in R, h \geq \frac{4}{7}\}$

4 $\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \frac{\sqrt{2}n}{9}$ a) $n \leq \frac{9}{2}$ b) $n \geq \frac{9}{2}$ c) $n \geq \frac{-9}{2}$ d) $n \leq \frac{-9}{2}$

حل المتباينات التالية في R باستعمال خواص المتباينات على الأعداد الحقيقية :

5 $5y + \sqrt[3]{-27} < 3y - \sqrt[3]{8}$ a) $(y \leq \frac{1}{2}$ b) $(y \leq \frac{-1}{2}$ c) $(y \geq \frac{-1}{2}$ d) $(y < \frac{1}{2}$

6 $4) \frac{1}{7} - \frac{3}{12}z \leq 0$ a) $(z \geq \frac{-4}{7}$ b) $(z \leq \frac{7}{4}$ c) $(z \leq \frac{4}{7}$ d) $(z \geq \frac{4}{7}$

الدرس [4-5] حل المتباينات الجبرية متعددة الخطوات في R

حل المتباينات التالية في R باستعمال خصائص المتباينات على الأعداد الحقيقية :

1 $5(y+1) \geq 8 - \sqrt[3]{-125}$ a) $(s = \{y: y \in R, y \leq -\frac{5}{8}\}$ b) $(s = \{y: y \in R, y \leq \frac{8}{5}\}$

c) $(s = \{y: y \in R, y \geq \frac{5}{8}\}$ d) $(s = \{y: y \in R, y \geq \frac{8}{5}\}$

2 $\frac{1}{2}x - \frac{4}{3} (+ \frac{1}{6}x > -\frac{2}{3}$ a) $(x > \frac{4}{3}$ b) $(x < 0$ c) $(x > 0$ d) $(x < \frac{-4}{3}$


3 $2)v - 4\sqrt{5} (< 5)v - \sqrt{5} (<$ a) $(v > -\sqrt{5}$ b) $(v < \sqrt{5}$ c) $(v < -\sqrt{5}$ d) $(v > \sqrt{5}$

4 $\frac{1}{5}z - \sqrt{3} \geq \frac{1}{5})\sqrt{3} - z (<$ a) $(z \geq \sqrt{3}$ b) $(z \leq \frac{2}{\sqrt{3}}$ c) $(z \leq \sqrt{3}$ d) $(z \geq \frac{2}{\sqrt{3}}$

5 $\frac{12}{\sqrt[3]{-27}} - 2r < \frac{1}{3} - r$ a) $(r < \frac{13}{3}$ b) $(r > -\frac{13}{3}$ c) $(r > \frac{3}{13}$ d) $(r < -\frac{3}{13}$

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:


الدرس [5-1] علاقة الزوايا والمستقيمات (نظريات)



1 العلاقة بين الزاويتين 2 و4 في الشكل المجاور :


- a. متجاورتان b. متبادلتان
c. متقابلتان بالرأس d. متناظرتان

2 في الشكل المجاور اذا كان $m \angle 1 = 60^\circ$ فان $m \angle 2$ يساوي



- a. 60° b. 80°
c. 90° d. 120°


3 قياس الزاوية X في الشكل المجاور



- a. 118° b. 18°
c. 90° d. 88°

الدرس [5-2] تطابق المثلثات

1 المثلثان في الشكل المجاور




- a. متطابقان بسبب تطابق ضلعين وزاوية محددة بينهما
b. متطابقان بسبب تطابق اضلعهما الثلاثة

c. غير متطابقان بسبب كون المثلثات لا تتطابق بتطابق زواياها الثلاثة


d. متطابقان بسبب تطابق زاويتين وضلع محدد بهما

2 المثلثان في الشكل المجاور متطابقان لذا فان قيمة X التي تمثل طول الضلع :



- a. 4 cm b. 9 cm
c. 6 cm d. 2 cm

3 قيمة X, Y التي تجعل المثلثان ABC , ACD في الشكل المجاور متطابقان:



- a. $x=3, y=4$ b. $x=4, y=4$
c. $x=3, y=3$ d. $x=4, y=3$

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

الدرس [4-5] متوازي الاضلاع والمعين وشبه المنحرف

1 مساحة متوازي الأضلاع إذا علمت أن طول قاعدته 10cm ، وطول ارتفاعه 16cm يساوي :

- a. 800 cm^2 b. 1600 cm^2 c. 900 cm^2 d. 160 cm^2

2 محيط متوازي الأضلاع طول اثنين من أضلاعه المتجاورة 10cm , 4cm يساوي :

- a. 40 cm b. 20 cm c. 28 cm d. 80 cm

3 مساحة شبه المنحرف الذي طولاً ضلعين متوازيين فيه 10cm , 6cm وارتفاعه 5cm :

- a. 110 cm^2 b. 90 cm^2 c. 100 cm^2 d. 40 cm^2

4 معين مساحته 1500cm^2 وارتفاعه 10cm فان طول ضلعه :

- a. 75 cm b. 150 cm c. 36 cm d. 90 cm

5 متوازي اضلاع طول قاعدته 16cm وارتفاعه نصف طول القاعدة فان مساحته :

- a. 144 cm^2 b. 128 cm^2 c. 80 cm^2 d. 40 cm^2

الدرس [5-5] الاسطوانة والكرة) الخصائص ، المساحة السطحية ، الحجم)

1 اسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطر قاعدتها 14cm وارتفاعها 10cm فان مساحتها الجانبية :

- a. 700 cm^2 b. 820 cm^2 c. 880 cm^2 d. 800 cm^2

2 اسطوانة دائرية قائمة مغلقة طول نصف قطر قاعدتها 7cm وارتفاعها 3cm فان مساحتها الكلية :

- a. $176\pi\text{ cm}^2$ b. $170\pi\text{ cm}^2$ c. $190\pi\text{ cm}^2$ d. $140\pi\text{ cm}^2$

3 اسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطر قاعدتها 6cm وحجمها $360\pi\text{ cm}^3$ فان ارتفاعها :

- a. 16 cm b. 8 cm c. 10 cm d. 5 cm

4 كرة نصف قطرها 3cm فان حجمها :


- a. $36\pi\text{ cm}^3$ b. $18\pi\text{ cm}^3$ c. $24\pi\text{ cm}^3$ d. $72\pi\text{ cm}^3$

5 طول نصف قطر كرة مساحتها السطحية $400\pi\text{ cm}^2$:

- a. 12 cm b. 8 cm c. 10 cm d. 9 cm


اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

الدرس [5-6] مساحة الاشكال المركبة المنتظمة وغير المنتظمة




1 مساحة الشكل المركب المنتظم المجاور تساوي

- a. 47.13 cm^2 b. 18.13 cm^2
c. 74.13 cm^2 d. 90.13 cm^2




2 مساحة الشكل المركب المنتظم المجاور تساوي

- a. 225 cm^2 b. 252 cm^2
c. 522 cm^2 d. 512 cm^2



3 مساحة الشكل المركب المنتظم المجاور تساوي

- a. 175 cm^2 b. 170 cm^2
c. 180 cm^2 d. 215 cm^2



4 المساحة التقريبية لسطح المفتاح في الشكل المجاور

- a. 32 cm^2 b. 30 cm^2
c. 31 cm^2 d. 33 cm^2

5 في الصورة المجاورة خريطة بغداد محاطة بدائرة نصف قطرها

3cm وبمقياس رسم $1:100000$ تكون مساحة مدينة بغداد بصورة

تقريبية باستخراج مساحة الدائرة :



- a. $12\pi \text{ cm}^2$ b. $8\pi \text{ cm}^2$
c. $10\pi \text{ cm}^2$ d. $9\pi \text{ cm}^2$

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

الدرس [1-6] تمثيل جدول دالة محددة في المستوى الاحداثي

1 العلاقة التي مدخلاتها ثابتة ومخرجاتها متغيرة تمثل بيانياً في المستوى الاحداثي بأنها (على أو موازية لـ):

- a. محور السينات b. محور الصادات c. نقطة الاصل d. المحورين السيني والصادي

2 ما يقطعه محمد من مسافة بالكيلومترات في 3 ساعات عند صعوده القطار، علماً أنه يقطع في الساعة

الواحدة 10km:

- a. 5 b. 10 c. 20 d. 30

فإن قيمة X هي:

مدخلة	-1	x	-3
مخرجة	1	2	3

3 إذا كان جدول الدالة:

- a. 3 b. 4 c. -2 d. 9

فإن قيمة X هي:

مدخلة	-1	0	x
مخرجة	2	3	4

4 إذا كان جدول الدالة:

- a. 1 b. 1 c. 2 d. -2

الدرس [2-6] مقدمة في الدوال

1 كل علاقة هي دالة بشرط:

- a. كل مدخلة لها مخرجتان b. كل مدخلة لها مخرجة
c. كل مدخلة لها ثلاث مخرجات d. كل مدخلتين لها مخرجة

2 أي العبارات التالية صحيحة:

- a. كل دالة هي علاقة b. كل علاقة هي دالة c. كل دالة هي علاقة d. كل

علاقتين دالة

3 إذا كانت قاعدة الدالة $7x-1$ ومجموعة العناصر $\{-2,0,2\}$ فإن مجموعة الصوري:

- a. $\{-15,-1,13\}$ b. $\{15,1,13\}$ c. $\{15,-1,13\}$ d. $\{15,-1,-13\}$

4 إذا كانت مجموعة العناصر للدالة $\{4,2,0\}$ وكانت مجموعة الصور $\{3,1,-1\}$ فإن قاعدة الدالة

هي:

- a. $1-x$ b. $-1-x$ c. $x-1$ d. $2-x$

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

الدرس [6-3] الدوال الخطية

1 معادلة المستقيم: هي معادلة تعبر عن الدالة الخطية بالصورة:

- a. $y=4x-1$ b. $y=4x^2-1$ c. $y=\sqrt{4}x-1$ d. $y=\frac{4}{x-1}$

2 أي من الدوال الخطية التالية تمرُّ بنقطة الأصل:

- a. $y=2x-1$ b. $y=2x+1$ c. $y=12-x$ d. $y=2x$

3 الدالة الخطية التي تمر بالربعين الثاني والرابع هي:

- a. $y=13-x$ b. $y=13+x$ c. $y=-3x-1$ d. $y=-3x$

4 عدد طبيعي ضرب بـ 2 ثم طرح منه 4 بعد الضرب فكان الناتج بعد الضرب 50 ما هي المعادلة الخطية

بالنسبة للعدد الطبيعي؟

- a. $2x-4=50$ b. $24-x=50$ c. $42-x=50$ d. $24+x=50$

الدرس [6-4] الأنعكاس والدوران في المستوي الأحداثي

1 إذا كان انعكاس النقطة (2,3) - (هو) -2,-3) فإنَّ خط الانعكاس هو:

- a. محور السينات b. محور الصادات c. محور مائل d. كلاهما

2 المستقيم AB (A)1,3(, B)2,4(إذا أجرى انعكاساً للمستقيم على محور السينات وكانت

(A`1,-3(فإنَّ B` هي:

- a. (2,-4) b. (-2,4) c. (-2,-4) d. (2,4)

3 المثلث ABC (A)1,1(, B)1,3(, C)3,2(أجرى انعكاساً للمثلث ABC على محور السينات فكانت

(A`1,-1(, C`3,-2(فإنَّ B`

- a. (-1,-3) b. (-1,3) c. (1,-3) d. (1,3)

4 صورة النقطة (2,4) - تحت تأثير دوران بزواوية 90° حول نقطة الاصل باتجاه عقارب الساعة:

- a. (-2,-4) b. (4,-2) c. (-4,2) d. (4,2)

5 صورة النقطة (1,3) - تحت تأثير دوران بزواوية 90° حول نقطة الاصل عكس عقارب الساعة:

- a. (1,-3) b. (-3,-1) c. (1,0) d. (3,-1)

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

الدرس [5-6] الأانسحاب في المستوي الأحداثي

1 انسحاب النقطة (2,5) نحو اليمين 3 وحدات :

- a.)0,5(b.)5,5(c.)5,0(d.)2,8(

2 انسحاب النقطة (3,6) نحو الاعلى وحدة واحدة :

- a.)3,7(b.)3,5(c.)4,7(d.)4,6(

3 انسحاب النقطة (3,-3) وحدثان نحو اليمين ووحدة واحدة نحو الاعلى:

- a.)2,5(b.)-5,-2(c.)5,-2(d.)-5,2(

4 انسحاب المثلث ABC (A)1,1(,B)3,1(,C)2,3(فأصبحت (A')1,3(,B')3,3(فما مقدار C' :

- a.)5,2(b.)2,5(c.)6,2(d.)2,6(

5 ما أحداثيات النقطة (x,4) بالانسحاب m وحدة الى الاسفل :

- a.)x-m,y(b.)x+m,y(c.)x,4+m(d.)x,4-m(

الساق	الورقة
0	4 5 6 7 7 8
1	0 2

الدرس [1-7] مقياس النزعة المركزية والمدى

1 الجدول المجاور يمثل إحدى البيانات بطريقة الساق والورقة :

- a. 4 ,5 ,6, 7, 8, 10,12 b. 4 ,5 ,6, 8,12 c. 4 ,5 ,6, 7,7,10,12 d. 4,5 ,6 ,7 ,7, 8, 10,12

2 أي التمثيلات المزدوجة بالساق والورقة تمثل البيانات في الجدول أدناه:

A	3	11	21	33	17
B	10	9	30	11	3

a.

الورقة B	الساق	الورقة A
3 9	0	3
10	1	17
	2	1
0	3	3

b.

الورقة B	الساق	الورقة A
3	0	3
1 0	1	7
0	2	1
0	3	3

c.

الورقة B	الساق	الورقة A
3 0	0	3
1 0	1	1 7
0	2	1
0	3	3

d.

الورقة B	الساق	الورقة A
9	0	3
1	1	7
0	2	1
0	3	3


اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يأتي:

الدرس [7-2] تمثيل البيانات ببيان الشاردين

1 تقسم البيانات بيان الشاردين الى:

- a. قسمين b. ثلاثة أقسام c. أربعة أقسام d. خمسة أقسام

2 بين بيان الشاردين أدناه مقارنة بين وزن نوعين من الحيوانات A, B بالكيلوغرام قيمتا المدى الربيعي للنوعين هما:



- a. A=20, B=10 b. A=40, B=10 c. A=20, B=30 d. A=10, B=20

أرتفاع النباتات		
80	42	55
72	68	78
65	40	52

3 الجدول المجاور يبين أرتفاع نباتات مختلفة بالسنتيمترات . الربع الأعلى

والربع الأدنى هما:

- a. 40,50 b. 55,51 c. 47,75 d. 41,79

الدرس [7-3] التجربة العشوائية

1 تجربة عشوائية تقوم على فعلين عشوائيين . عدد نتائج الفعل الأول يساوي 6 عدد نتائج الفعل

الثاني تساوي 2 . أذن عدد نتائج الفعلين معاً يساوي :

- a. 8 b. 4 c. 3 d. 12

القطعة الأولى	H	H	T	T
القطعة الثانية	H	T	H	T

2 الجدول المجاور يبين رمي قطعتي نقود أي المجموعات التالية

تمثل ظهور وجهين مختلفين على القطعتين؟

- a. {H,T} b. {T,H} c. {H,T,T,H} d. {H,T,T,T}

3 يقدم احد المطاعم 3 أصناف من الطعام بأربعة أنواع من التوابل وهذه الأصناف قد تكون بلحم

الدجاج أو بدونه . عدد خيارات الطعام الممكنة.

- a. 6 b. 12 c. 24 d. 36

الدرس [7-4] الحدث

1 إذا كان E_1 تمثل الحدث (سحب كرة حمراء) E_2 تمثل الحدث (سحب كرة خضراء) دون اعادة الكرة

الحمراء إلى صندوق فيه 5 كرات حمراء. 6 خضراء. الحدثان E_1, E_2 .

- a. لم يكونا حدثاً مركباً b. كونا حدثاً مركباً c. مستقلان d. غير مستقلين

2 اعلن محل للملابس النسائية عن امكانية الحصول على قميص

لون القميص	نوع القطعة
ابيض	تنورة
اسود	بنطلون
احمر	حذاء
	حقيبة يدوية

مجاني عند شراء الزبون إحدى القطع من الجدول المجاور.

افرض: الحدث E_1 شراء تنورة. الحدث E_2 الحصول على قميص

- a. يكونان حدثاً مركباً b. يكونان حدثاً بسيطاً

- c. مستقلان d. مترابطان

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

الدرس [5-7] الاحتمالات

1 صندوق فيه 4 كرات حمراء، 7 كرات بيضاء، 5 كرات زرقاء، سحبت كرتان بيضاويان احدهما بعد الاخرى دون اعادة الكرة الأولى، فإن (الكرة البيضاء الثانية) هو:

- a. $\frac{1}{15}$ b. $\frac{7}{16}$ c. $\frac{6}{15}$ d. $\frac{2}{15}$

2 اذا كان E_1 ، E_2 حدثان متتامين فإن:

- a. $P(E_1) \times P(E_2) = 1$ b. $P(E_1) \div P(E_2) = 1$
 c. $P(E_1) + P(E_2) = 1$ d. $P(E_1) - P(E_2) = 0$

3 النسبة المئوية التي تمثل احتمال ان تسحب بشكل عشوائي بطاقة رقمها غير زوجي من البطاقات المرقمة: 1، 3، 5، 7 هو:

- a. 75% b. 50% c. 25% d. 100%

الدرس [6-7] الاحتمال التجريبي والاحتمال النظري

1 استعمل الجدول المجاور الذي يبين نتائج رمي قطعتي نقود 10 مرات، الاحتمال النظري للحصول على صورة وكتابة هو:

النتائج	التكرار
H , H	2
H , T	3
T , H	4
T , T	1

- a. $\frac{3}{10}$ b. $\frac{7}{10}$ c. $\frac{1}{2}$ d. $\frac{1}{3}$

2 استعمل المعلومات نفسها في السؤال 1 (الاحتمال التجريبي للحصول على صورة وكتابة هو:

- a. $\frac{3}{10}$ b. $\frac{7}{10}$ c. $\frac{1}{3}$ d. $\frac{1}{6}$

3 اطلق محمد مؤنثر قرص 200 مرة، واصاب اللون الاخضر 50 مرة، احتمال ان يأتي المؤنثر على اللون الاخضر في المرة التالية هو:

- a. 0.23 b. 0.24 c. 0.25 d. 0.30

4 سجل لاعب كرة قدم 21 ركلة جزاء ناجحة من اصل 26 محاولة، أي نسبة مئوية هي الاقرب لاحتمال

ان يسجل اللاعب ركلة جزاء ناجحة في المحاولة التالية:

- a. 50% b. 60% c. 70% d. 80%

الفصل 1: الأعداد النسبية

4	الدرس الاول : ترتيب العمليات على الاعداد النسبية.
6	الدرس الثاني : القوى (الاسس) السالبة والصورة العلمية للعدد.
10	الدرس الثالث : خصائص القوى (الاسس).
14	الدرس الرابع : الكسور العشرية الدورية والصورة العلمية للعدد (استعمال الحاسبة).
18	الدرس الخامس : تبسيط الجمل العددية الكسرية.
22	

الفصل 2: الأعداد الحقيقية

27	الدرس الاول : مفهوم الأعداد الحقيقية وتمثيلها على مستقيم الأعداد.
29	الدرس الثاني : خصائص الأعداد الحقيقية.
33	الدرس الثالث : تبسيط الجمل العددية التي تحتوي على جذور تربيعية.
37	الدرس الرابع : تطبيقات على نظرية فيثاغورس.
41	الدرس الخامس : المستوى الاحداثي.
45	

الفصل 3: الحدوديات

50	الدرس الاول : جمع المقادير الجبرية وطرحها.
52	الدرس الثاني : ضرب حد جبري في مقدار جبري.
56	الدرس الثالث : ضرب المقادير الجبرية.
60	الدرس الرابع : قسمة مقدار جبري على حد جبري.
64	الدرس الخامس : تحليل المقادير الجبرية.
68	

الفصل 4: المعادلات والمتباينات

73	الدرس الاول : حل معادلات من الدرجة الاولى بمتغير واحد بخطوتين في R .
75	الدرس الثاني : حل معادلات من الدرجة الاولى بمتغير واحد بعدة خطوات في R .
79	الدرس الثالث : حل معادلات من الدرجة الثانية بمتغير واحد في R .
83	الدرس الرابع : حل المتباينات الجبرية ذات الخطوتين في R .
87	الدرس الخامس : حل المتباينات الجبرية متعدّدة الخطوات في R .
91	

96

الفصل 5 : الهندسة والقياس

98

الدرس الاول : علاقة الزوايا والمستقيمات (نظريات)

102

الدرس الثاني : تطابق المثلثات

106

الدرس الثالث : خواص المثلثات (متساوي الساقين، متساوي الاضلاع ، قائم الزاوية)

110

الدرس الرابع : متوازي الأضلاع والمعين وشبه المنحرف

114

الدرس الخامس : الاسطوانة والكرة (الخصائص ، المساحة السطحية ، الحجم)

118

الدرس السادس : مساحة الاشكال المركبة المنتظمة وغير المنتظمة

123

الفصل 6 : الهندسة الإحداثية

125

الدرس الاول : تمثيل جدول دالة محددة في المستوى الاحداثي

129

الدرس الثاني : مقدمة في الدوال

133

الدرس الثالث : الدوال الخطية

137

الدرس الرابع : الانعكاس والدوران في المستوى الاحداثي

141

الدرس الخامس : الانسحاب في المستوى الاحداثي

146

الفصل 7 : الأحصاء والأحتمالات

148

الدرس الاول : مقياس النزعة المركزية والمدى

152

الدرس الثاني : تمثيل البيانات ببيان الشاربي

156

الدرس الثالث : التجربة العشوائية

160

الدرس الرابع : الحدث

164

الدرس الخامس : الأحتمالات

168

الدرس السادس : الأحتمال التجريبي والأحتمال النظري

172

الدرس السابع : خطة حل المسألة (تمثيل المسألة)

175

تمرينات الفصول